

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 1

ЗАНЯТИЕ № 10

Тема № 16. Нарушения физиологических функций и соматические расстройства как проявление психической патологии.

Тема № 17. Методы терапии, профилактики и реабилитации в психиатрии.

Тема № 18. Ургентные состояния в психиатрии

Для какого вида расстройства подходит нижеследующее описание:  
(заполните пустую ячейку)



Расстройство, характеризующееся преднамеренным снижением веса, вызываемым и/или поддерживаемым самим пациентом. Для достоверного диагноза требуются следующие признаки: а) индекс массы тела составляет 17,5 и ниже; б) потеря веса вызывается самим пациентом путем значительного ограничения приема пищи, рвотой, приемом слабительных средств, диуретиков и другими «методами»; в) искажение образа своего тела, некритичность (худоба воспринимается как красота и грация, полнота – как уродство); г) серьезные соматические нарушения – аменорея, сердечно-сосудистая недостаточность, гормональные нарушения.

Основные классы психотропных лекарственных веществ

(заполните пустую ячейку)

Нейролептики (антипсихотики)

Антидепрессанты

Снотворные

Укажите правильный ответ:

Какое из ниже перечисленных психических состояний относится к ургентным (требующих неотложной терапии):

1. Стойкий отказ от еды
2. Астенический синдром
3. Синдром ретроградной амнезии
4. Апатико-абулический дефект

Укажите правильный ответ:

Какое из ниже перечисленных средств является препаратом первого выбора при купировании делирия:

1. Аминазин
2. Галоперидол
3. Амитриптилин
4. Реланиум

**Укажите правильный ответ:**

Какое из ниже перечисленных средств является препаратом первого выбора при купировании ажитированной депрессии:

1. Аминазин
2. Галоперидол
3. Амитриптилин
4. Реланиум

**Укажите правильный ответ:**

К психогенным сенсорным нарушениям и расстройствам чувствительности относят все перечисленное, кроме:

1. Концентрическое сужение поля зрения
2. Утрата слуха
3. Анестезии
4. Мутизм

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 2

ЗАНЯТИЕ № 10

Тема № 16. Нарушения физиологических функций и соматические расстройства как проявление психической патологии.

Тема № 17. Методы терапии, профилактики и реабилитации в психиатрии.

Тема № 18. Ургентные состояния в психиатрии

Для какого вида расстройства подходит нижеследующее описание:  
(заполните пустую ячейку)



Расстройство, характеризующееся повторяющимися приступами переедания и чрезмерной озабоченностью контролем веса тела, что приводит больного к принятию крайних мер для смягчения «полнящего» влияния съеденной пищи. Чаще всего это относится к людям с нормальным или даже избыточным весом, но с типичными периодами переедания, сопровождающимися рвотой или приемом слабительных средств.

Осложнения в зависимости от приема нейролептиков

(заполните пустую ячейку)

Типичные нейролептики



Экстрапирамидные расстройства

Атипичные нейролептики



Укажите правильный ответ:

Какое из ниже перечисленных психических состояний относится к ургентным (требующих неотложной терапии):

1. Психосоматическое расстройство
2. Синдром прогрессирующей амнезии
3. Витальная депрессия
4. Синдром олигофрении

Укажите правильный ответ:

Какое из ниже перечисленных средств является препаратом первого выбора при купировании сумеречного психоза:

1. Аминазин
2. Галоперидол

3. Амитриптилин
4. Реланиум

**Укажите правильный ответ:**

Какое из ниже перечисленных психотропных средств является наиболее общепотребительным в соматической клинике:

1. Азалептин
2. Галоперидол
3. Амитриптилин
4. Модитен-депо

**Укажите правильный ответ:**

Все следующие утверждения по поводу фетишистского трансвестизма верны, кроме:

1. он встречается только у мужчин-гомосексуалистов;
2. отмечаются сексуальное влечение и возбуждающие фантазии, связанные с переодеванием в одежду противоположного пола;
3. расстройство часто начинается в детском или подростковом возрасте;
4. желания произвести операцию по изменению пола нет.

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 3

ЗАНЯТИЕ № 10

Тема № 16. Нарушения физиологических функций и соматические расстройства как проявление психической патологии.

Тема № 17. Методы терапии, профилактики и реабилитации в психиатрии.

Тема № 18. Ургентные состояния в психиатрии

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Ранняя инсомния - это

Основные эффекты действия классических нейролептиков

(заполните пустую ячейку)

Антипсихотический

Седативный

Укажите правильный ответ:

Какое из ниже перечисленных средств является препаратом первого выбора при купировании кататонического возбуждения:

1. Реланиум
2. Амитриптилин
3. Галоперидол
4. Аминазин

Укажите правильный ответ:

Побочные действия и осложнения при передозировке препаратами бензодиазепинового ряда включают чаще всего:

1. Слабость
2. Обнубиляция сознания
3. Мигренозное состояние
4. Атаксия

Укажите правильный ответ:

Препаратом первого выбора при лечении классической депрессии является:

1. Амитриптилин
2. Реланум
3. Аминазин
4. Ноотропил

Укажите правильный ответ:

Соматические осложнения, обычно наблюдающиеся при нервной булимии, включают:

1. гипокалиемический алкалоз;
2. увеличение поджелудочной железы;
3. сердечные аритмии и недостаточность;
4. расширение желудка.

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 4

ЗАНЯТИЕ № 10

**Тема № 16. Нарушения физиологических функций и соматические расстройства как проявление психической патологии.**

**Тема № 17. Методы терапии, профилактики и реабилитации в психиатрии.**

**Тема № 18. Ургентные состояния в психиатрии**

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Средняя инсомния - это

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Акатизия - это

**Укажите правильный ответ:**

Препаратом первого выбора при купировании острого реактивного (психогенного) возбуждения является:

1. Амитриптилин
2. Реланиум
3. Фенобарбитал
4. Аминазин

**Укажите правильный ответ:**

Какое средство следует назначить больному с острым приступом шизофрении, у которого после приема галоперидола возникла мышечная скованность, нарушение речи, спазм мышц лица и шеи:

1. Амитриптилин
2. Реланиум
3. Пирацетам
4. Аминазин

**Укажите правильный ответ:**

Препараты каких групп имеют терапевтическое значение для лечения мнестических расстройств:

1. Нейролептики
2. Ноотропы

3. Транквилизаторы
4. Соли лития

**Укажите правильный ответ:**

Больная М. 19 лет, поступила в клинику кожных болезней с обострением нейродермита (кожные высыпания на руках и на лице). Перед госпитализацией не выходила на улицу, так как полагала, что "все смотрят на нее", смеются над изуродованным лицом. При осмотре: сознание не помрачено, фиксирована на изменении внешности, заявляет, что "стала уродиной". Полагает, что другие больные считают её "заразной". В процессе беседы суждения больной поддаются коррекции, соглашается с тем, что в процессе лечения количество высыпаний уменьшилось. Ищет сочувствия, просит о помощи.

А. Дайте квалификацию состоянию больного:

1. Дисморфобический синдром
2. Истерический синдром
3. Ипохондрический синдром
4. Депрессивно-фобический синдром

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 5

ЗАНЯТИЕ № 10

**Тема № 16. Нарушения физиологических функций и соматические расстройства как проявление психической патологии.**

**Тема № 17. Методы терапии, профилактики и реабилитации в психиатрии.**

**Тема № 18. Ургентные состояния в психиатрии**

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Поздняя инсомния - это

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Нейролептическая дискинезия -  
это

**Укажите правильный ответ:**

Нормотимики

Какая группа препаратов наиболее эффективна в лечении шизофрении на современном этапе:

1. Классические нейролептики
2. Препараты лития
3. Нормотимики
4. Атипичные нейролептики

**Укажите правильный ответ:**

Какие виды антидепрессантов являются более современными при лечении депрессии:

1. Трициклические антидепрессанты
2. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
3. Ингибиторы МАО
4. Тетрациклические антидепрессанты

**Укажите правильный ответ:**

Какой из психотропных эффектов amitriptilina развивается быстро (в течение 60-90 минут после приема препарата внутрь):

1. Повышение настроения

2. Уменьшение тревоги и беспокойства (седативный эффект)
3. Исчезновение бреда самообвинения и самоуничижения
4. Улучшение физического состояния

**Укажите правильный ответ:**

Девочка-подросток, 15 лет, резко ограничила себя в приеме пищи, после того, как в школе ее назвали «толстухой». Стала голодать, принимать слабительные, если и ела, то после приема пищи вызывала искусственно рвоту. Никогда не увлекалась спортом, вдруг начала совершать изнуряющие физические упражнения. Разработала специальную диету, включающую только овощные соки и кефир. Резко похудела – при росте 165 см весит 42 кг. Исчезли menses. Критика к своему состоянию отсутствует.

А. Дайте квалификацию состоянию больного:

1. Депрессивное состояние
2. Нервная анорексия
3. Истерический невроз
4. Ипохондрический невроз

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 6

ЗАНЯТИЕ № 10

**Тема № 16. Нарушения физиологических функций и соматические расстройства как проявление психической патологии.**

**Тема № 17. Методы терапии, профилактики и реабилитации в психиатрии.**

**Тема № 18. Ургентные состояния в психиатрии**

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Нарколепсия - это

**Основные классы антидепрессантов**

(заполните пустую ячейку)

Трициклические  
антидепрессанты

Селективные ингибиторы  
обратного захвата  
серотонина

**Укажите правильный ответ:**

Наиболее распространенные средства неотложной помощи при эпилептическом состоянии являются следующие:

1. Внутривенное введение седуксена (реланиума)
2. Введение сердечных средств (кордиамин, кофеина, строфантина)
3. Внутривенное введение глюкозы
4. Внутримышечное введение амитриптилина

**Укажите правильный ответ:**

Какие из перечисленных ниже препаратов обладают противосудорожным эффектом:

1. Аминазин
2. Амитриптиллин
3. Карбамазепин (Финлепсин)
4. Соли лития

**Укажите правильный ответ:**

Что из перечисленного нельзя использовать для купирования абстинентного синдрома в соматическом стационаре:

1. Противосудорожные средства
2. Седативные нейролептики (аминазин, тизерцин)
3. Тиоловые препараты (тиосульфат натрия, унитиол)
4. Лечение транквилизаторами

**Укажите правильный ответ:**

Какое из следующих нарушений является абсолютным противопоказанием для электросудорожной терапии (ЭСТ):

1. аневризма аорты;
2. опухоль мозга;
3. поражение коронарных артерий
4. все перечисленное

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 7

ЗАНЯТИЕ № 10

**Тема № 16. Нарушения физиологических функций и соматические расстройства как проявление психической патологии.**

**Тема № 17. Методы терапии, профилактики и реабилитации в психиатрии.**

**Тема № 18. Ургентные состояния в психиатрии**

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Парасомнии - это

**Классы психотропных препаратов, применяемых для купирования психомоторного возбуждения**

(заполните пустую ячейку)

Нейролептики

Снотворные

**Укажите правильный ответ:**

Какие из перечисленных препаратов целесообразно назначить для купирования делирия

1. Диазепам
2. Амитриптилин
3. Бензонал
4. Эфедрин

**Укажите правильный ответ:**

Что из перечисленного является ведущим патогенетическим средством при терапии невротозов:

1. Нейролептики
2. Транквилизаторы
3. Антидепрессанты
4. Психотерапия

**Укажите правильный ответ:**

Классификация антидепрессантов включает все перечисленное, кроме:

1. Трициклические
2. Производные бензодиазепа
3. Ингибиторы моноаминоксидазы
4. Ингибиторы обратного захвата серотонина

**Укажите правильный ответ:**

Какая стадия сна является провоцирующей для возникновения судорожного припадка во время ночного сна:

1. Первая стадия
2. Вторая стадия
3. Стадия медленного сна (дельта-сон)
4. Стадия быстрого сна (REM-сон)

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 8

ЗАНЯТИЕ № 10

**Тема № 16. Нарушения физиологических функций и соматические расстройства как проявление психической патологии.**

**Тема № 17. Методы терапии, профилактики и реабилитации в психиатрии.**

**Тема № 18. Ургентные состояния в психиатрии**

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Нервная анорексия - это

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Нормотимики - это

**Укажите правильный ответ:**

Галоперидол показан для лечения:

1. Депрессивного синдрома
2. Апатико-абулических состояний
3. Параноидного синдрома
4. Астенического синдрома

**Укажите правильный ответ:**

К побочным действиям, связанным с применением нейролептиков относятся:

1. Гипергидроз
2. Экстрапирамидный синдром
3. Крапивница
4. Ни одно из перечисленного

**Укажите правильный ответ:**

К атипичным нейролептикам относят:

1. Галоперидол
2. Рисполепт (рисперидон)
3. Аминазин
4. Трифтазин

**Укажите правильный ответ:**

Какое из ниже перечисленных физических заболеваний может быть ошибочно принято за тревожное расстройство:

1. Микседема
2. Тиреотоксикоз
3. Сахарный диабет
4. Болезнь Иценко-Кушинга

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 9

ЗАНЯТИЕ № 10

**Тема № 16. Нарушения физиологических функций и соматические расстройства как проявление психической патологии.**

**Тема № 17. Методы терапии, профилактики и реабилитации в психиатрии.**

**Тема № 18. Ургентные состояния в психиатрии**

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Нервная булимия - это

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Эпилептический статус - это

**Укажите правильный ответ:**

К преимуществам атипичных нейролептиков относят:

1. Быстрая редукция психотических симптомов
2. Антидепрессивный эффект
3. Малая выраженность экстрапирамидных побочных эффектов
4. Высокая эффективность

**Укажите правильный ответ:**

К экстрапирамидным побочным эффектам при применении традиционных нейролептиков относят все перечисленное, кроме:

1. Дистония
2. Акатизия
3. Лекарственный паркинсонизм
4. Атетоз

**Укажите правильный ответ:**

К селективным ингибиторам обратного захвата серотонина относят все перечисленное, кроме:

1. Амитриптилин
2. Флуоксетин (прозак)
3. Сертралин (золофт)
4. Дулоксетин (симбалта)

**Укажите правильный ответ:**

Отсутствие menses может отмечаться при следующих состояниях, кроме:

1. Депрессивное состояние
2. Истерический невроз
3. Дистрофия
4. Соматоформное расстройство

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 10

ЗАНЯТИЕ № 10

Тема № 16. Нарушения физиологических функций и соматические расстройства как проявление психической патологии.

Тема № 17. Методы терапии, профилактики и реабилитации в психиатрии.

Тема № 18. Ургентные состояния в психиатрии

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Сомнабулизм - это

Основные эффекты ноотропных препаратов

(заполните пустую ячейку)

Улучшение энергетического  
состояния нейронов

Активация пластических  
процессов в ЦНС

Усиление процессов  
синаптической передачи в ЦНС

Улучшение утилизации  
глюкозы

Укажите правильный ответ:

Какие из групп препаратов могут вызвать лекарственную зависимость:

1. Нейролептики
2. Транквилизаторы
3. Ноотропы
4. Антидепрессанты

Укажите правильный ответ:

Какие из нижеперечисленных групп препаратов предпочтительны для купирования психомоторного возбуждения в условиях соматического стационара:

1. Барбитураты
2. Амитриптилин
3. Нейролептики
4. Транквилизаторы

**Укажите правильный ответ:**

Какие из перечисленных препаратов применяются в качестве корректора при нейролептической терапии (с целью предупреждения развития экстрапирамидных нарушений):

1. Реладорм
2. Ноотропил
3. Циклодол
4. Фентанил

**Укажите правильный ответ:**

Поздняя инсомния связана с одним из следующих нарушений:

1. Сокращение фазы дельта сна (медленного сна)
2. Сокращение фазы быстрого сна (REM-сна)
3. Трудности засыпания на 1-й стадии сна
4. Сокращение циклов сна

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_