

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 1

ЗАНЯТИЕ № 6

Тема № 11. Экзогенно-органические (включая симптоматические) психические расстройства. Психические расстройства позднего возраста.

Виды черепно-мозговой травмы, сопровождающейся потерей сознания
(заполните пустую ячейку)

КОММОЦИЯ

КОНТУЗИЯ

Дайте определение понятию
(заполните пустую ячейку)

Бред «малого размаха» - это

Укажите правильный ответ:

Структура симптоматического психоза определяется преимущественно одним из нижеследующих факторов:

1. Социальной средой
2. Полем больного
3. Этиологией соматического заболевания
4. Возрастом больного

Укажите правильный ответ:

К выраженным психическим расстройствам сосудистого генеза относят, главным образом, следующие:

1. Синдром психического автоматизма
2. Делириозное состояние
3. Оглушение
4. Амнестические расстройства

Укажите правильный ответ:

При начале сосудистого заболевания в старческом возрасте наблюдаются следующие личностные изменения:

1. Развитие истерической личности
2. Огрубение личности
3. Развитие конформной личности
4. Аутизация личности

Укажите правильный ответ:

1. К острым сосудистым психозам относятся следующие состояния:
2. Делириозное состояние
3. Бред сутяжничества и кверулянтства

4. Дисмнестические расстройства
5. Кататонический ступор

Укажите правильный ответ:

Больной Д. 67 лет с диагнозом "саркома" госпитализирован в хирургическое отделение для оперативного лечения. Накануне операции стал отказываться от радикальной операции. Отказ мотивирует сомнением в правильности врачебного диагноза. Полагает, что припухлость в лицевой области связана с "каким-то воспалением". Настойчиво требует выписки, отказывается от дополнительных обследований. Упорно отстаивает свою точку зрения. Постоянно повторяет фразу: "врачи часто ошибаются". Намерен после выписки обратиться за помощью к знахарю.

Определите тип отношения к болезни:

1. Ипохондрический
2. Анозогностический
3. Нормогностический
4. Диссимуляция

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 2

ЗАНЯТИЕ № 6

Тема № 11. Экзогенно-органические (включая симптоматические) психические расстройства. Психические расстройства позднего возраста.

Психозы острого периода ЧМТ

(заполните пустую ячейку)

сумеречное помрачения
сознания

острый галлюциноз

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Инволюционная депрессия - это

Укажите правильный ответ:

Из очаговых расстройств при болезни Альцгеймера ранее всего появляется:

1. Акалькулия
2. Афазия
3. Апраксия
4. Амнезия

Укажите правильный ответ:

Что из числа нижеперечисленного наиболее характерно для патологии сознания при сосудистых заболеваниях головного мозга:

1. Аментивный синдром
2. Сумеречное помрачение сознания
3. Онейроид
4. Делириозный синдром

Укажите правильный ответ:

Что из нижеперечисленного является психическим проявлением нейросифилиса?

1. Розеолезная сыпь
2. «Ожерелье Венеры»
3. Прогрессивный паралич
4. Глухота

Укажите правильный ответ:

Какие общие закономерности течения психопатологических расстройств характерны для черепно-мозговой травмы?

1. Регрессиентность течения психопатологических проявлений

2. Склонность к декомпенсациям в связи с внешними факторами (алкоголизация, инфекция, психогении)
3. Обязательное формирование стойкого психоорганического синдрома
4. Формирование синдрома психических автоматизмов

Укажите правильный ответ:

Больной Ф.62 лет, перенес острый инфаркт миокарда, осложнившийся нарушениями ритма и недостаточностью кровообращения. Несмотря на тяжесть состояния, больной не выполняет предписания врача, нарушает постельный режим. Эйфоричен, много шутит, улыбается. Считает, что врачи преувеличивают тяжесть его состояния. Не критичен к поведению, иронизирует по поводу режимных ограничений, которые постоянно нарушает. Выявляется диффузное снижение памяти, слабость суждений.

А. Определите психопатологическое состояние:

1. Маниакальное состояние
2. Деменция
3. Психоорганический синдром
4. Психопатоподобный синдром

Б. Определите тип отношения к болезни:

1. Ипохондрический
2. Нормогнозический
3. Диссимуляция
4. Гипонозогнозический

В. Какова ваша врачебная тактика:

1. Выпишите на амбулаторное лечение в связи с нарушением больным режима
2. Пригласите на консультацию врача-психиатра для совместного лечения данного больного
3. Переведете больного в психиатрический стационар для коррекции его психического состояния

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 3

ЗАНЯТИЕ № 6

Тема № 11. Экзогенно-органические (включая симптоматические) психические расстройства. Психические расстройства позднего возраста.

Основные проявления травматической церебральной астении

(заполните пустую ячейку)

Психическая истощаемость

Снижение работоспособности

Повышенная чувствительность к аверсивным раздражителям

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Триада Валтер-Бюэля - это

Укажите правильный ответ:

Психопатоподобные расстройства в начальном периоде сенильной деменции проявляются преимущественно в следующих расстройствах:

1. Нарастающая интроверсия
2. Тревожные опасения за близких
3. Расторможение низших влечений
4. Упрямство и ригидность

Укажите правильный ответ:

Что из нижеперечисленного является основой прогрессивного паралича?

1. Менингит
2. Энцефалит
3. Поражение спинного мозга
4. Менингоэнцефалит

Укажите правильный ответ:

Какие психопатологические синдромы характерны для острого и подострого периода черепно-мозговой травмы?

1. Судорожный синдром
2. Астенический синдром
3. Корсаковский синдром
4. Гебефренический синдром

Укажите правильный ответ:

Утрата индивидуальных личностных черт наиболее ярко представлена при следующих видах деменции, исключая:

1. Сенильная деменция
2. Атеросклеротическая (лакунарная) деменция
3. Болезнь Альцгеймера
4. Болезнь Пика

Укажите правильный ответ:

Больной, перенесший тяжелую ЧМТ, спокойно беседовал во время свидания с женой. Когда узнал, что сын не носит ботинки, которые больной купил ему перед госпитализацией, возбудился: стал громко кричать, размахивать руками, произносить бранные слова в адрес жены. Лицо приняло злобное выражение, увещания не действовали, а только поддерживали болезненную реакцию. Беседу пришлось прекратить и отправить больного в палату.

А. Квалифицируйте синдром:

1. Маниакальный
2. Психопатоподобный
3. Тревожный
4. Параноидный

Б. Что следует назначить в этом случае:

1. Противосудорожные средства
2. Нейролептики
3. Транквилизаторы
4. Антидепрессанты

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 4

ЗАНЯТИЕ № 6

Тема № 11. Экзогенно-органические (включая симптоматические) психические расстройства. Психические расстройства позднего возраста.

Проявления гиперпатии при травматической церебральной астении

(заполните пустую ячейку)

к болевым стимулам

к звуковым стимулам

к световым стимулам

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Симптом Аргайл-Робертсона - это

Укажите правильный ответ:

Острые симптоматические психозы чаще всего развиваются в виде следующих состояний:

1. Вербальный галлюциноз
2. Кататонический ступор
3. Делириозное состояние
4. Паранойяльный бред

Укажите правильный ответ:

Старческое слабоумие отличается от сосудистой деменции следующими признаками:

1. Разными по структуре психозами в случае их возникновения
2. Большой тяжестью слабоумия
3. Личностными и поведенческими особенностями
4. Возрастом начала заболевания

Укажите правильный ответ:

Для нейросифилиса характерно:

1. Возникает на ранних стадиях болезни
2. Развивается независимо от проведенного лечения
3. Характерно развитие делирия
4. Характеризуется формированием психоорганического синдрома

Укажите правильный ответ:

Для периода отдаленных последствий черепно-мозговой травмы характерен ряд психических расстройств, кроме:

1. Вспыльчивость и эмоциональная лабильность

2. Синдром Котара
3. Астенический синдром
4. Диссоциативные расстройства

Укажите правильный ответ:

Больной А. 53 лет, в течение длительного времени страдает ишемической болезнью сердца с частыми приступами стенокардии, провоцируемой физическими и эмоциональными нагрузками. За неделю до госпитализации в кардиологическое отделение приступы стенокардии стали возникать в покое, появились симптомы сердечной недостаточности. Больной предъявляет жалобы на раздражительность, непереносимость громких звуков, яркого света, затрудненное засыпание. Во время беседы быстро истощается, при разговоре о болезни на глазах появляются слезы.

А. Дайте квалификацию психического состояния:

1. Депрессивный синдром
2. Астенический синдром
3. Истерический синдром
4. Обсессивный синдром

Б. Сформулируйте предположительный диагноз:

1. Маниакально-депрессивный психоз
2. Истерия
3. Соматогенная астения
4. Неврастения

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 5

ЗАНЯТИЕ № 6

Тема № 11. Экзогенно-органические (включая симптоматические) психические расстройства. Психические расстройства позднего возраста.

Синдромальное выражение экзогенного типа реакций согласно концепции Бонгеффера

(заполните пустую ячейку)

делирий

амения

сумеречное состояние

галлюциноз

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Мультиинфарктная деменция - это

Укажите правильный ответ:

Относительная сохранность «ядра личности» характерна для одного из нижеследующих видов деменции:

1. Сенильная деменция
2. Болезнь Альцгеймера
3. Атеросклеротическая (лакунарная) деменция
4. Болезнь Пика

Укажите правильный ответ:

Ранние расстройства праксиса характерны для одного из нижеследующих видов деменции:

1. Болезнь Альцгеймера
2. Болезнь Пика
3. Атеросклеротическая деменция
4. Посттравматическая деменция

Укажите правильный ответ:

К тотальным деменциям, связанным с атрофическим процессом головного мозга, относят одно из следующих:

1. Деменция при болезни Гентингтона
2. Деменция в связи с тяжелой травмой мозга
3. Деменция при болезни Альцгеймера

4. Деменция при болезни Паркинсона

Укажите правильный ответ:

Для какого из перечисленных ниже заболеваний характерно наличие резидуальных расстройств:

1. Маниакально-депрессивный психоз
2. Травматическая энцефалопатия
3. Реактивная депрессия
4. Психастения

Укажите правильный ответ:

У больной Р., 24 лет выявлен диффузный токсический зоб. Предъявляет жалобы на слезливость, колебания настроения, повышенную раздражительность. При осмотре: ориентирована правильно, бреда, галлюцинаций нет. Эмоционально лабильна. Во время беседы дает бурные аффективные вспышки, быстро истощается, концентрация внимания снижена. Память грубо не нарушена. Интеллект соответствует возрасту и полученному образованию.

А. Квалифицируйте состояние:

1. Астенический синдром
2. Маниакальный синдром
3. Истерический синдром

Б. Какие из перечисленных препаратов могут быть дополнительно назначены больной:

1. Транквилизаторы
2. Соли лития
3. Нейролептики

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 6

ЗАНЯТИЕ № 6

Тема № 11. Экзогенно-органические (включая симптоматические) психические расстройства. Психические расстройства позднего возраста.

Этапы экзогенно-органического психоза

(заполните пустую ячейку)

продромальная
астения

острый психоз

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Характерологическое
«шаржирование» - это

Укажите правильный ответ:

1. Гипертонический криз может сопровождаться всем перечисленным, исключая:
2. Синдромами помрачения сознания
3. Выраженной тревогой
4. Психомоторным возбуждением
5. Острым галлюцинозом

Укажите правильный ответ:

В периоде отдаленных последствий черепно-мозговой травмы могут развиваться все перечисленное, кроме:

1. Судорожные припадки
2. Сумеречное помрачение сознания
3. Парафренный синдром
4. Депрессивный синдром

Укажите правильный ответ:

Смысл концепции об экзогенном типе реакций заключается в том, что:

1. Различные экзогенные вредности вызывают общие типы реакций
2. Каждой экзогенной вредности соответствует свой тип реакции
3. Любая реакция экзогенного типа является проявлением скрытого эндогенного заболевания
4. Тип экзогенной реакции зависит от личностных особенностей

Укажите правильный ответ:

Для психоорганического синдрома характерно все перечисленное, исключая:

1. Снижение памяти
2. Снижение интеллекта
3. Эмоциональная неустойчивость
4. Тотальное слабоумие

Укажите правильный ответ:

Больная А. 41 года, гиперстенической конституции, страдает хр. калькулезным холециститом. В период обострения, наряду с болями в правом подреберье, отмечается повышенная раздражительность, вспыльчивость, вегетативные нарушения (гипергидроз, сердцебиение, приступы головокружения). В этот период нарушается самочувствие ("бываю, как ватная"), появляется бессонница. С исчезновением болей, диспептических явлений психическое состояние постепенно нормализуется.

А. Дайте квалификацию психического состояния в период обострения холецистита:

1. Астенический синдром
2. Депрессивный синдром
3. Ипохондрический синдром
4. Паническое расстройство

Б. Какова природа психических нарушений:

1. Экзогенная
2. Эндогенная
3. Психогенная

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 7

ЗАНЯТИЕ № 6

Тема № 11. Экзогенно-органические (включая симптоматические) психические расстройства. Психические расстройства позднего возраста.

Основные типы деменции позднего возраста

(заполните пустую ячейку)

«сосудистые»

сенильные

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Агнозия - это

Укажите правильный ответ:

Укажите среди перечисленных эмоциональных нарушений характерное для сосудистых заболеваний головного мозга:

1. Эмоциональная холодность
2. Эмоциональная неадекватность
3. Гипертимия
4. Слабодушие

Укажите правильный ответ:

Инволюционные депрессии характеризуются всем перечисленным, кроме:

1. Имеют тенденцию к затяжному течению
2. Имеют тенденцию к рецидивам
3. Опасны суицидами
4. Сопровождаются бредом преследования малого размаха

Укажите правильный ответ:

Признаками группы атрофических процессов головного мозга является все перечисленное, кроме:

1. Незаметное начало заболевания
2. Неуклонно прогрессивное течение
3. Формирование тотального слабоумия в конечной стадии
4. Волнообразное течение (периоды спонтанного улучшения и ухудшения состояния)

Укажите правильный ответ:

Фабула инволюционных параноидов складывается из всего перечисленного, кроме:

1. Из идей ущерба
2. Из идей отравления

3. Из идеи высокого происхождения
4. Из идей отношения

Укажите правильный ответ:

Больной 76 лет, плотник. Последние 3 года родственники замечают, что он стал забывать цифры, имена, даты. Прячет свой инструмент и забывает, куда положил его. Раньше был "смекалистым", а теперь дает нелепые советы. С трудом вспоминает имена своих детей, жены, с которой прожил 50 лет. По характеру стал ворчливым, эгоистичным, подозрительным. Однако этим обстоятельством не тяготится, считает, что с памятью у него "все в порядке". Заявляет, что его обворовывают, угрожает судом. Находясь несколько месяцев в больнице, утверждает, что "вчера был дома, встречал гостей...". Грубых неврологических расстройств нет.

А. Квалифицируйте синдром:

1. Корсаковский
2. Астенический
3. Лакунарная деменция
4. Тотальная деменция

Б. Сформулируйте предположительный диагноз:

1. Болезнь Альцгеймера
2. Старческая деменция
3. Сосудистая деменция
4. Прогрессивный паралич

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 8

ЗАНЯТИЕ № 6

Тема № 11. Экзогенно-органические (включая симптоматические) психические расстройства. Психические расстройства позднего возраста.

Психопатологические симптомы при прогрессивном параличе

(заполните пустую ячейку)

эйфория, благодушие

нарушение внимания, памяти

некритичность

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Апраксия - это

Укажите правильный ответ:

Афазии, апраксии, агнозии наиболее характерны для:

1. Сосудистой деменции
2. Болезни Пика
3. Болезни Альцгеймера
4. Все перечисленное неверно

Укажите правильный ответ:

Чем, по вашему мнению, вызваны психогенные реакции при соматических заболеваниях?

1. Интоксикацией
2. Рефлекторными влияниями с пораженных внутренних органов
3. Переживанием тяжести заболевания и его социально-психологических последствий
4. Гипоксией головного мозга

Укажите правильный ответ:

Какая патологическая реакция чаще всего встречается при возникновении соматического заболевания:

1. Кататонический синдром
2. Психорганический синдром
3. Депрессивный синдром
4. Делириозный синдром

Укажите правильный ответ:

У кого чаще наблюдается ипохондрический тип внутренней картины болезни:

1. У больных паранойяльной психопатией

2. У лиц с чертами тревожной мнительности
3. У лиц шизоидного склада
4. У лиц эпилептоидного склада

Укажите правильный ответ:

Больной 60 лет, инженер. На протяжении последних лет "забывчив", выражено снижение памяти на текущие события. Заметно ухудшилась сообразительность, в отчетах по работе стал делать ошибки, пропуски, появилась раздражительность, повышенная утомляемость и слабодушие. Стал постоянно записывать в блокноте имена знакомых, даты, цифры - "чтобы не путать". Вместе с тем критически относится к снижению своей работоспособности, обращался к врачам за помощью по поводу снижения памяти и сообразительности, плакал. При посещении врачей был вежливым, приветливым.

А. Квалифицируйте синдром:

1. Депрессивный
2. Корсаковский
3. Астенический
4. Лакунарная деменция
5. Тотальная деменция

Б. Сформулируйте предположительный диагноз:-

1. Инволюционная депрессия
2. Сенильная деменция
3. Болезнь Альцгеймера
4. Парциальная «сосудистая» деменция

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 9

ЗАНЯТИЕ № 6

Тема № 11. Экзогенно-органические (включая симптоматические) психические расстройства. Психические расстройства позднего возраста.

Анатомические формы поражения при сифилисе мозга

(заполните пустую ячейку)

сифилитический
эндартериит

сифилитический
менингоэнцефалит

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Акалькулия - это

Укажите правильный ответ:

Психические расстройства при эндокринных заболеваниях могут быть представлены:

1. Судорожным синдромом
2. Аффективными нарушениями
3. Истерическим неврозом
4. Бредовым состоянием

Укажите правильный ответ:

У ВИЧ-инфицированных возможны следующие психические расстройства, кроме:

1. Реактивная депрессия
2. Ипохондрическая фиксация
3. Онейроид
4. Психоорганический синдром

Укажите правильный ответ:

Для климактерического синдрома характерно все перечисленное, кроме:

1. Аффективной лабильности
2. Расстройства сна
3. Массивных вегетативных расстройств
4. Апатико-динамического синдрома

Укажите правильный ответ:

При сахарном диабете могут возникнуть следующие психические расстройства:

1. Тревожно-депрессивное состояние
2. Онейроид
3. Синдромы выключения сознания

4. Аменция

Укажите правильный ответ:

Больной Б., 28 лет, преподаватель математики. Обратился к врачу с жалобами на периодические головные боли, усиливающиеся при умственной работе, чувство постоянной слабости и повышенную утомляемость. Выполнение обычной работы стало требовать большого напряжения духовных и физических сил. Утром трудно заставить себя встать с постели, взяться за обычные дела. Садится за книги, но, прочитав полстраницы, замечает, что механически пробегает глазами по строчкам, а мысли где-то далеко. Ко второй половине рабочего дня «вработывается», голова становится более свежей, но к вечеру чувствует себя совершенно разбитым. За последнее время стал раздражительным, утратил обычную сдержанность. Во время урока грубо прикрикнул на ученика, после чего тут же внутренне раскаялся, долго не мог успокоиться, представлял себе возможные неприятные последствия этого поступка. Дома все выводит из себя, раздражает радио, шумная возня пятилетней дочки. Однажды даже ударил ее, и сам расстроился до слез, просил у дочери прощения. Раздражает даже прикосновение к телу одежды: «Чувствую себя так, будто на мне власяница!». Во время беседы с врачом больной волнуется, лицо покрывается красными пятнами, голос дрожит, на глаза навертываются слезы. Стесняется этого, старается скрыть свое волнение; склонен к пессимистической оценке будущих результатов лечения.

А. Квалифицируйте синдром:

1. Психоорганический синдром
2. Астено-депрессивный синдром
3. Психопатоподобный синдром
4. Астено-ипохондрический синдром

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 10

ЗАНЯТИЕ № 6

Тема № 11. Экзогенно-органические (включая симптоматические) психические расстройства. Психические расстройства позднего возраста.

Клинические формы сифилиса головного мозга

(заполните пустую ячейку)

псевдоневрозения

прогрессивный паралич

сифилитический параноид
(галлюциноз)

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Афазия - это

Укажите правильный ответ:

Что характерно для анозогнозического варианта внутренней картины болезни?

1. Переоценка тяжести реального заболевания
2. "Отрицание" болезни
3. Агравация
4. Симуляция

Укажите правильный ответ:

В острой стадии инфаркта миокарда могут наблюдаться психические расстройства:

1. Делирий
2. Маниакальный синдром
3. Онейроид
4. Депрессивное состояние

Укажите правильный ответ:

Для пневмоний наиболее характерны:

1. Затяжные бредовые психозы
2. Психоорганический синдром
3. Астенические состояния
4. Ничего из перечисленного

Укажите правильный ответ:

При начале сосудистого заболевания в старческом возрасте наблюдаются следующие личностные изменения:

1. Развитие истерической личности
2. Огрубение личности
3. Развитие конформной личности
4. Аутизация личности

Укажите правильный ответ:

Больной 45 лет, перенес инфаркт миокарда. Постинфарктный период протекал без осложнений. Во время проведения нагрузочной пробы - бурная вегетативная реакция со страхом остановки сердца. После этого отказывается от расширения двигательного режима, боится оставаться без медицинского персонала. Испытывает страх "остановки сердца". Понимая необоснованность страхов, заявляет, что не может их преодолеть. Появление страха сопровождается сердцебиением, ощущением замирания сердца, потоотделением.

А. Дайте квалификацию состояния больного:

1. Истерический синдром
2. Ипохондрический синдром
3. Астено-депрессивный синдром
4. Тревожно-фобический синдром

Б. Что из нижеследующего не следует назначать пациенту:

1. Антидепрессанты
2. Транквилизаторы
3. Нейролептики
4. Нормотимики

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____