

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 1

ЗАНЯТИЕ № 7

**Тема № 12. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. Алкоголизм и наркомания.**

**Уровни вовлечения в пьянство и алкоголизм**

(заполните пустую ячейку)

Начальный уровень

Эпизодическое, ситуационное  
употребление алкоголя

Алкогольная зависимость

**Факторы, влияющие на формирование алкоголизма**

(заполните пустую ячейку)

Генетические

Социально-  
экономические

**Укажите правильный ответ:**

В структуре формирующегося алкогольного абстинентного синдрома (похмелья) преобладают следующие расстройства:

1. Психотические расстройства
2. Судорожные проявления
3. Соматовегетативные нарушения
4. Интеллектуальные расстройства

**Укажите правильный ответ:**

При опьянении каким из ниже перечисленных средств поведение человека является наиболее социально опасным:

1. Седативные средства
2. Гашиш
3. Фенобарбитал и прочие барбитураты
4. Героин прочие препараты опиной группы

**Укажите правильный ответ:**

Синдром измененной реактивности организма при наркомании включает в себя, главным образом, следующие признаки:

1. Предпочтение определенному наркотику
2. Развитие толерантности
3. Состояние дискомфорта в отсутствии наркотика
4. Наличие первичной психической зависимости

**Укажите правильный ответ:**

Состояние сверхбодрствования, связанное с употреблением психоактивных веществ (кокаин, амфетамин), характеризуется:

1. Улучшением памяти.
2. Эмоциональной лабильностью.
3. Ухудшением памяти.
4. Повышением активности с быстрой реакцией на внешние раздражители.

**Укажите правильный ответ:**

В психиатрический диспансер обратилась гражданка Б. с жалобами на неадекватное поведение мужа. Муж в течение многих лет злоупотребляет алкоголем. Отмечается нарушение сна, раздражительность, грубость, снижение потенции. Жена сообщила, что муж стал подозрительным, ревнивым, роется во всех вещах, проверяет записную книжку. Считает, что у нее есть любовник. Летом неожиданно приехал из отпуска, дома устроил обыск, осматривал нижнее белье жены, был очень возбужден, угрожал расправой. Последние дни мрачен, ночью не спит, ходит из угла в угол, много курит. Накануне заявил жене, что он "все знает и скоро положит этому конец".

**А. Квалифицируйте синдром:**

1. Психопатический
2. Бредовой
3. Делириозный
4. Галлюцинаторный

**Б. Сформулируйте предположительный диагноз:**

1. Шизофрения
2. Алкогольный бред ревности
3. Алкогольный делирий
4. Алкогольный галлюциноз

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 2

ЗАНЯТИЕ № 7

**Тема № 12. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. Алкоголизм и наркомания.**

**Формы злоупотребления алкоголем**

(заполните пустую ячейку)

Алкогольная зависимость

**Структура алкогольного/наркоманического синдрома**

(заполните пустую ячейку)

Симптомы зависимости

**Укажите правильный ответ:**

Для средней (второй) стадии алкоголизма характерно:

1. Интолерантность
2. Высокая толерантность на протяжении длительного отрезка времени («плато толерантности»)
3. Патологическое опьянение
4. Рост толерантности к алкоголю

**Укажите правильный ответ:**

Острые алкогольные психозы (алкогольный делирий, галлюциноз) развиваются на следующей стадии алкоголизма:

1. На начальной (первой) стадии
2. На средней (второй) стадии
3. На конечной (третьей) стадии
4. На любой стадии алкоголизма

**Укажите правильный ответ:**

Для средней (второй) стадии алкоголизма характерно одно из следующих проявлений:

1. Постоянный (перманентный) характер пьянства
2. Эпизодический эксцессивный характер пьянства (эксцесс)
3. Запойный характер пьянства
4. Ситуативный прием спиртного

**Укажите правильный ответ:**

Наиболее распространенный вариант алкогольного параноида – это:

1. Бред преследования
2. Бред инсценировки
3. Бред воздействия
4. Бред ревности

**Укажите правильный ответ:**

У больного после длительного запоя и его внезапного прекращения на третий день развилась бессонница, тревога, стал беспокоен, суетлив, речь и поступки стали неадекватными, что-то «мерещилось». При поступлении в стационар: в беседе часто отвлекается, в окружающей обстановке ориентировка нарушена, часто вскакивает с постели, что-то ищет под подушкой, заглядывает под кровать, копается в постельном белье, шарит рукой по стене, пытаясь поймать воображаемых насекомых. Порой испуганно озирается, разговаривает сам с собой.

А. Квалифицируйте синдром:

1. Галлюцинаторный синдром
2. Параноидный синдром
3. Делириозный синдром
4. Сумеречное расстройство сознания
5. Аментивный синдром

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 3

ЗАНЯТИЕ № 7

**Тема № 12. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. Алкоголизм и наркомания.**

**Степень алкогольного опьянения в зависимости от содержания алкоголя в крови**  
(в верхней строке указана степень опьянения, в нижней строке в пустых ячейках укажите соответствующее содержание алкоголя в крови, выраженное в промиллях)

легкая	средняя	тяжелая

**Признаки измененной реактивности организма при формировании  
алкогольной/наркотической зависимости**  
(заполните пустую ячейку)

Толерантность	Исчезновение защитных знаков
Изменение формы потребления	

**Укажите правильный ответ:**

Исчезновение защитного рвотного рефлекса характерно для одной из следующих стадий алкоголизма:

1. Для начальной (первой) стадии
2. Для средней (второй) стадии
3. Для конечной (третьей) стадии
4. Может отмечаться на любой стадии

**Укажите правильный ответ:**

Для начальной (первой) стадии алкоголизма характерно:

1. Интолерантность
2. Высокая толерантность на протяжении длительного отрезка времени («плато толерантности»)
3. Непереносимость спиртного
4. Рост толерантности к алкоголю

**Укажите правильный ответ:**

Для неврозоподобных проявлений на начальной стадии алкоголизма характерно:

1. Физическая зависимость
2. Чувство психологического дискомфорта
3. Психическая зависимость
4. Чувство физического недомогания

**Укажите правильный ответ:**

Что из нижеперечисленного не относится к алкогольным психозам:

1. Алкогольный делирий
2. Алкогольное патологическое опьянение
3. Алкогольный параноид
4. Алкогольный галлюциноз

**Укажите правильный ответ:**

Абстинентный синдром развивается после прекращения приема опиатов в среднем через:

1. 2-3 часа
2. 5-10 часов
3. Сутки
4. Двое суток

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 4

ЗАНЯТИЕ № 7

**Тема № 12. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. Алкоголизм и наркомания.**

**Диагностика алкогольного опьянения включает:**  
(заполните пустую ячейку)

Описание  
психического  
состояния

Описание  
соматических  
нарушений

**Виды металкогольных психозов**  
(заполните пустую ячейку)

Алкогольный  
делирий

Алкогольный  
галлюциноз

**Укажите правильный ответ:**

Тяжело протекающий алкогольный абстинентный синдром может закончиться одним из следующих состояний:

1. Корсаковский психоз
2. Алкогольный галлюциноз
3. Эпилептиформные припадки
4. Алкогольный параноид

**Укажите правильный ответ:**

Для конечной (третьей) стадии алкоголизма характерно:

1. Интолерантность
2. Высокая толерантность на протяжении длительного отрезка времени («плато толерантности»)
3. Патологическое опьянение
4. Рост толерантности к алкоголю

**Укажите правильный ответ:**

Какие симптомы свидетельствуют о тяжелом неблагоприятном течении белой горячки (алкогольного делирия):

1. Резкое психомоторное возбуждение
2. Полное отсутствие продуктивного контакта с больным
3. Обильные сценopodobные истинные галлюцинации
4. Физическая слабость, возбуждение, ограниченное пределами постели

**Укажите правильный ответ:**

Мужчина 37 лет поступает на лечение с жалобами на бессонницу, анорексию, головные боли, сердцебиение, одышку, возникшие после прекращения алкоголизации. Более 10 лет злоупотребляет алкоголем, последнее время может выпивать большие дозы алкоголя,

заметно не пьянея. Неоднократно появлялся на работе с запахом алкоголя. Наиболее вероятный диагноз:

1. Начальная (первая) стадия алкоголизма
2. Средняя (вторая) стадия алкоголизма
3. Конечная (третья) стадия алкоголизма
4. Пагубное, с вредными последствиями, злоупотребление алкоголем.

**Укажите правильный ответ:**

Для какой абстиненции характерны интенсивные мышечные и суставные боли, чихание, слезотечение, боли в животе и диарея:

1. Барбитуровой
2. Кокаиновой
3. Амфетаминовой
4. Опийной

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_



ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 5

ЗАНЯТИЕ № 7

**Тема № 12. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. Алкоголизм и наркомания.**

**Изменения психического состояния в состоянии опьянения**

(заполните пустую ячейку)

Изменение привычного поведения	Перепады настроения
Нарушение когнитивных процессов	

**Виды хронической алкогольной энцефалопатии, сопровождающейся психическими нарушениями**

(заполните пустую ячейку)

Корсаковский психоз	
---------------------	--

Укажите наиболее точное определение понятия «низкая толерантность к алкоголю (интолерантность)»:

1. Чрезвычайно выраженное влечение к алкоголю
2. Тяжелое абстинентное состояние после алкоголизации
3. Возникновение оглушенных форм опьянения после приема малых доз алкоголя
4. Слабоволие, невозможность отказаться от приема алкоголя

**Укажите правильный ответ:**

Основным объективным признаком опийного опьянения является:

1. Узкие, «точечные» зрачки
2. Ровное настроение
3. Учащенное дыхание
4. Сухость слизистых и кожи

**Укажите правильный ответ:**

Мужчина 42 лет, с 18 лет злоупотребляет алкоголем. Употребляет суррогаты алкоголя. Последние годы пьет в течение суток многократно малыми дозами. Отмечается снижение болевой чувствительности на ступнях, нарушение походки. Отмечаются расстройства памяти: не знает текущей даты, не может вспомнить того, что происходило несколько минут назад. Наиболее вероятный диагноз:

1. Корсаковский синдром
2. Алкогольный делирий
3. Алкогольная деменция
4. Алкогольный психоз Гайе-Вернике

**Укажите правильный ответ:**

Для конечной (третьей) алкоголизма характерны следующие симптомы:

1. Неврозоподобные
2. Психопатоподобные
3. Энцефалопатические
4. Аффективные

**Укажите правильный ответ:**

К симптомам интоксикации кокаином относятся все перечисленные, кроме:

1. Выраженной эйфории
2. Ощущения повышенных возможностей
3. Гиперактивности
4. Отрешенности

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 6

ЗАНЯТИЕ № 7

**Тема № 12. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. Алкоголизм и наркомания.**

**Неврологические нарушения в состоянии алкогольного опьянения**  
(заполните пустую ячейку)

Нарушения зрачковых реакций

**Основные типы эффектов наркотических веществ**  
(заполните пустую ячейку)

Седативный

Психостимулирующий

**Укажите правильный ответ:**

Какой из нижеперечисленных алкогольных психозов представляет собой тяжелую энцефалопатию:

1. Алкогольный параноид
2. Алкогольный галлюциноз
3. Алкогольный делирий
4. Алкогольный психоз Гайе-Вернике

**Укажите правильный ответ:**

Мужчина 37 лет употребляет алкоголь с 18 лет. Последние 4 года пьет практически ежедневно. Толерантность возросла до 800 мл водки в сутки. Отмечаются амнестические формы опьянения. В дни вынужденного воздержания от алкоголизации бывает раздражителен, плохо спит ночью, повышается артериальное давление. Наиболее вероятный диагноз:

1. Начальная (первая) стадия алкоголизма
2. Средняя (вторая) стадия алкоголизма
3. Конечная (третья) стадия алкоголизма
4. Пагубное, с вредными последствиями, злоупотребление алкоголем.

**Укажите правильный ответ:**

У больного, длительное время страдающего алкоголизмом, в течение всего периода пребывания в больнице сохранялась правильная ориентировка в месте, времени и собственной личности. Это, безусловно, свидетельствует против:

1. Алкогольного делирия
2. Алкогольного галлюциноза
3. Корсаковского психоза
4. Алкогольного параноида

**Укажите правильный ответ:**

Мужчина 35 лет, длительное время злоупотребляет алкоголем. Испытывает постоянную тягу к спиртному. Последние месяцы стал придирчив и подозрителен, постоянно упрекает

жену в распущенности. Проверяет ее сумку. Заявляет, что «выведет ее на чистую воду». Угрожал расправой, требовал признания в измене. Наиболее вероятный диагноз:

1. Алкогольная деградация личности
2. Психопатизация личности в связи с алкоголизмом
3. Алкогольный делирий
4. Алкогольный параноид

**Укажите правильный ответ:**

К галлюциногенам относятся все перечисленные средства, кроме:

1. Производных лизергиновой кислоты (LSD)
2. Псилобицина
3. Метадона
4. Гашиша

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 7

ЗАНЯТИЕ № 7

**Тема № 12. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. Алкоголизм и наркомания.**

**Основные вегетативные нарушения в состоянии алкогольного опьянения**

(заполните пустую ячейку)

Изменение частоты сердечных сокращений

Изменение кровяного давления

Гипергидроз

**Структура корсаковского синдрома алкогольного генеза**

(заполните пустую ячейку)

Фиксационная амнезия

Конфабуляции

**Укажите правильный ответ:**

Существенным признаком патологического алкогольного опьянения является следующий:

1. Отсутствие взаимосвязи с количеством принятого алкоголя
2. Возникновение у субъекта, страдающим хроническим алкоголизмом
3. Психотический характер опьянения
4. Затяжной характер психических расстройств в периоде отрезвления

**Укажите правильный ответ:**

Аддиктивное поведение у подростков – это:

1. Эпизодический прием психоактивных веществ самых разных химических групп
2. Асоциальное поведение
3. Пристрастие к какому-либо психоактивному веществу
4. Состояние зависимости

**Укажите правильный ответ:**

Для конечной (третьей) стадии алкоголизма характерно одно из следующих проявлений:

1. Постоянный (перманентный) характер пьянства
2. Эпизодический эксцессивный характер пьянства (эксцесс)
3. Запойный характер пьянства
4. Ситуативный прием спиртного

**Укажите правильный ответ:**

Какое из ниже перечисленных ниже психоактивных веществ обладает наибольшим психотическим эффектом (вызывает патологическое опьянение):

1. Препараты опийной группы (морфин, героин и пр.)
2. Гашиш
3. Кокаин
4. Алкоголь

**Укажите правильный ответ:**

Какое из следующих психотропных средств может вызвать психоз, который можно ошибочно диагностировать как параноидную шизофрению:

1. барбитураты;
2. героин;
3. бензодиазепины;
4. амфетамины;
5. аминазин.

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 8

ЗАНЯТИЕ № 7

**Тема № 12. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. Алкоголизм и наркомания.**

**Проявления психической зависимости**

(заполните пустую ячейку)

Обсессивное влечение к приему  
алкоголя (наркотика)

**Виды тяжелого алкогольного делирия (острые алкогольные энцефалопатии)**

(заполните пустую ячейку)

Мусситирующий делирий

**Укажите правильный ответ:**

При каком уровне вовлечения в пьянство можно говорить о формировании алкогольной зависимости:

1. Эпизодическое злоупотребление алкоголя
2. Систематическое злоупотребление алкоголя
3. Частое употребление алкоголя
4. Ситуативное употребление алкоголя

**Укажите правильный ответ:**

Толерантность при наркомании сопровождается следующими проявлениями:

1. Нарастанием дозы наркотического вещества
2. Частым возникновением состояний передозировки
3. Ослаблением зависимости к наркотику
4. Личностными изменениями (деградация)

**Укажите правильный ответ:**

Из ниже перечисленных психоактивных веществ, выберите то, которое вызывает наибольшее пристрастие и в короткий срок:

1. Гашиш
2. Никотин
3. Амфетамин
4. Кокаин

**Укажите правильный ответ:**

Основным мотивом приема психоактивных веществ у подростков является:

1. Колебания настроения
2. Поиск острых ощущений
3. Проблемы в семье
4. Генетическая предрасположенность

**Укажите правильный ответ:**

Правильные положения по поводу возможного влияния генетического фактора в возникновении первичного алкоголизма включают следующие, кроме:

1. конкордантность по алкоголизму выше у монозиготных, чем у дизиготных близнецов;
2. у детей, отделенных в раннем детском возрасте от их родителей-алкоголиков, отмечается более высокая частота алкоголизма, чем у их сверстников (от непьющих родителей);
3. среди детей, родители которых не страдали алкоголизмом, усыновленных алкоголиками, в зрелом возрасте не отмечается повышенной частоты алкоголизма;
4. отмечается повышенная реакция на этанол у сыновей и дочерей отцов-алкоголиков.

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_



ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 9

ЗАНЯТИЕ № 7

**Тема № 12. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. Алкоголизм и наркомании.**

**Проявления физической зависимости**

(заполните пустую ячейку)

Наличие патологической  
соматической симптоматики в  
период воздержания

**Формы злоупотребления психоактивными веществами**

(заполните пустую ячейку)

Наркомании (полинаркомании)

**Укажите правильный ответ:**

Первым объективным симптомом абстиненции при опийной наркомании является:

1. Узкие, «точечные» значки
2. Тремор, озноб
3. Зевота, насморк
4. Пониженное настроение

**Укажите правильный ответ:**

Для алкогольного абстинентного синдрома характерно все перечисленное, кроме:

1. Потливость
2. Тахикардия
3. Тремор пальцев рук
4. Заложенность носа и ринорея

**Укажите правильный ответ:**

Для соматических последствий алкоголизма в 3 стадии заболевания характерно все перечисленное, кроме:

1. Жировая дистрофия печени
2. Кардиомиопатия
3. Полинейропатия
4. Остеопороз

**Укажите правильный ответ:**

О возможности перехода алкогольного абстинентного синдрома в алкогольный психоз свидетельствует все перечисленное, кроме:

1. Углубление бессонницы
2. Нарастание тревоги
3. Иллюзии
4. Сниженное настроение

**Укажите правильный ответ:**

35-летний мужчина, спотыкаясь, заходит в палату неотложной помощи. Его пульс достигает 100 уд/мин, а артериальное давление – 170/90 мм рт. ст., кроме того, у него отмечаются выраженная потливость, тремор, трудности при изложении анамнеза. Он не спит в течение последних двух ночей и принимает занавеску за привидение в комнате; отмечает алкоголизацию с 19-летнего возраста, но заявляет, что не пил 4 дня.

Наиболее вероятным диагнозом является:

1. похмельный синдром
2. алкогольный делирий (delirium tremens);
3. последствия хронической алкогольной интоксикации
4. алкогольная энцефалопатия

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 10

ЗАНЯТИЕ № 7

**Тема № 12. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. Алкоголизм и наркомания.**

**Психические проявления синдрома зависимости**

(заполните пустую ячейку)

Тревога

Депрессия

**Структура алкогольного делирия (психические нарушения)**

(заполните пустую ячейку)

Помрачение сознания

Галлюцинации/иллюзии

Нарушение сна

**Укажите правильный ответ:**

Содержание бреда острого алкогольного параноида обычно представлено:

1. Бредом преследования
2. Бредом Котара
3. Бредом отравления
4. Бредом воздействия

**Укажите правильный ответ:**

Психическое (первичное, обсессивное) влечение к алкоголю в 1 стадии алкоголизма:

1. Обусловлено влечением
2. Не связано с ситуациями традиционного употребления алкоголя
3. Сопровождается борьбой мотивов
4. Не сопровождается борьбой мотивов

**Укажите правильный ответ:**

Психическая зависимость при алкоголизме находит отражение во всем перечисленном, кроме:

1. В ежедневном приеме алкоголя
2. В обсессивном характере влечения
3. В психическом дискомфорте в случае препятствия реализации влечения
4. В предвкушении предстоящего удовольствия выпить

**Укажите правильный ответ:**

Физическое (вторичное, компульсивное) патологическое влечение к алкоголю возникает:

1. В состоянии устойчивой ремиссии
2. Во время алкогольного эксцесса
3. Только у больных алкоголизмом 3 (конечной) стадии
4. У всех больных алкоголизмом, начиная с 1 стадии

**Укажите правильный ответ:**

Все следующие утверждения по поводу алкоголизма верны, кроме:

1. современные классификации алкогольных расстройств базируются на этиологических факторах;
2. для выявления алкоголизма большее значение имеют последствия применения алкоголя, чем истинное количество употребляемого алкоголя;
3. культуральная среда может влиять на заболеваемость алкоголизмом;
4. тенденция к семейной предрасположенности к алкоголизму хорошо известна;
5. описанная частота алкоголизма у женщин значительно ниже, чем у мужчин.

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_