

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 1

ЗАНЯТИЕ № 9

Тема № 14. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства.

Тема № 15. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.

**Острые психогенные реакции на стресс**

(заполните пустую ячейку)

Аффективно-шоковые реакции  
(ступор, возбуждение)

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Пуэрилизм - это

**Для какого вида личностного расстройства типично следующее описание:**

(заполните пустую ячейку)

Безосновательные подозрения, что окружающие используют, обманывают больного или причиняют ему вред. Чрезмерная чувствительность к неудачам и отказам

**Укажите правильный ответ:**

Какие психотравмирующие ситуации обычно являются причиной возникновения острых аффективно-шоковых реакций:

1. Катастрофы, угрожающие жизни человека
2. Тяжелая продолжительная болезнь у близкого человека
3. Стихийные бедствия
4. Тюремное заключение

**Укажите правильный ответ:**

Какие черты характера пациента предрасполагают к формированию невроза навязчивых состояний:

1. Вспыльчивость, раздражительность
2. Замкнутость, склонность к самоанализу (рефлексия)
3. Быстрая истощаемость, утомляемость
4. Тревожность, мнительность

**Укажите правильный ответ:**

Какие симптомы характерны для невроза навязчивых состояний:

1. Головные боли по типу «обруча»
2. Ритуалы
3. Чувство «комка» в горле
4. Проявления вегето-сосудистой дистонии

**Укажите правильный ответ:**

Женщина 35 лет, домохозяйка, пережила пылкую влюбленность в друга своего мужа. К разводу с мужем не стремилась, так как высоко ценила его заботу о семье. На этом фоне появились упорные головные боли, беспричинные обмороки, боли в области сердца, усиливающиеся при сексуальных контактах с мужем. Обследование у терапевта не выявило патологии. Наиболее вероятный диагноз:

1. Неврастенический невроз
2. Истерический невроз
3. Диэнцефальный синдром
4. Депрессивный синдром

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 2

ЗАНЯТИЕ № 9

Тема № 14. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства.

Тема № 15. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.

**Острые истерические психозы**

(заполните пустую ячейку)

Пуэрилизм

Истерические сумерки (трансы)

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Ганзера синдром - это

**Для какого вида личностного расстройства типично следующее описание:**

(заполните пустую ячейку)

← Нежелание иметь близкие отношения с окружающими и отсутствие радости от таких отношений, включая отношения с членами семьи. Выбор только индивидуальной деятельности.

**Укажите правильный ответ:**

Нижеследующие симптомы характерны для аффективно-шоковых реакций, исключая:

1. Хаотичное возбуждение
2. Сужение сознания
3. Детскость и дурашливость поведенческих реакций
4. Ступор

**Укажите правильный ответ:**

Исчезновение способности говорить (мутизм) после психотравмирующей ситуации при сохранении способности слышать, при отсутствии указаний на сосудистое заболевание мозга указывает на следующий диагноз:

1. Неврастенический невроз
2. Истерический невроз
3. Шизофренический аутизм
4. Депрессивный ступор

**Укажите правильный ответ:**

Клаустрофобия и агорафобия характерны для следующих состояний:

1. Неврастенический невроз
2. Истерический невроз
3. Невроз навязчивых состояний
4. Депрессивный невроз

**Укажите правильный ответ:**

Мужчина 30 лет с суицидальной целью принял 50 таблеток феназепам. После успешных реанимационных мероприятий сообщил, что причиной суицида было состояние тоски, связанное с известием о смерти младшей сестры, покончившей с собой. Какие из нижеперечисленных заболеваний могли быть причиной депрессии у данного больного:

1. Биполярное аффективное расстройство
2. Реактивная депрессия
3. Шизоаффективное расстройство
4. Невротическая депрессия

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 3

ЗАНЯТИЕ № 9

Тема № 14. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства.

Тема № 15. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.

**Затяжные психогенные реакции на стресс**

(заполните пустую ячейку)

Реактивная депрессия

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Невротическая гиперстезия - это

**Для какого вида личностного расстройства типично следующее описание:**

(заполните пустую ячейку)

← Неспособность соблюдать принятые в обществе нормы поведения и вести себя в соответствии с законом. Склонность ко лжи, частые и повторные обманы, стремление получить личную выгоду или удовольствие с игнорированием интересов окружающих.

**Укажите правильный ответ:**

Какие психотравмирующие ситуации обычно являются причиной возникновения неврозов:

1. Внезапная смерть близкого человека
2. Профессиональные нагрузки
3. Конфликтные отношения с близкими людьми
4. Конфликтная внешняя ситуация (например, судебное разбирательство)

**Укажите правильный ответ:**

В формировании психической травмы имеет значение все перечисленное, кроме:

1. Тяжесть психотравмирующего фактора
2. Личностные особенности
3. Эмоциональная значимость психотравмирующего фактора
4. Снижение интеллекта

**Укажите правильный ответ:**

Неврозы являются:

1. Психическим расстройством непсихотического уровня
2. Психическим расстройством психотического уровня
3. Болезнью с обязательным присутствием депрессии
4. Ничем из перечисленного

**Укажите правильный ответ:**

Больной 45 лет, перенес инфаркт миокарда. Постинфарктный период протекал без осложнений. Во время проведения нагрузочной пробы - бурная вегетативная реакция со страхом остановки сердца. После этого отказывается от расширения двигательного режима, боится оставаться без медицинского персонала. Испытывает страх "остановки сердца". Понимая необоснованность страхов, заявляет, что не может их преодолеть. Появление страха сопровождается сердцебиением, ощущением замирания сердца, потоотделением.

А. Дайте квалификацию состояния больного:

1. Астенический синдром
2. Истерический синдром
3. Ипохондрический синдром
4. Астено-депрессивный синдром
5. Фобический синдром

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 4

ЗАНЯТИЕ № 9

Тема № 14. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства.

Тема № 15. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.

**Основные виды неврозов**

(заполните пустую ячейку)

Неврастения

Психастения

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Невротическая гипералгия- это

**Для какого вида личностного расстройства типично следующее описание:**

(заполните пустую ячейку)

← Необыкновенно сильная эмоциональная возбудимость, периодически возникающие дисфории, напряженное состояние инстинктивной сферы, полярность проявления аффективных реакций.

**Укажите правильный ответ:**

Для неврастении характерно все перечисленное, кроме:

1. Гиперстеническая астения
2. Вегетативные расстройства
3. Дисфории
4. Нарушения сна

**Укажите правильный ответ:**

Невроз навязчивых состояний проявляется все перечисленным, кроме:

1. Развитием фобий
2. Бредом ипохондрического содержания
3. Астеническими расстройствами
4. Ритуалами

**Укажите правильный ответ:**

Воспитание в условиях повышенной тревожности, чрезмерной ответственности, подавления естественной детской живости и непосредственности способствует развитию:

1. Невротической астении
2. Невротической депрессии
3. Невротических навязчивостей
4. Невротической ипохондричности

**Укажите правильный ответ:**

Больной Н. 39 лет, страдает хр. гастродуоденитом. Очередное обострение сопровождалось абдоминальными болями, снижением аппетита, похуданием, тошнотой. Наряду с повышенной утомляемостью и снижением работоспособности появились мысли об онкопатологии. Настойчиво просил врачей о проведении дополнительного обследования. В процессе лечения купировался болевой синдром, восстановился прежний вес, уменьшилась выраженность астении. Однако, опасения "ракового перерождения" сохраняются. При актуализации страха становится назойливым. При разубеждении соглашается с необоснованностью страха, заявляет, что сам "прогнать мысли о раке" не может.

А. Дайте квалификацию состоянию больного:

1. Астенический синдром
2. Истерический синдром
3. Депрессивно-параноидный синдром
4. Астено-депрессивный синдром
5. Ипохондрический синдром

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 5

ЗАНЯТИЕ № 9

Тема № 14. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства.

Тема № 15. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.

**Основные виды соматоформного расстройства**

(заполните пустую ячейку)

Хроническое болевое расстройство

Дисфункция вегетативной сердечно-сосудистой системы

Дисфункция вегетативной системы желудочно-кишечного тракта

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Невротическая полиурия - это

**Для какого вида личностного расстройства типично следующее описание:**

(заполните пустую ячейку)

← Самодраматизация, театральность и преувеличенное выражение эмоций. Ощущение дискомфорта в ситуациях, когда пациент не является объектом внимания  
Лабильность и поверхностность эмоциональных переживаний.

**Укажите правильный ответ:**

При гипопеке чаще формируются:

1. Шизоидные черты характера
2. Аффективная неустойчивость
3. Психастенические черты характера
4. Паранойяльные черты характера

**Укажите правильный ответ:**

Для развития невроза первостепенное значение имеет:

1. Хроническое соматическое заболевание
2. Внутриличностный конфликт
3. Слабость иммунной системы
4. Органическая неполноценность

**Укажите правильный ответ:**

К истерическим реактивным психозам относятся все перечисленное, кроме:

1. Истерические сумеречные помрачения сознания
2. Псевдодеменция
3. Пуэрилизм
4. Реактивный параноид

**Укажите правильный ответ:**

В диспансер обратилась больная К., 28 лет с жалобами на то, что ее после общения с подругой, перенесшей операцию, преследует мысль о раке молочной железы. Онколог патологии не обнаружил. Понимая, что причин для беспокойств нет, не может заставить себя не думать об этом. Последнее время похудела, быстро устает, жалуется на бессонницу, тревогу, раздражительность, плохой аппетит. Считает себя психически больной. Просит о помощи.

А. Квалифицируйте синдром:

1. Синдром сверхценных идей
2. Обсессивный синдром
3. Бредовой синдром
4. Астенический синдром

Б. Сформулируйте предположительный диагноз:

1. Невроз навязчивых состояний
2. Реактивный параноид
3. Шизофрения
4. Истерический невроз

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 6


ЗАНЯТИЕ № 9

Тема № 14. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства.

Тема № 15. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.


**Причины стрессовых и невротических расстройств**

(заполните пустую ячейку)




**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)



**Для какого вида личностного расстройства типично следующее описание:**

(заполните пустую ячейку)



**Укажите правильный ответ:**

К невротическим синдромам относятся все перечисленные, кроме:

1. Фобического
2. Астенического
3. Психоорганического синдрома
4. Обсессивного

**Укажите правильный ответ:**

К этиологическим факторам невротических состояний относят все перечисленное, кроме:

1. Некоторые особенности воспитания и семейного положения
2. Факторы, связанные с профессией и трудовой деятельностью
3. Особенности родительской семьи
4. Частые черепно-мозговые травмы в анамнезе

**Укажите правильный ответ:**

Для истерического невроза свойственно все перечисленное, кроме:

1. Полиморфизм симптоматики
2. Расстройства чувствительности
3. Двигательные расстройства
4. Галлюцинаторные расстройства

**Укажите правильный ответ:**

Больному 29 лет. Самостоятельно обратился за помощью к психотерапевту. Ранее никаких отклонений у себя не отмечал. Последние недели после смерти близкого родственника постоянно ловит себя на мысли, что может заразиться туберкулезом, дизентерией и другими инфекциями. В связи с этим стал очень часто мыть руки (30-40 раз в день), протирать дверные ручки, мебель. В беседе адекватен, подчеркивает, что понимает нелепость своего поведения, но не может освободиться от мысли, что на руках случайно оказалась опасная инфекция. Больной тревожен, просит о помощи, обращает внимание врача на то, что все свободное время у него уходит на мучительные размышления, что за последний год похудел, плохо засыпает. Быстро истощается в беседе. Хорошо поддается психотерапевтическому воздействию.

А. Определите синдром:

1. Параноидный
2. Синдром навязчивых состояний
3. Синдром сверхценных идей
4. Астенический

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_


ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 7

ЗАНЯТИЕ № 9

Тема № 14. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства.  
Тема № 15. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.

Этиологические факторы личностной патологии (психопатий) и невротических расстройств  
(заполните пустую ячейку)



Дайте определение понятию  
(заполните пустую ячейку)

Энурез - это

[Empty box for defining the term]

Для какого вида личностного расстройства типично следующее описание:  
(заполните пустую ячейку)

[Empty box for identifying the disorder]

Озабоченность сомнениями в лояльности или надежности друзей или коллег  
Нежелание больного доверять другим из-за необоснованности страха, что информация будет использована против него. Переживание своей повышенной значимости

Укажите правильный ответ:

При воспитании по типу "кумир семьи" чаще формируется:

1. Повышенная аффективная возбудимость
2. Психастенические черты характера
3. Псевдошизоидные черты характера
4. Истерические черты характера

Укажите правильный ответ:

Экстравертированность, стремление быть в центре внимания окружающих характерны для:

1. Астенической психопатии
2. Психастении
3. Истерической психопатии
4. Психопатии возбудимого круга

**Укажите правильный ответ:**

Стойкая тотальная дисгармония личности характерна для:

1. Истерической психопатии
2. Паранойяльной психопатии
3. Только для указанных выше вариантов психопатии
4. Вообще для всех видов психопатии

**Укажите правильный ответ:**

Больной Д. 35 лет совершил кражу. В зале суда был тревожен, растерян, вел себя нелепо. На вопрос о возрасте ответил - "5", на вопрос: "Как вас зовут?", ответил - "не знаю". При просьбе что-нибудь написать, сказал, что не умеет. Демонстрировал счет только до 10. Путал названия предметов, жаловался, что у него болит голова, что "очень трудно думать".

А. Квалифицируйте состояние больного :

1. Псевдодеменция истерическая
2. Реактивный параноид
3. Аффективно-шоковая реакция
4. Реактивная депрессия

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 8

ЗАНЯТИЕ № 9

Тема № 14. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства.

Тема № 15. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.

Этапы развития личности в онтогенезе

(заполните пустую ячейку)



Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Ятрогенный невроз - это

Для какого вида личностного расстройства типично следующее описание:

(заполните пустую ячейку)

Устойчивое недоброжелательное отношение к окружающим, неспособность прощать обиды или неуважение. Тенденция постоянно быть недовольным кем-то, неумение прощать. Ложное убеждение пациента, что кто-то угрожает его репутации, и реакция на это в виде злобы или агрессии. Войниственно-щепетильное отношение к вопросам, связанным с правами личности.

Укажите правильный ответ:

Мучительные сомнения при необходимости принять решение характерны для:

1. Шизоидной психопатии
2. Психастении
3. Пассивно-зависимого личностного расстройства
4. Неустойчивой психопатии

Укажите правильный ответ:

Нарушения каких сфер психики характерны для всех психопатий:

1. Сфера восприятия
2. Эмоциональная сфера

3. Сфера мышления
4. Сфера психомоторики

**Укажите правильный ответ:**

Какие из психопатических личностей чаще других совершают асоциальные поступки:

1. Сензитивные шизоиды
2. Неустойчивые
3. Психастеники
4. Стеничные шизоиды

**Укажите правильный ответ:**

Больная днем в присутствии родственников после конфликта упала на диван, закатила глаза. Вскоре у нее появились тонические судороги в руках, которые продолжались 5 минут и сменились клоническими судорогами всего тела, без прикуса языка, самопроизвольного мочеиспускания не наблюдалось. В момент припадка реакция зрачков на свет были сохранены. Весь припадок длился 15 минут.

А. Как правильно квалифицировать это состояние:

1. Генерализованный тонико-клонический припадок
2. Джексоновский припадок
3. Истерический припадок

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 9

ЗАНЯТИЕ № 9

Тема № 14. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства.

Тема № 15. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.

**Основные виды специфических расстройств личности**

(заполните пустую ячейку)

Параноидное

Шизоидное

Эмоционально-неустойчивое

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Маскированная депрессия - это

**Для какого вида личностного расстройства типично следующее описание:**

(заполните пустую ячейку)



Ограниченный круг деятельности или полное отсутствие интереса к какой-либо деятельности. Отсутствие близких друзей или приятелей. Эмоциональная холодность, обособленность, отчужденность.

**Укажите правильный ответ:**

Высокая подверженность асоциальному влиянию окружающих характерна для:

1. Неустойчивой психопатии
2. Истерической психопатии
3. Обоих вариантов психопатий
4. Ни для одного из вышеуказанных вариантов

**Укажите правильный ответ:**

Склонность к формированию сверхценных идей характерна для:

1. Истерической психопатии
2. Паранойяльной психопатии
3. Для обоих вышеуказанных вариантов

4. Для психопатий не характерно

**Укажите правильный ответ:**

Высокая стеничность, целеустремленность, настойчивость в достижении поставленной цели, характерны для:

1. Истерической психопатии
2. Возбудимой (эксплозивной) психопатии
3. Паранойяльной психопатии
4. Для всех перечисленных вариантов

**Укажите правильный ответ:**

Больной, 34 лет обратился к психиатру по своей инициативе. В беседе тревожен, легко волнуется, бросается в глаза неуверенность больного в изложении анамнестических сведений и жалоб. С младших классов отличался повышенной мнительностью, тревожностью, непрактичностью, неспособностью принять решение, познакомиться с понравившимся человеком. При хороших знаниях чрезмерно волновался при ответах на экзаменах, дома постоянно мучительно анализировал неудачные ответы, всегда во всем винил себя. После конфликта в семье плохо засыпает, не знает чем занять себя, мучительно анализирует "как жить правильно", но так и не находит правильного решения. Похудел, быстро устает на работе, появилась несвойственная ранее раздражительность.

А. Сформулируйте предположительный диагноз:

Шизоидное расстройство личности

Невроз навязчивых состояний

Психастеническое расстройство личности

Истерическое расстройство личности

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 10

ЗАНЯТИЕ № 9

Тема № 14. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства.

Тема № 15. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.

**Классификация (базовая) парафилий**

(заполните пустую ячейку)

Нарушения сексуального предпочтения

Шизоидное

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Органый невроз - это

**Для какого вида личностного расстройства типично следующее описание:**

(заполните пустую ячейку)



Безнравственность («моральное помешательство»). Неспособность к сочувствию, даже к близким, ранняя асоциальность. Полное отсутствие чувства долга. Безответственное отношение к своим обязанностям, начиная с подросткового возраста.

**Укажите правильный ответ:**

Развитие сверхценных идей ипохондрического содержания, сопровождающееся кверуляторным поведением, характерно для:

1. Истерической психопатии
2. Паранойяльной психопатии
3. Возбудимой (эксплозивной) психопатии
4. Шизоидной психопатии

**Укажите правильный ответ:**

Замкнутость, затруднения в контактах с окружающими характерны для:

1. Астенической психопатии
2. Психастении

3. Шизоидной психопатии
4. Психопатии возбудимого круга

**Укажите правильный ответ:**

Склонность ко лжи характерна для:

1. Истерической психопатии
2. Неустойчивой психопатии
3. Обоих вариантов психопатий
4. Ни для одного из вышеуказанных вариантов

**Укажите правильный ответ:**

Капризная и требовательная 25-летняя женщина обращается к психотерапевту, заявляя, что ей скучно и она в отчаянии. У нее в анамнезе на протяжении 5 или 6 лет отмечаются эпизодические короткие вспышки тревоги и депрессии, несколько демонстративных суицидальных попыток, импульсивное и защитное поведение и беспорядочные половые связи. Она думает, что, может быть, она лесбиянка, хотя большинство ее половых связей было с мужчинами. Она резко обрывала две предшествующие попытки психотерапии, когда сталкивалась с нежеланием терапевта выписать ей транквилизаторы. Какой диагноз наиболее вероятен:

1. параноидное расстройство личности
2. истерическое расстройство личности
3. антисоциальное расстройство личности
4. шизоидное расстройство личности.

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_