

МПД-19

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Кафедра микробиологии

УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания
Центрального
координационного
учебно-методического
совета
от «23» мая 2023 г. № 5.

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
по дисциплине
Микробиология, вирусология, имmunология**

основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы специалитета по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело,
утвержденной 24.05.2023 г.

для студентов - 2-3 курсов

по специальности - 32.05.01 Медико-профилактическое дело

**Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры -
- от 15 мая 2023 г., протокол №10**

Зав. кафедрой микробиологии, д.м.н., доцент _____ И.Е. Третьякова

Владикавказ 2023 г.

СТРУКТУРА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Титульный лист
2. Структура оценочных материалов
3. Рецензии на оценочные материалы
4. Паспорт оценочных материалов
5. Комплект оценочных материалов:
 - вопросы к модулям
 - вопросы к экзамену
 - банк ситуационных задач
 - банк практических заданий/деловых игр
 - эталоны тестовых заданий (с титульным листом и оглавлением)
 - экзаменационные билеты

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации**

**РЕЦЕНЗИЯ
на оценочные материалы**

по дисциплине «Микробиология, вирусология, иммунология»

для студентов медико-профилактического факультета **2-3 курсов**

по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело»

Оценочные материалы составлены на кафедре микробиологии на основании рабочей программы дисциплины «Микробиология, вирусология, иммунология» и соответствуют требованиям ФГОС ВО по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело».

Оценочные материалы включают в себя:

- вопросы к модулю,
- вопросы к экзамену,
- банк ситуационных задач,
- эталоны тестовых заданий (с титульным листом и оглавлением),
- экзаменационные билеты.

Банк ситуационных задач включает в себя сами задания и шаблоны ответов.

Все тестовые задания соответствуют рабочей программе дисциплины «Микробиология, вирусология, иммунология», формируемым при ее изучении компетенциям, и охватывают все ее разделы. Сложность заданий варьируется. Количество заданий по каждому разделу дисциплины достаточно для проведения контроля знаний и исключает многократное повторение одного и того же вопроса в различных вариантах. Эталоны содержат ответы ко всем тестовым заданиям.

Количество экзаменационных билетов достаточно для проведения экзамена и исключает неоднократное использование одного и того же билета во время экзамена в течение одного дня. Экзаменационные билеты выполнены на бланках единого образца по стандартной форме, на бумаге одного цвета и качества. Экзаменационный билет включает в себя 3 вопроса. Формулировки вопросов совпадают с формулировками перечня вопросов, выносимых на экзамен. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам рабочей программы дисциплины, позволяющее более полно охватить материал дисциплины. Сложность вопросов в экзаменационных билетах распределена равномерно.

Дополнительно к теоретическим вопросам предлагается банк ситуационных задач. СITUационные задачи дают возможность объективно оценить уровень усвоения обучающимся теоретического материала при текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации.

Замечаний к рецензируемым оценочным материалам нет.

В целом, оценочные материалы по дисциплине «Микробиология, вирусология, иммунология» способствуют качественной оценке уровня владения обучающимися общепрофессиональными компетенциями.

Рецензируемые оценочные материалы по дисциплине «Микробиология, вирусология, иммунология» могут быть рекомендованы к использованию для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации на медико-профилактическом факультете у обучающихся 2-3 курсов.

Рецензент:

Начальник отдела
эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора
по РСО-Алания



Бекузарова Ф.Т.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации**

**РЕЦЕНЗИЯ
на оценочные материалы**

по дисциплине «Микробиология, вирусология, иммунология»

для студентов медико-профилактического факультета **2-3 курсов**

по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело»

Оценочные материалы составлены на кафедре микробиологии на основании рабочей программы дисциплины «Микробиология, вирусология, иммунология» и соответствуют требованиям ФГОС ВО по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело».

Оценочные материалы включают в себя:

- вопросы к модулю,
- вопросы к экзамену,
- банк ситуационных задач,
- эталоны тестовых заданий (с титульным листом и оглавлением),
- экзаменационные билеты.

Банк ситуационных задач включает в себя сами задания и шаблоны ответов.

Все тестовые задания соответствуют рабочей программе дисциплины «Микробиология, вирусология, иммунология», формируемым при ее изучении компетенциям, и охватывают все ее разделы. Сложность заданий варьируется. Количество заданий по каждому разделу дисциплины достаточно для проведения контроля знаний и исключает многократное повторение одного и того же вопроса в различных вариантах. Эталоны содержат ответы ко всем тестовым заданиям.

Количество экзаменационных билетов достаточно для проведения экзамена и исключает неоднократное использование одного и того же билета во время экзамена в течение одного дня. Экзаменационные билеты выполнены на бланках единого образца по стандартной форме, на бумаге одного цвета и качества. Экзаменационный билет включает в себя 3 вопроса. Формулировки вопросов совпадают с формулировками перечня вопросов, выносимых на экзамен. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам рабочей программы дисциплины, позволяющее более полно охватить материал дисциплины. Сложность вопросов в экзаменационных билетах распределена равномерно.

Дополнительно к теоретическим вопросам предлагается банк ситуационных задач. СITUационные задачи дают возможность объективно оценить уровень усвоения обучающимся теоретического материала при текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации.

Замечаний к рецензируемым оценочным материалам нет.

В целом, оценочные материалы по дисциплине «Микробиология, вирусология, иммунология» способствуют качественной оценке уровня владения обучающимися общепрофессиональными компетенциями.

Рецензируемые оценочные материалы по дисциплине «Микробиология, вирусология, иммунология» могут быть рекомендованы к использованию для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации на медико-профилактическом факультете у обучающихся 2-3 курсов.

Рецензент:

Председатель ЦУМК

естественно-научных и математических дисциплин с подкомиссий экспертизы оценочных материалов, доцент кафедры химии и физики

ВЕРНО: специалист по кадрам отдела
кадров и документооборота
ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России

кадров и документооборота
ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России

ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России

кадров и документооборота
ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России

Дорога впереди.

20 r



Боцисва Н.И.

Паспорт оценочных материалов по дисциплине

Микробиология, вирусология, иммунология

№ п/п	Наименование контролируемого раздела (темы) дисциплины/модуля	Код формируемой компетенции (этапа)	Наименование оценочного материала
1	2	3	4
Вид контроля	Текущий контроль успеваемости/Промежуточная аттестация		
1.	Раздел 1. Общая микробиология. Морфология и ультраструктура микроорганизмов.	ОПК-7	вопросы к модулю, тестовый контроль, экзаменацонные билеты
2.	Раздел 2. Физиология микроорганизмов.	ОПК-7	вопросы к модулю, тестовый контроль, экзаменацонные билеты
3.	Раздел 3. Экология микробов. Нормальная микрофлора организма человека.	ОПК-7	вопросы к модулю, тестовый контроль, экзаменацонные билеты
4.	Раздел 4. Основы генетики микробов. Основы генетической инженерии и медицинской биотехнологии.	ОПК-7	вопросы к модулю, тестовый контроль, экзаменацонные билеты
5.	Раздел 5. Общая вирусология.	ОПК-7	вопросы к модулю, тестовый контроль, экзаменацонные билеты
6.	Раздел 6. Симбиоз человека с микробами. Учение об инфекции.	ОПК-7	вопросы к модулю, тестовый контроль, экзаменацонные билеты
7.	Раздел 7. Медицинская иммунология. Медицинские иммунобиологические препараты.	ОПК-7	вопросы к модулю, банк ситуационных задач, тестовый контроль, экзаменацонные билеты
8.	Раздел 8. Бактерии-возбудители инфекционных заболеваний человека.	ОПК-7	вопросы к модулю, банк ситуационных задач, банк практических заданий/деловых игр, тестовый контроль, экзаменацонные билеты
9.	Раздел 9. Вирусы-возбудители инфекционных заболеваний человека.	ОПК-7	вопросы к модулю, банк ситуационных задач, банк практических заданий/деловых игр, тестовый контроль, экзаменацонные билеты

ВОПРОСЫ К МОДУЛЯМ

ОБЩАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ

МОДУЛЬ № 1

«МОРФОЛОГИЯ, СТРОЕНИЕ И МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОКАРИОТОВ, ЭУКАРИОТОВ»

1. Устройство и оснащение микробиологической лаборатории
2. Правила работы в микробиологической лаборатории
3. Морфология бактерий
4. Ультраструктура бактериальной клетки
5. Размножение бактерий
6. Простые и сложные методы окраски бактерий
7. Правила приготовления мазка
8. Методы обнаружения подвижности бактерий
9. Методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний
10. Отличия прокариотических клеток от эукариотических
11. Строение и методы обнаружения спирохет, микоплазм, актиномицетов, хламидий, риккетсий
12. Морфология грибов
13. Ультраструктура грибов
14. Способы размножения грибов
15. Методы окраски грибов
16. Морфология простейших
17. Ультраструктура простейших
18. Методы окраски простейших

МОДУЛЬ № 2

«ФИЗИОЛОГИЯ МИКРОБОВ. ПРИНЦИПЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ МИКРОБОВ. ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ»

1. Типы питания микроорганизмов
2. Способы поступления питательных веществ в микробную клетку
3. Принципы культивирования микроорганизмов
4. Питательные среды, их классификация
5. Способы стерилизации, аппаратура
6. Бактериологический метод, его этапы
7. Методы выделения чистой культуры микроорганизмов
8. Культуральные свойства микробов
9. Идентификация микробов
10. Ферментативная активность бактерий
11. Способы определения ферментативной активности бактерий
12. Фаготипирование бактерий
13. Антибиотики, классификация антибиотиков
14. Методы определения антибиотикочувствительности бактерий
15. Механизмы возникновения антибиотикорезистентности бактерий
16. Побочное действие антибиотиков
17. Принципы рациональной антибиотикотерапии

МОДУЛЬ № 3
**«УЧЕНИЕ ОБ ИНФЕКЦИИ. МЕДИЦИНСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ. РЕАКЦИИ
ИММУНИТЕТА. ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ»**

1. Инфекция, определение инфекции
2. Условия возникновения инфекции
3. Входные ворота для инфекции
4. Что такое патогенность и вирулентность микроорганизмов?
5. Факторы патогенности микроорганизмов
6. Формы инфекции
7. Периоды инфекционного заболевания
8. Что такое иммунитет?
9. Виды иммунитета
10. Строение иммунной системы человека
11. Функции иммунокомпетентных клеток
12. Механизм развития гуморального иммунитета
13. Механизм развития клеточного иммунитета
14. Что такое иммунологическая память?
15. Строение антител, классы иммуноглобулинов
16. Серологический метод лабораторной диагностики инфекционных заболеваний
17. Что такое серодиагностика? Что такое сероиндикация?
18. Диагностические сыворотки, их получение, классификация, применение
19. Диагностикумы, их получение, классификация, применение
20. Серологические реакции
21. Реакция агглютинации, компоненты, способы постановки
22. Реакция преципитации, компоненты, способы постановки
23. Реакция связывания комплемента, компоненты, механизм
24. Иммуноферментный анализ, компоненты, механизм
25. Реакция иммунофлюoresценции, компоненты, механизм
26. Радиоиммунный анализ, компоненты, механизм
27. Что такое иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных заболеваний?
28. Вакцины, получение, классификация и применение вакцин
29. Лечебные сыворотки, их получение, классификация и применение
30. Способ введения лечебных сывороток
31. Иммуноглобулины, их получение и применение

МОДУЛЬ № 4
**«ЭКОЛОГИЯ МИКРОБОВ. НОРМАЛЬНАЯ МИКРОФЛORA ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА.
МИКРОФЛORA ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ГЕНЕТИКА. ОБЩАЯ
ВИРУСОЛОГИЯ»**

1. Нормальная микрофлора тела человека
2. Что такое дисбактериоз, причины развития дисбактериоза?
3. Микрофлора воздуха, воды, почвы
4. Влияние факторов внешней среды на жизнедеятельность микробов
5. Генетика микроорганизмов
6. Что такое модификации?
7. Что такое мутации?
8. Классификация мутаций
9. Что такое генетические рекомбинации?
10. Что такое трансформация?
11. Что такое трансдукция?
12. Что такое конъюгация?
13. Что такое репарация?

14. ПЦР
15. Вирусы, строение, классификация вирусов
16. Почему вирусы являются абсолютными внутриклеточными паразитами?
17. Типы взаимодействия вирусов с клеткой-хозяином
18. Этапы продуктивного типа взаимодействия вирусов с клеткой-хозяином
19. Бактериофаги, строение бактериофагов
20. Вирулентный и умеренный бактериофаг
21. Что такое профаг?
22. Что такое лизогения?
23. Что такое фаговая конверсия?
24. Каково практическое применение бактериофагов в медицине?
25. Методы обнаружения вирусов
26. Методы культивирования вирусов
27. Методы индикации вирусов
28. Методы идентификации вирусов
29. Методы лабораторной диагностики вирусных инфекций

ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ

МОДУЛЬ № 1 «ПАТОГЕННЫЕ КОККИ»

1. Стaphилококки, характеристика стaphилококков, факторы патогенности стaphилококков, патогенез и клиническая картина стaphилококковой инфекции, лабораторная диагностика, лечение и профилактика стaphилококковой инфекции
2. Стрептококки, характеристика стрептококков, факторы патогенности стрептококков, патогенез и клиническая картина стрептококковой инфекции, лабораторная диагностика, лечение и профилактика стрептококковой инфекции
3. Менингококки, характеристика менингококков, факторы патогенности менингококков, патогенез и клиническая картина менингококковой инфекции, лабораторная диагностика, лечение и профилактика менингококковой инфекции
4. Гонококки, характеристика гонококков, факторы патогенности гонококков, патогенез и клиническая картина гонореи и блenorеи, лабораторная диагностика, лечение и профилактика гонореи и блenorеи.

МОДУЛЬ № 2 «БАКТЕРИИ – ВОЗБУДИТЕЛИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ»

1. Характеристика семейства энтеробактерий
2. Кишечная палочка, характеристика, патогенез и клиническая картина эшерихиозов, лабораторная диагностика, лечение и профилактика эшерихиозов
3. Дизентерийная палочка, характеристика, патогенез и клиническая картина дизентерии, лабораторная диагностика, лечение и профилактика дизентерии
4. Возбудители брюшного тифа и паратифов, характеристика, патогенез и клиническая картина брюшного тифа и паратифов, лабораторная диагностика, лечение и профилактика этих заболеваний
5. Холерный vibrio, характеристика, патогенез и клиническая картина холеры, лабораторная диагностика, лечение и профилактика холеры
6. Возбудитель иерсиниоза, характеристика, патогенез и клиническая картина иерсиниоза, лабораторная диагностика, лечение и профилактика иерсиниоза.

МОДУЛЬ № 3

«ПАТОГЕННЫЕ МИКОБАКТЕРИИ, КОРИНЕБАКТЕРИИ, КЛОСТРИДИИ»

1. Дифтерийная палочка, характеристика дифтерийной палочки, факторы патогенности дифтерийной палочки, патогенез и клиническая картина дифтерии, лабораторная диагностика, лечение и профилактика дифтерии
2. Туберкулезная палочка, характеристика туберкулезной палочки, факторы патогенности туберкулезной палочки, патогенез и клиническая картина туберкулеза, лабораторная диагностика, лечение и профилактика туберкулеза
3. Возбудитель лепры, характеристика, факторы патогенности возбудителя лепры, патогенез и клиническая картина лепры, лабораторная диагностика, лечение и профилактика лепры
4. Возбудители коклюша и паракоклюша, характеристика этих возбудителей, факторы патогенности, патогенез и клиническая картина коклюша и паракоклюша, лабораторная диагностика, лечение и профилактика коклюша и паракоклюша
5. Возбудитель столбняка, характеристика столбнячной палочки, факторы патогенности возбудителя столбняка, патогенез и клиническая картина столбняка, лабораторная диагностика, лечение и профилактика столбняка
6. Возбудители газовой гангрены, характеристика возбудителей газовой гангрены, факторы патогенности возбудителей газовой гангрены, патогенез и клиническая картина газовой гангрены, лабораторная диагностика, лечение и профилактика газовой гангрены
7. Возбудитель ботулизма, характеристика возбудителя, факторы патогенности, патогенез и клиническая картина ботулизма, лабораторная диагностика, лечение и профилактика ботулизма

МОДУЛЬ № 4

«ВОЗБУДИТЕЛИ ЗООНОЗНЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ, ПАТОГЕННЫЕ СПИРОХЕТЫ, РИККЕТИСИИ, ХЛАМИДИИ, МИКОПЛАЗМЫ. ГРИБЫ И ПРОСТЕЙШИЕ – ВОЗБУДИТЕЛИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА»

1. Возбудитель сибирской язвы, характеристика возбудителя сибирской язвы, факторы патогенности возбудителя сибирской язвы, патогенез и клиническая картина сибирской язвы, лабораторная диагностика, лечение и профилактика сибирской язвы
2. Возбудитель чумы, характеристика этого возбудителя, факторы патогенности чумной палочки, патогенез и клиническая картина чумы, лабораторная диагностика, лечение и профилактика чумы
3. Возбудители бруцеллеза, характеристика этих возбудителей, факторы патогенности бруцелл, патогенез и клиническая картина бруцеллеза, лабораторная диагностика, лечение и профилактика бруцеллеза
4. Возбудитель туляремии, характеристика этого возбудителя, факторы патогенности возбудителя туляремии, патогенез и клиническая картина туляремии, лабораторная диагностика, лечение и профилактика туляремии
5. Бледная трепонема, характеристика возбудителя сифилиса, факторы патогенности бледной трепонемы, патогенез и клиническая картина сифилиса, лабораторная диагностика, лечение и профилактика сифилиса
6. Возвратный тиф, характеристика возбудителя возвратного тифа, факторы патогенности боррелий, патогенез и клиническая картина возвратного тифа, лабораторная диагностика, лечение и профилактика возвратного тифа
7. Лептоспироз, характеристика возбудителя лептоспироза, факторы патогенности лептоспир, патогенез и клиническая картина лептоспироза, лабораторная диагностика, лечение и профилактика лептоспироза
8. Возбудители микоплазмозов, их характеристика, факторы патогенности микоплазм, патогенез и клиническая картина микоплазмозов, лабораторная диагностика, лечение и профилактика микоплазмозов
9. Возбудители хламидиозов и эрлихиозов, их характеристика, факторы патогенности хламидий и эрлихий, патогенез и клиническая картина хламидиозов и эрлихиозов, лабораторная диагностика, лечение и профилактика хламидиозов и эрлихиозов

10. Возбудители сыпного тифа, характеристика возбудителей сыпного тифа, факторы патогенности возбудителей сыпного тифа, патогенез и клиническая картина сыпного тифа, лабораторная диагностика, лечение и профилактика сыпного тифа
11. Грибы-возбудители микозов, характеристика грибов, патогенез и клиническая картина микозов, лабораторная диагностика, лечение и профилактика микозов
12. Протозойные инфекции, характеристика простейших, патогенез и клиническая картина протозойных инфекций, лабораторная диагностика, лечение и профилактика протозойных инфекций

МОДУЛЬ № 5

«ВИРУСЫ – ВОЗБУДИТЕЛИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА»

1. Вирусы гриппа, парагриппа, коронавируса, кори, краснухи, эпидемического паротита, adenovirusной инфекции, их характеристика, патогенез и клиническая картина, лабораторная диагностика, лечение и профилактика
2. Вирусы полиомиелита, Коксаки, Эхо, их характеристика, патогенез и клиническая картина полиомиелита и полиомиелитоподобных заболеваний, лабораторная диагностика, лечение и профилактика этих заболеваний
3. Вирусы герпеса, их характеристика, патогенез, клиническая картина, лабораторная диагностика, лечение и профилактика герпетической инфекции
4. Вирусы гепатитов А, В, С, Д, Е, G. Характеристика вирусов. Патогенез и клиническая картина гепатитов. Лабораторная диагностика, лечение и профилактика гепатитов
5. ВИЧ-инфекция. Характеристика ВИЧ. Патогенез и клиническая картина ВИЧ-инфекции. Лабораторная диагностика, лечение и профилактика ВИЧ-инфекции
6. Вирус бешенства, характеристика, патогенез и клиническая картина бешенства, лабораторная диагностика, лечение и профилактика
7. Вирус клещевого энцефалита, характеристика, патогенез и клиническая картина клещевого энцефалита, лабораторная диагностика, лечение и профилактика
8. Онкогенные вирусы, их характеристика, патогенез, клиническая картина, лабораторная диагностика, лечение и профилактика заболеваний, вызываемых онкогенными вирусами

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

ОБЩАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ

1.Морфология микроорганизмов

1. Основные принципы классификации микробов.
2. Морфологические и тинкториальные свойства бактерий. Методы окраски.
3. Структура и химический состав бактериальной клетки. Особенности строения грамположительных и грамотрицательных бактерий.
4. Морфология грибов. Принципы классификации.
5. Морфология простейших. Принципы классификации.
6. Особенности биологии вирусов.
7. Принципы классификации вирусов.
8. Структура и химический состав вирусов и бактериофагов.
9. Методы микроскопии (световая, люминесцентная, темнопольная, фазовоконтрастная, электронная).

2.Физиология микроорганизмов

1. Рост и размножение бактерий, фазы размножения.
2. Способы получения энергии бактериями (дыхание, брожение). Методы культивирования анаэробов.
3. Типы и механизмы питания бактерий.
4. Основные принципы культивирования бактерий.
5. Искусственные питательные среды, их классификация. Требования, предъявляемые к питательным средам.
6. Принципы и методы выделения чистых культур бактерий.
7. Ферменты бактерий. Идентификация бактерий по ферментативной активности.
8. Внутривидовая идентификация бактерий (эпидемическое маркирование).
9. Нормальная микрофлора организма человека и ее функции. Дисбиозы. Эубиотики.
10. Действие физических и химических факторов на микроорганизмы. Понятие о стерилизации, дезинфекции, асептике и антисептике.
11. Способы стерилизации, аппаратура.
12. Понятие о химиотерапии и химиотерапевтических препаратах. Механизмы действия сульфониламидов и хинолонов.
13. Антибиотики: классификация по источнику получения, способу получения.
14. Антибиотики: классификация по химической структуре, по механизму и спектру действия.
15. Осложнение антибиотикотерапии, их предупреждение.
16. Механизмы лекарственной устойчивости возбудителей инфекционных болезней. Пути преодоления лекарственной устойчивости.
17. Методы определения чувствительности бактерий к антибиотикам.
18. Методы культивирования вирусов.
19. Типы взаимодействия вируса с клеткой. Фазы репродукции вирусов.
20. Бактериофаги. Взаимодействие фага с бактериальной клеткой. Умеренные и вирулентные бактериофаги. Лизогения.
21. Применение фагов в медицине и биотехнологии.

3.Генетика бактерий

22. Строение генома бактерий. Понятие о генотипе и фенотипе. Виды изменчивости.
23. Плазмида бактерий, их функции и свойства. Использование плазмид в генной инженерии.

24. Механизмы передачи генетического материала у бактерий.

4. Инфекция и иммунитет

1. Понятие об инфекции. Условия возникновения инфекционного процесса.
2. Стадии развития и характерные признаки инфекционной болезни.
3. Патогенность и вирулентность бактерий. Факторы патогенности.
4. Токсины бактерий, их природа, свойства, получение.
5. Роль И. И. Мечникова в формировании учения об иммунитете. Неспецифические факторы защиты организма.
6. Комплемент, его структура, функции, пути активации, роль в иммунитете.
7. Интерфероны, природа. Способы получения и применение.
8. Видовой (наследственный) иммунитет.
9. Понятие об иммунитете. Виды иммунитета.
10. Структура и функции иммунной системы. Кооперация иммунокомпетентных клеток.
11. Иммунокомпетентные клетки. Т- и В-лимфоциты, макрофаги, их кооперация.
12. Иммуноглобулины, структура и функции.
13. Классы иммуноглобулинов, их характеристика.
14. Антигены: Определение, основные свойства. Антигены бактериальной клетки.
15. Антителообразование: первичный и вторичный ответ.
16. Иммунологическая память. Иммунологическая толерантность.
17. Классификация гиперчувствительности по Джейлу и Кумбсу. Т – зависимая гиперчувствительная и ее клинико-диагностическое значение.
18. Аллергические пробы, их сущность, применение.
19. В-зависимая гиперчувствительность. Механизмы возникновения, клиническая значимость.
20. Анафилактический шок и сывороточная болезнь. Причины возникновения. Механизм. Их предупреждение.
21. Понятие о клинической иммунологии. Иммунный статус человека и факторы, влияющие на него.
22. Оценка иммунного статуса: основные показатели и методы их определения.
23. Первичные и вторичные иммунодефициты.
24. Понятие об иммуномодуляторах. Принцип действия. Применение.
25. Особенности противовирусного иммунитета.
26. Диагностические препараты, получение, применение.
27. Моноклональные антитела.
28. Методы приготовления и применение агглютинирующих, адсорбированных сывороток.
29. Реакция агглютинации. Компоненты, механизм, способы постановки. Применение.
30. Реакция Кумбса. Механизм. Компоненты. Применение.
31. Реакция пассивной гемагглютинации. Компоненты. Применение.
32. Реакция преципитации. Механизм. Компоненты. Способы постановки. Применение.
33. Реакция связывания комплемента. Механизм. Компоненты. Применение.
34. Реакция нейтрализации токсина антитоксином. Механизм. Способы постановки. Применение.
35. Реакция иммунофлюоресценции. Механизм, компоненты, применение.
36. Иммуноферментный анализ, иммуноблоттинг, механизм, компоненты, применение.
37. Серологические реакции, используемые для диагностики вирусных инфекций.
38. Вакцины, определение, современная классификация, применение.
39. Живые вакцины, получение, применение. Достоинства и недостатки.
40. Убитые вакцины, получение, применение.
41. Химические вакцины. Получение. Достоинства, применение.
42. Анатоксины. Получение, очистка, титрование, применение.

43. Генно-инженерные вакцины. Принципы получения, применение.
44. Медицинская биотехнология, ее задачи и достижения.
45. Антитоксические сыворотки. Получение, очистка, титрование, применение.
Осложнения при использовании и их предупреждение.
46. Препараты иммуноглобулинов. Получение, очистка, показания к применению.

ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ

1. Методы микробиологической диагностики инфекционных болезней.
2. Возбудители брюшного тифа и паратифов. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
3. Возбудители эшерихиозов. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Лечение и профилактика.
4. Возбудители кишечного иерсиниоза. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
5. Возбудители шигеллеза. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
6. Возбудители сальмонеллезов. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
7. Возбудители холеры. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
8. Стафилококки. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
9. Стрептококки. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
10. Менингококки. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
11. Гонококки. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Лечение и профилактика.
12. Возбудитель туляремии. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
13. Возбудитель сибирской язвы. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
14. Возбудители бруцеллеза. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
15. Возбудитель чумы. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
16. Особенности микробиологического диагноза при карантинных инфекциях. Экспресс-диагностика.
17. Возбудители анаэробной газовой инфекции. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
18. Возбудитель ботулизма. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
19. Возбудитель столбняка. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
20. Возбудитель дифтерии. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
21. Возбудитель коклюша и паракоклюша. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
22. Возбудители туберкулеза. Таксономия, характеристика. Условно-патогенные микобактерии. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

23. Возбудитель сыпного тифа. Таксономия, Характеристика. Болезнь Брилля-Цинсера. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
24. Возбудитель лихорадки Ку. Таксономия, Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
25. Возбудитель хламидиозов. Таксономия, Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
26. Возбудители легионеллезов. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Лечение, профилактика.
27. Возбудитель сифилиса. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика, лечение и профилактика.
28. Возбудитель лептоспирозов. Таксономия, характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
29. Возбудители возвратных тифов. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Лечение и профилактика.
30. Роль условно-патогенных микроорганизмов в возникновении внутрибольничных инфекций. Клиническая микробиология, ее задачи.
31. Синегнойная палочка. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Лечение и профилактика.
32. Неспорообразующие анаэробы. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Лечение и профилактика.
33. Классификация грибов. Характеристика. Роль в патологии человека. Лабораторная диагностика. Профилактика и лечение.
34. Возбудители малярии. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика, лечение и профилактика.
35. Возбудитель токсоплазмоза. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика, лечение и профилактика.
36. Возбудители лейшманиоза. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Лечение и профилактика.
37. Значение открытия Д.И. Ивановского. Этапы развития вирусологии. Роль отечественных ученых в развитии вирусологии.
38. Возбудители ОРВИ. Таксономия. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
39. Возбудители гриппа. Таксономия. Характеристика. Лабораторная диагностика. Лечение и профилактика.
40. Возбудители полиомиелита. Таксономия. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
41. Возбудители гепатитов А и Е. Таксономия. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
42. Арбовирусы. Таксономия. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
43. Возбудитель клещевого энцефалита. Таксономия. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
44. Возбудитель бешенства. Таксономия. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
45. Возбудитель натуральной оспы. Таксономия. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика оспы на современном этапе.
46. Возбудитель краснухи. Таксономия. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
47. Вирус кори. Таксономия. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
48. Герпес инфекция. Таксономия. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика. Лечение.

49. Возбудители гепатитов В, С и Д. Таксономия. Характеристика. Носительство. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
50. ВИЧ-инфекция. Таксономия. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика и лечение.
51. Классификация и характеристика онкогенных вирусов.

САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ

1. Учение о санитарно-показательных микроорганизмах.
2. Микрофлора воздуха и методы ее исследования.
3. Патогенные микробы в воздухе, механизмы распространения и пути передачи инфекции.
4. Санитарно-показательные микроорганизмы воздуха.
5. Санитарно-бактериологическое исследование воздуха Методы, Аппаратура.
6. Микрофлора воды. Факторы, влияющие на количество микробов в воде.
7. Методы санитарно-бактериологического исследования воды.
8. Показатели качества воды: микробное число, коли-титр, коли-индекс.
9. Определение коли-титра воды бродильным методом.
10. Исследование питьевой воды на присутствие возбудителей брюшного тифа, холеры и лептоспироза.
11. Микрофлора почвы. Факторы, влияющие на количественный и видовой состав микробной почвы.
12. Почва как фактор передачи инфекционных заболеваний.
13. Санитарно-микробиологическое исследование почвы. Микробное число, коли-титр, перфрингенс-титр почвы.
14. Санитарно-бактериологическое исследование предметов окружающей среды, смывов с рук, инвентаря, оборудования.
15. Контроль перевязочного материала на стерильность.
16. Значение условно-патогенных микробов в этиологии пищевых токсикоинфекций.
17. Санитарно-микробиологическое исследование пищевых продуктов.
18. Санитарно-микробиологическое исследование молока и молочных продуктов.
19. Санитарно-микробиологическое исследование при пищевых токсикоинфекциях и бактериальных токсикозах.
20. Санитарно-бактериологическое исследование мяса и мясных продуктов.
21. Вирусы, циркулирующие в сточной воде, методы индикации.
22. Роль воздушной среды в распространении вирусных заболеваний, методы отбора воздуха и индикация вирусов.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Кафедра: микробиологии

Факультет: медико-профилактический курс 2-3

Дисциплина: микробиология, вирусология, иммунология

Ситуационная задача №1

Через 10 часов после употребления в пищу консервированных огурцов домашнего приготовления у ребенка 7 лет появились рвота и диарея. На следующие сутки у ребенка появилась сухость во рту, он перестал четко видеть окружающие предметы. Появилась осиплость голоса, акт глотания стал затрудненным. С диагнозом ботулизм ребенок был госпитализирован в стационар. Ребенку было назначено внутривенное введение антитоксической противоботулинической сыворотки. По какому методу ее необходимо ввести для профилактики развития анафилактического шока?

1. По методу Мечникова
2. По методу Коха
3. По методу Безредко
4. По методу Рамона

Ситуационная задача №2

Больная обратилась к врачу-дерматологу в связи с появлением язвы на большой половой губе. Врач, осмотрев больную, установил язвы на большой половой губе и твердый шанкр. Назовите правильные методы исследования:

1. Микроскопия в темном поле
2. Реакция Вассермана
3. Цитохолевый тест
4. Реакция Кана
- 5.Иммунофлюоресценция

Ситуационная задача №3

Пациентка гинекологической больницы стала предъявлять жалобы на боли в пояснице, внизу живота. Больной был назначен курс ампициллина внутримышечно, но симптоматика осталась без существенных изменений. При исследовании мочи обнаружены лейкоциты и кристаллы солей кальция. Посев мочи: грамотрицательные оксидаза-положительные палочковидные бактерии, образующие мукоидные колонии зеленоватого цвета. Какая из нижеперечисленных бактерий наиболее соответствует указанным признакам?

1. Виды Enterococcus
2. Escherichia coli
3. Klebsiella pneumonia
4. Proteus mirabilis

5. *Pseudomonas aeruginosa*

Ситуационная задача №4

У пациента, страдающего гнойничковыми поражениями кожи, был проведен посев отделяемого очагов поражения. На кровяном агаре выросли мелкие кремовые округлые колонии, окруженные зоной гемолиза. Их образовывали грамположительные каталаза- и оксидаза-положительные кокки, ферментирующие манит и располагающиеся в мазках беспорядочными скоплениями. Какие из нижеуказанных бактерий наиболее соответствуют указанным признакам?

1. *Streptococcus pyogenes*
2. *Streptococcus agalactiae*
3. *Staphylococcus aureus*
4. *Staphylococcus epidermidis*
5. *Staphylococcus saprophyticus*

Ситуационная задача №5

В инфекционную больницу обратился мужчина с жалобами на головную боль и лихорадку, появившиеся после поездки на охоту в астраханские степи. Физикальное обследование выявило увеличение подмышечных лимфатических узлов. Некоторые из них сильно воспалены, флюктуируют, что указывает на возможность их вскрытия. Укажите симптомы каких заболеваний напоминают перечисленные признаки?

1. Бруцеллез
2. Туляремия
3. Чума

Ситуационная задача №6

В инфекционном отделении находится больной 27 лет с подозрением на ВИЧ-инфекцию. Какие серологические реакции необходимы для постановки диагноза?

1. Иммуноферментный анализ
2. Метод иммуноблоттинга
3. Метод иммунофлюоресценции
4. Реакция пассивной гемагглютинации
5. Реакция связывания комплемента

Ситуационная задача №7

В инфекционное отделение Республиканской больницы доставлен больной с подозрением на гепатит. Из анамнеза выявлено, что 4 месяца назад имело место переливание крови. Какое лабораторное исследование необходимо назначить больному?

1. Иммуноферментный метод
2. Метод иммуноблоттинга

3. Метод иммунофлюоресценции
4. Реакция пассивной гемагглютинации
5. Реакция связывания комплемента

Ситуационная задача №8

При лабораторном исследовании мазка из влагалища обнаруживаются диплококки, напоминающие кофейное зерно, расположенные как внутри лейкоцитов, так и вне их. Какие из перечисленных сред вы используете для культивирования предполагаемого возбудителя?

1. Среда Эндо
2. Питательная среда, содержащая асцитическую жидкость
3. Сывороточный агар
4. Мясо-пептонный агар

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Кафедра: микробиологии

Факультет: медико-профилактический курс 2-3

Дисциплина: микробиология, вирусология, иммунология

Практическое задание/Деловая игра №1

Заполните протокол проведения профилактических противоэпидемических мероприятий в медицинском учреждении

Практическое задание/Деловая игра №2

Заполните протокол микробиологической диагностики ботулизма

Практическое задание/Деловая игра №3

Заполните протокол микробиологической диагностики дизентерии

Практическое задание/Деловая игра №4

Заполните протокол микробиологической стафилококковой инфекции

Практическое задание/Деловая игра №5

Заполните протокол микробиологической диагностики бруцеллеза

Практическое задание/Деловая игра №6

Заполните протокол микробиологической диагностики коклюша

Практическое задание/Деловая игра №7

Заполните протокол микробиологической диагностики холеры

Практическое задание/Деловая игра №8

Заполните протокол микробиологической диагностики гриппа

Практическое задание/Деловая игра №9

Заполните протокол микробиологической диагностики коронавирусной инфекции

Практическое задание/Деловая игра №10

Заполните протокол микробиологической диагностики Вич-инфекции

МПД-19

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Кафедра микробиологии

**Эталоны тестовых заданий
по дисциплине - микробиология, вирусология, иммунология**

основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы специалитета по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело,
утвержденной 24.05.2023 г.

для студентов - 2-3 курсов

по специальности - 32.05.01 Медико-профилактическое дело

Владикавказ 2023 г.

Оглавление

№ п/п	Наименование контролируемого раздела (темы) дисциплины/модуля	Код формируемой компетенции (этапа)	Количество тестов (всего)	Страницы с __ по __
1	2	3	4	5
Вид контрол я	Текущий контроль успеваемости/Промежуточная аттестация			
1	Входной контроль уровня подготовки обучающихся.	ОПК-7	10	24
2	Раздел 1. Общая микробиология. Морфология и ультраструктура микроорганизмов.	ОПК-7	84	25-34
3	Раздел 2. Физиология микроорганизмов.	ОПК-7	84	34-43
4	Раздел 3. Экология микробов. Нормальная микрофлора организма человека.	ОПК-7	84	34-43
5	Раздел 4. Основы генетики микробов. Основы генетической инженерии и медицинской биотехнологии.	ОПК-7	84	25-34
6	Раздел 5. Общая вирусология.	ОПК-7	84	25-34
7	Раздел 6. Симбиоз человека с микробами. Учение об инфекции.	ОПК-7	84	44-55
8	Раздел 7. Медицинская иммунология. Медицинские иммунобиологические препараты.	ОПК-7	84	44-55
9	Раздел 8. Бактерии-возбудители инфекционных заболеваний человека.	ОПК-7	236	55-100
10	Раздел 9. Вирусы-возбудители инфекционных заболеваний человека.	ОПК-7	88	100-113

Тесты для оценки входного уровня знаний по микробиологии

1. Какие микроорганизмы относятся к прокариотам?

- А) Вирусы
- Б) Грибы
- В) Бактерии
- Г) Простейшие

2. Какие органоиды отсутствуют в прокариотической клетке?

- А) Ядро
- Б) Нуклеоид
- В) Митохондрии
- Г) Рибосомы

3. Какие органоиды присутствуют в эукариотической клетке?

- А) Митохондрии
- Б) Ядро
- В) Комплекс Гольджи
- Г) Нуклеоид

4. К оптической части микроскопа относят:

- А) Тубус
- Б) Окуляр
- В) Объектив
- Г) Предметный столик

5. Вирусы – это:

- А) Прокариоты
- Б) Внутриклеточные паразиты
- В) Эукариоты
- Г) Простейшие

6. В каких единицах измеряются размеры микроорганизмов?

- А) В микрометрах
- Б) В сантиметрах
- В) В нанометрах
- Г) В метрах

7. Какие микроорганизмы относятся к эукариотам?

- А) Грибы
- Б) Бактерии
- В) Вирусы
- Г) Простейшие

8. К механической части микроскопа относят:

- А) Предметный столик
- Б) Зеркало
- В) Конденсор
- Г) Окуляр

9. Какие микроорганизмы в цитоплазме содержат ядро?

- А) Бактерии
- Б) Грибы
- В) Вирусы
- Г) Простейшие

10. Какие микроорганизмы размножаются спорами?

- А) Бактерии
- Б) Вирусы
- В) Грибы
- Г) Простейшие

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ №1
ПО МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ
И ИММУНОЛОГИИ
(ОБЩАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ)

МОРФОЛОГИЯ, УЛЬТРАСТРУКУТРА МИКРООРГАНИЗМОВ.
ОБЩАЯ ВИРУСОЛОГИЯ.
ГЕНЕТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ.
I ВАРИАНТ

1. С именем какого ученого связано открытие сущности брожения (1857), микробной обусловленности и заразности инфекционных болезней (1881), методов изготовления вакцин и способов профилактики куриной холеры, сибирской язвы и бешенства (1882-1885)?
 - а) Левенгук
 - б) Мечников
 - в) Кох
 - г) Пастер

2. Какие микроорганизмы относятся к грамотрицательным?
 - а) гонококки
 - б) кишечная палочка
 - в) менингококки
 - г) стрептококки

3. Для обнаружения капсул у бактерий в чистой культуре используют окраски
 - а) простая
 - б) по Бурри
 - в) по Граму
 - г) по Бурри-Гинсу

4. Какие структуры относят к внутриклеточным включениям бактерий?
 - а) зерна гликогена
 - б) митохондрии
 - в) зерна волютина
 - г) рибосомы

5. Для обнаружения спор у бактерий используют окраску:
 - а) по Нейссеру
 - б) по Романовскому-Гимзе
 - в) по Бурри-Гинсу
 - г) по Ожешки

6. Какие микроорганизмы относятся к извитым формам?
 - а) актиномицеты
 - б) спирillлы
 - в) бациллы
 - г) спирохеты

7. Какие особенности характерны для риккетсий?
 - а) облигатные внутриклеточные паразиты

- б) прокариоты
в) грамотрицательны
г) окрашиваются в красный цвет по методу Здродовского
8. Какая структура у бактерий выполняет функцию синтеза белка?
а) мезосомы
б) рибосомы
в) нуклеотид
г) плазмиды
9. Назовите микроорганизмы, у которых отсутствует полноценная клеточная стенка
а) риккетсии
б) микоплазмы
в) хламидии
г) актиномицеты
10. Что представляет собой мицелий грибов?
а) это клетка, лишенная цитоплазматической мембранны
б) это совокупность гиф
в) это совокупность хламидоспор
г) это многоядерная структура
11. Что относят к внекромосомным генетическим структурам у бактерий?
а) рибосомы
б) полисомы
в) плазмиды
г) транспозоны
12. Какие особенности характерны для капсулы у бактерий?
а) обязательная оболочка
б) выполняет защитную функцию
в) содержит тейхоевые кислоты
г) выявляется по методу Бурри-Гинса
13. Что такое мутагены?
а) гены, обеспечивающие мутацию
б) факторы, вызывающие мутацию
в) факторы, восстанавливающие ДНК
г) факторы, передающие генетическую информацию
14. Что такое модификация?
а) наследственное скачкообразное изменение признака
б) передача генетического материала при помощи бактериофага
в) исправление поврежденных участков ДНК
г) фенотипические изменения, не затрагивающие генома клетки
15. Что такое делеция?
а) исправление поврежденных участков ДНК
б) хромосомная мутация
в) выпадение большого числа нуклеотидов
г) точковая мутация

СОСТАВЬТЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ПАРЫ: ВОПРОС-ОТВЕТ

16. Трансформация?
17. Трансдукция?
18. Конъюгация ?

19. Способ мутагенеза?
20. Клетки-доноры в состоянии Hfr?
21. Умеренный бактериофаг?
- a. передача генетического материала при контакте бактериальных клеток разной "половой" направленности
b. восстановление поврежденной ДНК
c. передача генетического материала с помощью высокополимеризованной ДНК
d. передача генетического материала с помощью умеренных бактериофагов
- a. Конъюгация
b. Трансдукция
c. Оба
d. Ни то, ни другое

**МОРФОЛОГИЯ, УЛЬТРАСТРУКУТРА МИКРООРГАНИЗМОВ.
ОБЩАЯ ВИРУСОЛОГИЯ.
ГЕНЕТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ.
II ВАРИАНТ**

1. Кто является одним из основоположников иммунологического этапа развития микробиологии и создателем фагоцитарной теории иммунитета?
а) Безредка
б) Пастер
в) Кох
г) Мечников
2. Какие методы окраски относятся к сложным дифференциально-диагностическим?
а) по Цилю-Нильсену
б) метиленовым синим
в) по Грамму
г) разведенным карболовым фуксином
3. Какие микроорганизмы относятся к грамположительным?
а) стафилококки
б) пневмококки
в) клоストридии
г) актиномицеты
4. Для обнаружения капсулы у бактерий применяют
а) окраску по Бурри-Гинсу
б) окраску по Романовскому-Гимзе
в) окраску по Цилю-Нильсену
5. Какие бактерии относятся к спорообразующим?
а) клостродии
б) микобактерии
в) бациллы
г) спирохеты

6. Какие особенности характерны для актиномицетов?
- а) грамположительные микробы
 - б) клетки имеют вид разветвленных нитей
 - в) образуют экзоспоры
 - г) прокариоты
7. Какие методы исследования используют для изучения подвижности спирохет?
- а) окраска фуксином
 - б) микроскопия в темном поле
 - в) метод Циля-Нильсена
 - г) фазово-контрастная микроскопия
8. Каким образом устроена клетка простейших?
- а) как эукариотическая клетка
 - б) содержит оформленное ядро с ядерной мембраной
 - в) сложнее, чем клетка бактерий
 - г) как клетка микоплазм
9. Какие микробы не имеют клеточного строения?
- а) вирусы
 - б) микоплазмы
 - в) хламидии
 - г) грибы
10. Для бактериального генома характерно
- а) включает в себя бактериальную хромосому
 - б) заключает в себя плазмиды
 - в) содержит гаплоидный набор генов
 - г) содержит диплоидный набор генов
11. Какие слои обнаружены в составе клеточной стенки грамотрицательных бактерий?
- а) пептидогликановый
 - б) ЛПС
 - в) липопротeinовый
 - г) тейхоевые кислоты
12. Какие особенности характерны для мезосом у бактерий?
- а) образуются в результате инвагинации цитоплазматической мембранны в цитоплазму
 - б) выполняют функции пищеварительной вакуоли
 - в) синтезируют белок
 - г) выявляют по методу Циля-Нильсена
13. Что такое трансформация?
- а) передача генетической информации при контакте бактериальных клеток разной «половой» направленности
 - б) восстановление поврежденной ДНК
 - в) передача генетического материала с помощью высокополимеризованной ДНК
14. Что содержит сложноорганизованный вирус?
- а) два типа нуклеиновой кислоты

- б) один тип нуклеиновой кислоты (либо ДНК, либо РНК)
- в) суперкапсид
- г) капсид

15. Что такое мутации?
- а) передача генетического материала при помощи бактериофага
 - б) исправление поврежденных участков ДНК
 - в) наследственное скачкообразное изменение признака
 - г) процесс образования бактериального потомства, содержащего признаки донора и реципиента

СОСТАВЬТЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ПАРЫ: ВОПРОС-ОТВЕТ

- | | |
|---|------------------|
| 16. Наружная мембрана бактерий
(состав) | a. Амфитрихи |
| 17. Бактерии, имеющие много жгутиков вокруг клетки | b. Перитрихи |
| 18. Микроорганизмы, не имеющие клеточной стенки | c. Спирохеты |
| | d. Микоплазмы |
| | e. Порины |
| 19. Функция движения у бактерий | a. Порины |
| 20. Адгезия бактерий к эукариотическим клеткам | b. Пили |
| | c. Включения |
| | d. Псевдоподии |
| | e. Жгутики |
| 21. Передача генетической информации при помощи умеренного фага | a. трансдукция |
| | b. трансформация |
| | c. лизогения |

МОРФОЛОГИЯ, УЛЬТАСТРУКТУРА МИКРООРГАНИЗМОВ. ОБЩАЯ ВИРУСОЛОГИЯ. ГЕНЕТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ. III ВАРИАНТ

1. Что представляет собой клон?
 - а) совокупность фенотипически и генотипически сходных штаммов микробов
 - б) культура определенного вида микроорганизмов, выделенная из окружающей среды, патологических материалов человека или животных или полученная из музея
 - в) генетически однородная чистая культура микроорганизмов, происходящая из одной клетки
 - г) совокупность микробов с низкой степенью гетерогенности, имеющих общий корень происхождения.
2. Что такое тинкториальные свойства бактерий?
 - а) устойчивость во внешней среде к действию химических факторов
 - б) принадлежность к определенному роду или виду
 - в) чувствительность к бактериофагам
 - г) отношение к определенному методу окрашивания

3. Какие компоненты клеточной стенки бактерий обеспечивают устойчивость к кислотам, щелочам и спирту?
- а) порины
 - б) ЛПС
 - в) миколовые кислоты
 - г) пептидогликан
4. Особенности зерен волютина?
- а) относятся к цитоплазматическим включениям
 - б) окрашиваются по Нейссеру
 - в) отличаются метахромазией
 - г) содержат полифосфаты
5. Какие факторы стимулируют образование эндоспор у бактерий?
- а) недостаток кислорода
 - б) изменение температуры окружающей среды
 - в) изменение кислотности окружающей среды
 - г) попадание в организм человека или животных
6. Какими свойствами обладают спирохеты?
- а) имеют тонкую клеточную стенку
 - б) грамотрицательные
 - в) тонкие спирально изогнутые клетки
 - г) имеют цитоплазматический цилиндр
7. Какие свойства характерны для хламидий?
- а) грамотрицательные
 - б) прокариоты
 - в) obligatные внутриклеточные паразиты
 - г) имеют извитую форму
8. У каких микроорганизмов отсутствие клеточной стенки всегда детерминировано генетически?
- а) протопласты
 - б) сферопласты
 - в) хламидии
 - г) микоплазмы
9. Какие микробы относятся к эукариотам?
- а) простейшие
 - б) микоплазмы
 - в) грибы
 - г) хламидии
10. Функции плазмид у бактерий
- а) обеспечивают лекарственную устойчивость
 - б) обеспечивают образование половых ворсинок
 - в) придают бактериям дополнительные свойства
 - г) обеспечивают конъюгацию
11. С именем какого ученого связано открытие микробов?
- а) Пастер

- б) Левенгук
- в) Кох
- г) Мечников

12. Какой слой наиболее выражен в составе клеточной стенки грамположительных бактерий?

- а) ЛПС
- б) пептидогликан
- в) липопротеиновый
- г) муреиновый

13. Что такое бактериофаги?

- а) бактерии
- б) вирусы
- в) клетки фагоциты
- г) грибы

14. Что такое экзон?

- а) профаг
- б) умеренный бактериофаг
- в) вирулентный бактериофаг
- г) участок гена, несущий определенную генетическую информацию

15. Что такое конъюгация?

- а) исправление поврежденных участков ДНК
- б) передача генетической информации при помощи бактериофага
- в) наследственное скачкообразное изменение признака
- г) передача генетической информации при скрещивании бактерий через половые ворсинки

СОСТАВЬТЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ПАРЫ: ВОПРОС-ОТВЕТ

16. Органы движения у бактерий

- а. Пили
- б. Жгутики
- с. Псевдоподии
- д. Трихомонады
- е. Перитрихи

17. Бактерии, покрытые жгутиками со всех сторон клетки

18. Дрожжеподобные грибы с бесполым способом размножения

- а. Нейссерии

19. Кокки, располагающиеся в виде цепочек

- б. Мукор

20. Бактерии, диаметр спор у которых больше диаметра клетки

- с. Кандида

- д. Клюстридии
- е. Стреptококки

21. Передача генетической информации при помощи умеренного фага

- а. Трансдукция
- б. Трансформация
- с. Виропексис
- д. Лизогения
- е. Фаговая конверсия

**МОРФОЛОГИЯ, УЛЬТРАСТРУКТУРА МИКРООРГАНИЗМОВ.
ОБЩАЯ ВИРУСОЛОГИЯ.
ГЕНЕТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ.
IV ВАРИАНТ**

1. С именем какого ученого связано открытие вирусов?
 - а) Левенгук
 - б) Пастер
 - в) Ивановский
 - г) Кох
2. Какую морфологию имеют сарцины?
 - а) палочковидную
 - б) кокковидную
 - в) извитую
 - г) нитевидную
3. Что такое стрептобациллы?
 - а) кокки, образующие цепочку
 - б) палочки, образующие цепочку
 - в) извитые формы
 - г) спорообразующие палочки, располагающиеся цепочкой
4. Какими особенностями характеризуются микоплазмы?
 - а) лишены клеточной стенки
 - б) грамотрицательные микроорганизмы
 - в) прокариоты
 - г) эукариоты
5. Какими особенностями характеризуются вирусы?
 - а) внутриклеточные паразиты
 - б) лишены клеточного строения
 - в) прокариоты
 - г) лишены белоксинтезирующего аппарата
6. Какой метод окраски используют для обнаружения кислотоустойчивых бактерий?
 - а) метод Грамма
 - б) метод Циля-Нильсена
 - в) метод Ожешки
 - г) метод Нейссера
7. Какие микроорганизмы относят в прокариотам?
 - а) грибы
 - б) вирусы
 - в) бактерии
 - г) актиномицеты
8. Какой метод окраски используют для выявления волютиновых зерен у бактерий?
 - а) метод Грамма
 - б) метод Циля-Нильсена
 - в) метод Нейссера

г) метод Ожешки

9. Какими особенностями характеризуются риккетсии?

- а) грамположительные микроорганизмы
- б) окрашиваются по Здрадовскому
- в) внутриклеточные паразиты
- г) эукариоты

10. Какие существуют методы обнаружения подвижности бактерий?

- а) метод Леффлера
- б) темнопольная микроскопия
- в) фазовоконтрастная микроскопия
- г) простая окраска бактерий

11. Какими особенностями характеризуются жгутики у бактерий?

- а) локомоторный орган
- б) содержит белок флагеллин
- в) обеспечивает конъюгацию бактерий
- г) состоит из липидов

12. Для конъюгации характерно:

- а) передача генетического материала при помощи бактериофага
- б) передача генетического материала с помощью полового фактора
- в) передача генетического материала с помощью РНК
- г) необходим контакт клеток донора и реципиента

13. Чем характеризуется «минус»-цепь РНК?

- а) способна встраиваться в хромосому клетки
- б) несет наследственную функцию
- в) обладает инфекционной активностью
- г) не обладает функцией и-РНК

14. Что такое трансдукция?

- а) симбиоз бактериальных клеток с профагом
- б) изменение фенотипа лизогенных бактерий под влиянием профага
- в) передача генетической информации при помощи умеренного фага
- г) передача генетической информации при помощи молекулы ДНК

15. Что такое репарация?

- а) метод передачи генетической информации
- б) восстановление поврежденной ДНК
- в) виропексис
- г) лизогения

СОСТАВЬТЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ПАРЫ: ВОПРОС-ОТВЕТ

16. Мутации?

а. Передача генетического материала

17. Рекомбинации?

б. Исправление поврежденных участков ДНК

18. Репарация?

с. Наследственное скачкообразное изменение признака

19. Метод передачи генетической информации?
20. Участник процесса — умеренный бактериофаг?
21. Восстановление поврежденной ДНК?

a. Репарация
b. Трансформация
c. Оба

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ № 2
ПО МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ
И ИММУНОЛОГИИ
(ОБЩАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ)

ФИЗИОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ. АНТИБИОТИКИ.
I ВАРИАНТ

1. Для осуществления активного транспорта веществ в бактериальную клетку, необходимо присутствие:
 - а) транскриптазы
 - б) транслоказы
 - в) гиалуронидазы
 - г) нейроминидазы
 - д) ДНК-азы
2. Конечным акцептором электронов при анаэробном типе дыхания у бактерий являются:
 - а) молекулярный кислород
 - б) неорганические соединения
 - в) органические соединения
 - г) одновременно органические и неорганические соединения
 - д) митохондриальные белки
3. Среда тиогликолевая служит для выделения:
 - а) облигатных аэробов
 - б) облигатных анаэробов
 - в) факультативных аэробов
 - г) факультативных анаэробов
 - д) все ответы правильные
4. Оптимальной температурой для выращивания патогенных микробов является:
 - а) 20°C
 - б) 30°C
 - в) 37°C
 - г) 39°C
 - д) 40°C
5. Сложные среды, содержащие белковые компоненты, стерилизуют:
 - а) дробно-текущим паром
 - б) кипячением
 - в) сухим жаром в печи Пастера
 - г) фильтрованием
 - д) тиндализацией

6. Перечислите способы стерилизации, освобождающие объект от споровых форм микробов:
- а) облучение ультрафиолетом
 - б) автоклавирование
 - в) пастеризация
 - г) сухим жаром
 - д) гамма облучение
7. Вирусы культивируются:
- а) в среде 199
 - б) МПА
 - в) МПБ
 - г) культуры клеток Hela
 - д) в курином эмбрионе
 - е) в животных
 - ж) на средах с вытяжкой из сердца и мозга
8. Видимые под микроскопом морфологические изменения клеток вплоть до их гибели, возникающие в результате повреждающего действия вирусов, являются признаком:
- а) феномена гемадсорбции
 - б) цитопатический эффект
 - в) образование бляшек
 - г) «цветная реакция»
9. Какие из перечисленных тестов (проб) используются для определения протеолитической активности микробы?
- а) проба на индол
 - б) проба на сероводород
 - в) тест на разжижение желатина
 - г) тест на расщепление мочевины
10. Укажите способы полной стерилизации материала:
- а) паром под давлением
 - б) фильтрованием
 - в) гамма излучение
 - г) прокаливание
 - д) на водяной бане
11. Антибиотики, нарушающие молекулярную организацию и синтез клеточных мембран:
- а) β -лактамы
 - б) полины, полимиксины
 - в) тетрациклины
 - г) хинолоны
12. С какой целью применяют эубиотики?
- а) проведение селективной деконтаминации
 - б) химиотерапия
 - в) идентификация эубактерий
 - г) лечение дисбактериоза
13. Антибиотики широкого спектра действия:
- а) цефалоспорины
 - б) нитромидазолы

- в) фторхинолы
- г) полипептиды

СОСТАВЬТЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ПАРЫ: ВОПРОС- ОТВЕТ

- | | |
|--|---------------------------------|
| 14. Левомицетин | а. Тератогенное действие |
| 15. Противогрибковые антибиотики | б. Общетоксичны |
| 16. Пенициллины | с. Нарушение органа слуха |
| 17. Аминогликозиды? | д. Аллергические реакции |
| | е. Апластическая анемия |
| | |
| 18. Используют неорганический источник углерода | а. Фототрофы |
| 19. Используют органический источник углерода | б. Хемотрофы |
| 20. Энергию получают в результате химических реакций | с. Автотрофы |
| | d Гетеротрофы |
| 21. Энергию получают дыханием и брожением | a. Строгие анаэробы |
| | b. Факультативные анаэробы |
| | c. Оба |

ФИЗИОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ. АНТИБИОТИКИ. II ВАРИАНТ

1. Процесс биологического окисления субстрата осуществляется микробной клеткой в:
 - а) рибосомах
 - б) лизосомах
 - в) митохондриях
 - г) внутриклеточных включениях
 - д) лизосомах
2. Микрофаги, использующие неорганические источники водорода и хемосинтезирующие реакции для получения энергии, называются:
 - а) фотолитотрофами
 - б) фотоорганотрофами
 - в) хемометотрофами
 - г) хемоорганотрофами
 - д) истинными хемоорганотрофами
3. Плотность питательных сред зависит от содержания:
 - а) сыворотки крови
 - б) сахарозы
 - в) агар-агара
 - г) пептона
 - д) хлорида натрия
4. Селективные/элективные, питательные среды можно использовать для:
 - а) выделения определенного вида микробов
 - б) изучения протеолитических свойств микробов

- в) изучения культуральных свойств микробов
- г) изучения сахаролитических ферментов микробов
- д) первичного посева материала
- е) консервации и транспортировки материала

5. Под термином «дезинфекция» понимают:

- а) освобождение объекта от вегетативных форм
- б) освобождение только от аэробных форм бактерий
- в) освобождение от спор и вегетативных форм
- г) уничтожение только анаэробных форм микробов
- д) уничтожение патогенных микробов

6. Среды, содержащие сахара и другие углеводы, стерилизуют:

- а) автоклавированием
- б) кипячением
- в) сухим жаром в печи Пастера
- г) фильтрованием
- д) дробно-текущим паром

7. В жидких питательных средах рост может наблюдаться в виде:

- а) колоний
- б) диффузного помутнения
- в) придонного помутнения
- г) пристеночного налета
- д) в виде пленки на поверхности среды

8. На рост бактерий влияют следующие условия культивирования:

- а) газовый состав
 - б) содержание в питательной среде, органических соединений
 - в) факторы роста
 - г) pH среды
- д) влажность среды
- е) все ответы неправильные

9. Расположите в нужной последовательности действия при бактериологическом методе исследования:

- а) посев чистой культуры в среды Гиса
- б) получение изолированных колоний
- в) оценка результатов идентификации чистой культуры микробов
- г) получение чистой культуры микробов
- д) посев для определения чувствительности к антибиотикам

10. Анаэрообы культивируют в следующих средах:

- а) МПА, МПБ
- б) Кита-Тароцци
- в) Плоскирева
- г) тиогликолевая
- д) Гисса

11. Для контроля качества стерилизации применяют:

- а) физико-химические тесты
- б) фенолфталеиновую пробу
- в) биологические тесты

- г) осуществляют по показаниям приборов
д) молекулярно-генетические методы

12. Обнаружение индола свидетельствует:

- а) о сбалансировании углеводов
б) о расщеплении белков
в) о расщеплении жиров

13. Какие ферменты катализируют метаболизм, происходящий внутри клетки:

- а) экзоферменты
б) эндоферменты
в) конститутивные
г) индуцильные

СОСТАВЬТЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ПАРЫ: ВОПРОС- ОТВЕТ

14. Желточно-солевой агар
15. Тиогликолевая среда
16. Асцит-агар

- a.** Среда для культивирования анаэроов
б. Дифференциально-диагностическая среда
с. Элективная среда
д Сложная среда для культивирования бактерий, нуждающихся в субстратах животного происхождения

17. Способ получения энергии
18. Конечный акцептор электронов органическое соединение?
19. Кислоты как конечный продукт метаболизма источника энергии?

- a.** Дыхание
б. Брожение
с. Оба
д. Ни тот, ни другой

20. Гибнут в присутствии кислорода
21. Энергию получают только брожением

- а. Строгие анаэрообы
б. Факультативные анаэрообы
с. Оба
д. Ни тот, ни другой

ФИЗИОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ. АНТИБИОТИКИ. III ВАРИАНТ

1. При анаэробном типе дыхания у бактерий отсутствует группа ферментов:
а) дегидрогеназ
б) флавопротеинов
в) цитохромоксидаз
г) лецитиназ
д) нуклеаз

2. Конечным акцептором электронов при брожении у бактерий являются:
а) молекулярный кислород
б) неорганические соединения

- в) органические соединения
- г) одновременно органические и неорганические соединения
- д) митохондриальные белки

3. Преимущественный рост одних микробов при одновременном подавлении других можно получить на следующих видах питательных сред:

- а) селективных (элективных)
- б) простых
- в) сложных
- г) консервирующих
- д) дифференциально-диагностических

4. Сахаролитические свойства микробов изучают на средах:

- а) МПА, МПБ
- б) Гисса
- в) Ресселя
- г) кровяном агаре
- д) в тест-системе API

5. Под термином «стерилизация» понимают:

- а) освобождение объекта только от вегетативных форм
- б) освобождение только от аэробных микробов
- в) освобождение от спор и вегетативных форм
- г) уничтожение только анаэробных форм микробов
- д) уничтожение только патогенных микробов

6. Для культивирования облигатных анаэробов можно применять следующие газы:

- а) кислород
- б) метан
- в) смесь азота, водорода и углекислого газа
- г) углекислый газ
- д) азот

7. При выделении чистых культур на плотных питательных средах для? количественного определения микробов используют:

- а) способ Фортнера
- б) метод пластинчатых разводок Коха
- в) метод Дригальского

8. Протеолитические ферменты микробов изучаются на средах:

- а) с углеводами
- б) с белковыми субстратами
- в) молоком
- г) желатином
- д) МПБ

9. Изучая способность микробов расщеплять белки, используют:

- а) среды Гисса
- б) молоко
- в) желатин
- г) среда Левина

10. При культивировании риккетсий заражение куриных эмбрионов производят:

- а) в желточный мешок
б) в хориоаллантонскую оболочку
в) амниотическую полость
г) в аллангонскую полость
11. На I этапе бактериологического метода исследования решаются следующие задачи:
а) идентификация чистой культуры микробов
б) определение чувствительности к антибиотикам
в) получение изолированных колоний
г) определение вида микробы
д) получение чистой культуры
12. Основные цели применения дифференциально-диагностических сред:
а) изучение биохимической активности микробов
б) изучение культуральных свойств микробов
в) определение чувствительности к антибиотикам
г) дифференциация различных видов микробов
д) транспортировка материала в лабораторию
13. На II этапе бактериологического метода решаются следующие задачи:
а) идентификация выделенной чистой культуры микробов
б) макроскопическая характеристика колоний
в) определение чувствительности к антибиотикам
г) фаготипирование
д) все ответы правильные
- СОСТАВЬТЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ПАРЫ: ВОПРОС- ОТВЕТ**
14. Изолированное скопление микробов, **a.** Штамм выросших на плотной питательной среде
15. Совокупность бактерий одного вида, **b.** Чистая культура выращенных на питательной среде
16. Культура микробов одного и того же вида, **c.** Фаговар выделенная из разных источников **d.** Колония
17. Аминогликозиды **a.** Ингибиторы синтеза клеточной стенки
b. Нарушен синтез белка
c. Дезорганизация цитоплазматической мембранны
d. Нарушение функции цитоплазматической мембранны
18. Нарушение синтеза белка **a.** Цефалоспорины
b. Полипептидные антибиотики
c. Полиены
d. Тетрациклины
19. Ингибиторы синтеза клеточной стенки
20. Дезорганизация цитоплазматической мембранны
21. Нарушение функции ДНК

ФИЗИОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ. АНТИБИОТИКИ.

IV ВАРИАНТ

1. Для культивирования анаэробов без анаэростата используется среда:
 - а) кровяной агар
 - б) желточно-солевой агар
 - в) Эндо
 - г) Кита-Тароцци
 - д) Клауберга

2. Конечным акцептором электронов при аэробном типе дыхания у бактерий является:
 - а) молекулярный кислород
 - б) неорганические соединения
 - в) органические соединения
 - г) одновременно органические и неорганические соединения
 - д) митохондриальные белки

3. Среда Кита-Тароцци служит для выделения:
 - а) облигатных аэробов
 - б) облигатных анаэробов
 - в) факультативных аэробов
 - г) факультативных анаэробов
 - д) все ответы правильные

4. К сложным средам относятся:
 - а) МПА
 - б) пептонная вода
 - в) кровяной агар
 - г) среда Гисса
 - д) ЖСА
 - е) асцит-агар

5. Укажите способы полной стерилизации материалов:
 - а) паром под давлением
 - б) фильтрованием
 - в) гамма излучение
 - г) прокаливание
 - д) на водяной бане

6. По источникам углерода для питания бактерии подразделяют на:
 - а) фототрофы
 - б) аутотрофы
 - в) гетеротрофы
 - г) хемотрофы
 - д) ауксотрофы

7. Стерилизация - это:
 - а) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение на объектах конкретных видов микробов
 - б) комплекс мероприятий, направленных на предотвращение попадания микроорганизмов в рану
 - в) комплекс мероприятий, направленных на полное обеспложивание объектов
 - г) все ответы верные

8. Определите последовательность размножения бактерий в жидкой питательной среде:
- а) фаза логарифмического роста
 - б) лаг фаза
 - в) фаза гибели бактерий
 - г) фаза стационарного роста или максимальной концентрации бактерий
9. Биохимическая активность микробов на плотных средах Гисса учитывается по:
- а)** изменению цвета среды
 - б) образованию осадка
 - в) образованию газа
 - г) разрыву среды
 - д) все ответы правильные
10. По источникам энергии для клетки бактерии подразделяются на:
- а) аутотрофы
 - б) фототрофы
 - в) хемотрофы
 - г) гетеротрофы
 - ж) ауксотрофы
11. Основное отличие условий культивирования анаэробов от аэробов:
- а) добавление CO₂ в питательную среду и окружающее пространство
 - б) создание оптимальной температуры
 - в) создание оптимальной pH среды
 - г) добавление необходимых факторов роста
 - д) удаление O₂ из питательной среды и окружающего пространства
12. Что входит в понятие «культуральные свойства» микробы:
- а) характер роста на питательных средах
 - б)** макроскопическая характеристика колоний
 - в) морфология микробных клеток при микроскопии
 - г) ферментация углеводов на средах Гисса
 - д) отношение возбудителя к окраске по Граму
13. Какие ферменты позволяют бактерии адаптироваться к изменившимся условиям окружающей среды
- а) конститутивные
 - б) индуцильные
 - в) все ответы правильные
 - г) все ответы неправильные

СОСТАВЬТЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ПАРЫ: ВОПРОС- ОТВЕТ

14. Используют при определении количества бактерий в исследуемом материале
15. Основан на принципе механического разобщения микроорганизмов при посеве
16. Предусматривает обязательное использование дифференциально -диагностических сред
- a. Метод серийных разведений
- b. Метод Дригальского
- c. Оба
- d. Ни тот, ни другой

17. Синтезируются бактериальной клеткой постоянно
18. Синтезируются при наличии в среде субстрата
19. Позволяют бактерии адаптироваться к изменившимся условиям окружающей среды
20. Тетрациклины
21. Аминогликозиды
- a. Конститутивные ферменты**
- b. Индуцибельные ферменты**
- c. Оба**
- d. Ни тот, ни другой**
- a. Вызывают ошибки в считывании генетической информации**
- b. Ингибиторы синтеза клеточной стенки**
- c. Вызывают дезорганизацию цитоплазматической мембранны**
- d. Ингибиторы функции 30S-субъединиц рибосом**

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ №3
ПО МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ
И ИММУНОЛОГИИ
(ОБЩАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ)
УЧЕНИЕ ОБ ИНФЕКЦИИ. МЕДИЦИНСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ. РЕАКЦИИ
ИММУНИТЕТА. ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
I ВАРИАНТ

Выберите один или несколько верных ответов:

1. Кто является автором фагоцитарной теории иммунитета?
1. Бернет Ф.
 2. Ерне Н.
 3. Эрлих П.
 4. Мечников И.И.
2. Какой вид иммунитета является активным?
1. После введения иммунных сывороток
 2. Поствакцинальный
 3. Трансплацентарный
 4. Постинфекционный
3. В каких биологических жидкостях содержится лизоцим?
1. Слезы
 2. Тканевая жидкость
 3. Слюна
 4. Сыворотка
 4. Охарактеризуйте секреторный иммуноглобулин класса A
1. Обеспечивает местный иммунитет
2. Является пентамером
3. Содержит секреторный компонент
4. Проходит через плаценту
5. Иммуноглобулинов какого класса больше всего содержится в сыворотке крови здорового человека?
1. A
 2. E
 3. M

4. G

6. Какие клетки обладают фагоцитарной активностью?

1. Моноцит
2. Нейтрофил
3. Альвеолярный макрофаг
4. Эритроцит

7. В каких феноменах иммунного ответа принимают участие В-лимфоциты?

1. Выработка антител
2. Иммунный фагоцитоз
3. Иммунологическая память
4. Киллерная функция

8. Перенос гиперчувствительности замедленного типа осуществляется при введении:

1. Иммуноглобулинов Е
2. Иммуноглобулином G
3. Сенсибилизованных В-лимфоцитов
4. Сенсибилизованных Т-лимфоцитов

9. Назовите причины первичного иммунодефицита:

1. Хронические вирусные инфекции
2. Злокачественные новообразования
3. Бактериальные инфекции
4. Врожденные дефекты развития

10. Антитоксический иммунитет страдает при недостаточности:

1. Фагоцитарной системы
2. Комплемента
3. Т-системы
4. В-системы

11. Каким действием на иммунную систему характеризуются вакцины?

1. Неспецифическая активация
2. Специфическая супрессия
3. Неспецифическая супрессия
4. Специфическая активация

12. Перечислите компоненты РПГА с целью определения антител:

1. Антильный эритроцитарный диагностикум
2. Исследуемая сыворотка
3. Гемолитическая сыворотка
4. Антигенный эритроцитарный диагностикум

13. Перечислите компоненты реакции иммунного гемолиза:

1. Эритроциты
2. Комплемент
3. Гемолитическая сыворотка
4. Диагностикум

14. Гипоглобулинемия возникает при дефекте

1. Эозинофилов
2. В-лимфоцитов

3. Комплемента
4. Т-лимфоцитов

15. Какой фактор вызывает анафилактическую реакцию?

1. Пропердин
2. Лизоцим
3. С-реактивный белок
4. Иммуноглобулин Е

16. В формировании антибактериального клеточного иммунитета участвуют:

1. Лактоферин
2. В-лимфоциты
3. Комплемент
4. Фагоциты

17. Максимальный титр антител при вторичном иммунном ответе наблюдается:

1. На 1-3 день
2. На 3-5 день
3. На 5-7 день
4. На второй неделе

Составьте логические пары: вопрос-ответ

18. IgM

Ig G

Ig E

- a. Существует в форме пентамера
- b. Участвует в аллергических реакциях
- c. Проходит через плаценту
- d. Существует в форме димера

19. Макрофаги:

В-лимфоциты:

- a. Выработка антител
- b. Фагоцитоз
- c. Оба
- d. Ни то, ни другое

20. Первичный иммунодефицит:

Вторичный иммунодефицит:

- a. Врожденный дефект развития
- b. Радиационное облучение
- c. Оба
- d. Ни то, ни другое

21. Определение неполных антител:

Определение корпускулярных антигенов:

- a. Реакция преципитации
- b. Реакция агглютинации
- c. Реакция Кумбса

УЧЕНИЕ ОБ ИНФЕКЦИИ. МЕДИЦИНСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ. РЕАКЦИИ

ИММУНИТЕТА. ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

II ВАРИАНТ

Выберите один или несколько верных ответов:

1. Кто является автором гуморальной теории иммунитета?
 1. Бернет Ф.
 2. Ерне И.
 3. Мечников ИМ.
 4. Эрлих П.
2. Какой вид иммунитета является пассивным?
 1. После введения иммунных сывороток
 2. Поствакцинальный
 3. Трансплацентарный
 4. Постинфекционный
3. Какой компонент комплемента входит в состав мембраноатакующего комплекса?
 1. C2
 2. C3
 3. C4
 4. C5
4. Иммуноглобулин класса Е обладает тропизмом к:
 1. Базофилам
 2. Макрофагах
 3. Тучным клеткам
 4. Фибробластам
5. К иммунокомпетентным клеткам относятся:
 1. Лимфоциты
 2. Эритроциты
 3. Макрофаги
 4. Нейтрофины
6. Какие клетки относятся к фагоцитам?
 1. Моноцит
 2. Альвеолярный макрофаг
 3. Купферовские клетки печени (звездчатые эндотелиоциты)
 4. Нейтрофил
7. В каких формах иммунного ответа принимают участие Т - лимфоциты?
 1. Выработка антител
 2. Киллерная функция
 3. Иммунный фагоцитоз
 4. Гиперчувствительность немедленного типа
8. Иммуноглобулины синтезируются и секретируются:
 1. Т-лимфоцитами
 2. Нейтрофилами
 3. Плазматическими клетками
 4. Макрофагами
9. Факторы, ведущие к вторичным иммунодефицитам:
 1. Хронические вирусные инфекции
 2. Применение цитостатиков

3. Радиационное облучение
4. Нерациональное питание

10. Агаммаглобулинемия возникает при недостаточности:

1. Фагоцитарной функции
2. Комплемента
3. Т-системы
4. В-системы

11. Для специфической активации иммунной системы используют:

1. Вакцины
2. Адьюванты
3. Анатоксины
4. Толерогены

12. Какие ингредиенты используются в РПГА с целью определения антигена?

1. Эритроциты барана
2. Исследуемый антиген
3. Антигенный эритроцитарный диагностикум
4. Антителный эритроцитарный диагностикум

13. Перечислите компоненты реакции бактериолиза:

1. Бактерии
2. Комплемент
3. Антибактериальная сыворотка
4. Бактериальный О-антigen, адсорбированный на эритроцитах

14. Дефицит киллерной функции возникает при недостаточности:

1. Комплемента
2. В-системы
3. Опсонизации
4. Т-системы

15. К какому типу аллергических реакций относится сывороточная болезнь?

1. IV типу
2. II типу
3. I типу
4. III типу

16. Для гиперчувствительности I типа характерно участие:

1. Комплемента
2. Т-лимфоцитов
3. Цитотоксических антител
4. Тучных клеток

17. К факторам специфического иммунитета относятся:

1. Фагоцитоз
2. Лизоцим
3. Комплемент
4. Интерферон

Составьте логические пары: вопрос-ответ

18. Первичный иммунный ответ:

Вторичный иммунный ответ:

- a. Усиленной выработкой антител при повторном введении антигена
- b. Наиболее высоки уровни антител на 3 неделе после введения антигена
- c. Оба
- d. Ни то, ни другое

19. Неспецифическая резистентность:

Иммунный ответ:

- a. Т-хелперы
- b. Лизоцим
- c. Оба
- d. Ни то, ни другое

20. Иммуноглобулин класса Е:

Сенсибилизированные Т-лимфоциты:

- a. Вызывает ГЗГ
- b. Вызывает ГНТ
- c. Оба
- d. Ни то, ни другое

21. Антиген в реакции агглютинации:

Антиген в реакции преципитации:

- a. Молекулярный
- b. Корпскулярный
- c. В. Электролит

УЧЕНИЕ ОБ ИНФЕКЦИИ. МЕДИЦИНСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ. РЕАКЦИИ ИММУНИТЕТА. ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

III ВАРИАНТ

Выберите один или несколько верных ответов:

1. Какой вид иммунитета является естественно приобретенным?

- 1. После введения иммунных сывороток
- 2. Постинфекционный
- 3. Поствакцинальный
- 4. Трансплацентарный

2. Что такое гаптены?

- 1. Адьювант
- 2. Антитоксин
- 3. Полный антиген
- 4. Неполный антиген

3. Охарактеризуйте иммуноглобулин класса М:

- 1. Связывает комплемент
- 2. Проходит через плаценту
- 3. Активирует фагоцитоз

4. Имеет 2 центра связывания антигена
4. Иммуноглобулины какого класса обеспечивают местный иммунитет?
1. G
 2. M
 3. D
 4. A
5. Какие клетки участвуют в иммунном реагировании?
1. Т-киллеры
 2. Т-хелперы
 3. Макрофаги
 4. В-лимфоциты
6. Какие клетки не относят к макрофагам?
1. Эозинофил
 2. Нейтрофил
 3. Альвеолярный макрофаг
 4. Базофил
7. В каких феноменах иммунного ответа принимают участие Т-киллеры?
1. Выработка антител
 2. Противоопухолевый иммунитет
 3. Гиперчувствительность немедленного типа
 4. Противовирусный иммунитет
8. Назовите основные признаки гиперчувствительности I типа:
1. Немедленное развитие реакции
 2. Возможно провести десенсибилизацию макроорганизма
 3. Участие В-лимфоцитов
 4. Участие Т-лимфоцитов
9. При первичном иммунном дефиците может наблюдаться дефект:
1. Образования Т-лимфоцитов
 2. Образование В-лимфоцитов
 3. Дифференцировки Т- и В-лимфоцитов
 4. Продукции иммуноглобулинов
10. Как называется раздел иммунологии, изучающий и разрабатывающий способы и методы профилактики инфекционных и неинфекционных болезней, связанных с функцией иммунной системы?
1. Иммунобиотехнология
 2. Иммунобиология
 3. Иммуногематология
 4. Иммунопрофилактика
11. Виды реакции агглютинации в зависимости от характера антигенов, используемых в практике:
1. W – агглютинация
 2. O – агглютинация
 3. B – агглютинация
 4. H – агглютинация

12. Перечислите компоненты реакции преципитации с целью определения антигена:
1. Физиологический раствор
 2. Диагностическая сыворотка
 3. Молекулярный антиген
 4. Корпускулярный антиген
13. Перечислите компоненты РСК с целью определения антител:
1. Антигенный диагностикум
 2. Комплемент
 3. Гемолитическая сыворотка
 4. Исследуемая сыворотка
14. Назовите основные признаки гиперчувствительности IV типа:
1. Лимфоцитарно-макрофагальная реакция
 2. Возможно провести десенсибилизацию макроорганизма
 3. Участие Т-лимфоцитов
 4. Участие В-лимфоцитов
15. Для гиперчувствительности IV типа характерно участие:
1. Иммуноглобулина класса Е
 2. Комплемента
 3. Участие тучных клеток
 4. Т-лимфоцитов
16. Какая часть иммуноглобулина взаимодействует с антигеном?
1. Fc-фрагмент
 2. Шарнирная область
 3. Константный домен
 4. V-область
17. Тимусзависимые антигены вызывают иммунный ответ при участии:
1. Нейтрофилов
 2. В-лимфоцитов
 3. Эозинофилов
 4. Т-лимфоцитов

Составьте логические пары: вопрос-ответ

18. Иммунологическая память:
Иммунологическая толерантность:
- a. Усиленная выработка антител при повторном введении антигена
 - b. Отсутствие выработки антител после введения антигена
 - c. Оба
 - d. Ни то, ни другое
19. Выявляют в реакции Кумбса:
Агглютинируют корпускулярный антиген:
- a. Неполные антитела
 - b. Полные антитела
 - c. Оба
 - d. Ни то, ни другое
20. Характер реакции О-агглютинации:

Характер реакции Н - агглютинации:

- a. Гомогенная
- b. Крупнохлопчатая
- c. Инициальная
- d. Мелкозернистая

21. Метка диагностических сывороток для ИФА

Метка диагностических сывороток для РИА

Метка диагностических сывороток для РИФ:

- a. Супероксиданион
- b. Флюорохромы
- c. Ферменты
- d. Радиоактивные изотопы

УЧЕНИЕ ОБ ИНФЕКЦИИ. МЕДИЦИНСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ. РЕАКЦИИ ИММУНИТЕТА. ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

IV ВARIАНТ

Выберите один или несколько верных ответов:

1. Какой вид иммунитета является искусственно приобретенным?

- 1. После введения иммунных сывороток
- 2. Постинфекционный
- 3. Поствакцинальный
- 4. Трансплацентарный

2. К факторам неспецифической резистентности относят:

- 1. Фагоцитоз
- 2. Лизоцим
- 3. Комплмент
- 4. Нормальная микрофлора

3. Охарактеризуйте иммуноглобулин класса G:

- 1. Связывает комплемент
- 2. Мономер
- 3. Проходит через плаценту
- 4. Обеспечивает местный иммунитет

4. Какая часть иммуноглобулина взаимодействует с комплементом?

- 1. Fc-фрагмент
- 2. Fab-фрагмент
- 3. Дисульфидные связи
- 4. Шарнирная область

5. Какие клетки участвуют в формировании неспецифической резистентности?

- 1. Т-киллеры
- 2. Макрофаги
- 3. В-лимфоциты
- 4. Естественные киллеры

6. В каких феноменах иммунного ответа принимают участие лимфоциты?

- 1. Выработка антител

2. Киллерная функция
3. Иммунологическая память
4. Иммунный фагоцитоз

7. Для антитоксического иммунитета характерно участие:

1. Фагоцитоз
2. Т-киллеров
3. Лизоцима
4. Антител

8. Каким видом иммунитета обусловлена сывороточная болезнь?

1. Клеточным
2. Противоопухлевым
3. Трансплантационным
4. Гуморальным

9. При вторичном иммунном дефиците может наблюдаться дефект:

1. Образования Т-лимфоцитов
2. Образования В-лимфоцитов
3. Дифференциации Т- и В-лимфоцитов
4. Продукции иммуноглобулинов

10. Какие вещества относятся к иммунобиологическим препаратам ?

1. Вакцины
2. Иммуноглобулины
3. Адьюванты
4. Диагностикумы

11. Перечислите компоненты реакции агглютинации с целью определения антител:

1. Бактериальный диагностикум
2. Физиологический раствор
3. Исследуемая сыворотка
4. Эритроцитарный диагностикум

12. Как получить сыворотку для определения глобулинов кролика?

1. Иммунизировать барана эритроцитами кролика
2. Иммунизировать кролика глобулинами кролика
3. Иммунизировать кролика глобулинами человека
4. Иммунизировать барана глобулинами кролика

13. При проведении каких иммунных реакций необходимо проводить тщательные отмывания?

1. РПГА
2. РИФ
3. РА
4. ИФА

14. При каком типе гиперчувствительности наблюдается цитотоксичность?

1. I типа
2. II типа
3. III типа
4. IV типа

15. Феномен иммунологической памяти основан на:

1. Активации Т-хеллеров
2. Отсутствии определенных клонов иммунных клеток
3. Отсутствии антигенов гистосовместимости
4. Образовании клеток памяти

16. При первичном иммунном ответе максимальный титр антител наблюдается:

1. На 1 - 3 день
2. На 3 - 5 день
3. На второй неделе
4. На третьей неделе

17. Назовите синонимы термина «антигенная детерминанта»:

1. Биотопы
2. Биоценозы
3. Эписомы
4. Эпитопы

Составьте логические пары: вопрос-ответ

18. Пассивный, естественно приобретенный иммунитет:

Активный, естественно приобретенный иммунитет:

- a. Постинфекционный
- b. Поствакцинальный
- c. Трансплацентарный
- d. Трансплантационный

19. Трансплантационный антиген:

Антиген бактериальной клетки:

- a. H-антиген
- b. O-антиген
- c. Оба
- d. Ни то, ни другое

20. Цель применения реакции Кумбса:

Цель применения метода Кастеллани:

- a. Получение адсорбированных агглютинирующих сывороток
- b. Определение молекулярного антигена
- c. Выявление неполных антител

21. Диагностические сыворотки в РИА метят:

Диагностические сыворотки в РИФ метят:

- a. Ферментами
- b. Радиоактивным изотопом
- c. Супероксидным анионом
- d. Флюорохромом

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ №1
ПО ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ

**ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ПАТОГЕННЫМИ
И УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫМИ КОККАМИ**

I ВАРИАНТ

Выберите один или несколько верных ответов:

1. Материал для бактериологического исследования при скарлатине:

1. Кровь
2. Моча
3. Сыворотка крови
4. Мазок из зева

2. Пневмония могут вызывать:

1. Пневмококк
2. Микоплазмы
3. Стaphилококк
4. Неспорообразующие анаэробные кокки

3. К грамположительным бактериям относятся все, кроме:

1. Менингококка
2. Золотистый стафилококк
3. Пневмококка
4. Стрептококка

4. Грамотрицательные кокки-воздушители:

1. Скарлатины
2. Гонореи
3. Ревматизма
4. Эпидемического цереброспинального менингита

5. Среди кокков встречаются:

1. Грамположительные
2. Грамотрицательные
3. L-формы
4. Кислотоустойчивые

6. Материал для исследования при гнойно-воспалительных заболеваниях стрептококковой этиологии может быть:

1. Мазок из зева
2. Гной
3. Мокрота
4. Раневое отделяемое

7. Прочный постинфекционный иммунитет формируется после:

1. Стaphилококкового фурункулеза
2. Гонореи
3. Скарлатины
4. Рожистого воспаления

8. КАКОЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДУЕТ БРАТЬ У ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ГОНОРЕЮ?
1. ОТДЕЛЯЕМОЕ УРЕТРЫ
 2. ВАГИНАЛЬНЫЙ МАЗОК
 3. МАЗОК ИЗ ЗЕВА
 4. РЕКТАЛЬНЫЙ МАЗОК

9. НАЗОВИТЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОЗБУДИТЕЛЯ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ
1. РОСТ НА ПРОСТЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ
 2. РОСТ ТОЛЬКО НА **СЛОЖНЫХ** СРЕДАХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НАТИВНОГО БЕЛКА
 3. АНАЭРОБ
 4. CO₂ СТИМУЛИРУЕТ РОСТ ВОЗБУДИТЕЛЯ

10. Гнойно-воспалительные заболевания, вызываемые условно патогенными кокками характеризуются:
1. Различной локализацией
 2. Многообразием клинических форм
 3. Снижением резистентности макроорганизма
 4. Слабым иммунным ответом

11. Для профилактики какой инфекции может быть использован анатоксин?
1. Стафилококковая
 2. Стрептококковая
 3. Гонококковая
 4. Менингококковая

12. Питательные среды, которые можно использовать для выделения условно-патогенных стафилококков:
1. 10 % желточно-солевой агар
 2. Кровяной агар
 3. Сывороточный агар
 4. ПА

13. Для гемолитических стрептококков характерно
1. Имеют адгезины - комплекс липотеichoевой кислоты
 2. Неподвижны, спор и капсул не образуют
 3. Продуцируют стрептокиназу, гиалуронидазу и другие ферменты
 4. Выделяют экзотоксины

14. При каких заболеваниях применяется метод «провокации»
1. Ревматизме
 2. Менингите
 3. Гонорее
 4. Синдроме токсического шока
15. Какой из микроорганизмов кокковидной формы продуцирует токсин «синдром токсического шока»:
1. Пневмококк
 2. Стапилококк
 3. Стрептококк
 4. Менингококк

16. Эритрогенныи токсин способен продуцировать:
1. *S. aureus*
 2. *S. pyogenes*
 3. *S. pneumoniae*
 4. *N. meningitidis*

17. Сложный дифференциально-диагностический метод окраски, позволяющий судить о строении клеточной стенки патогенных кокков:

1. Бурри-Гинса
2. Нейссера
3. Грама
4. Романовского-Гимзы

СОСТАВЬТЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ПАРЫ: ВОПРОС-ОТВЕТ

18.

1. Менигококк
2. Пневмококк
3. Гонококк

А Род *Meningococcus*

Б. Род *Neisseria*

Б. Род *Streptococcus*

19.

1. Отсутствие тропизма
2. Низкая ферментативная активность
3. Высокая ферментативная активность
4. Рост на солевых средах
5. Рост только на богатых белком средах

А. Патогенные нейссерии

Б. Стaphилококки

В. Оба

Г. Ни то, ни другое

20.

1. Незавершенный фагоцитоз
 2. Образует цепочки клеток в бульонной культуре
 3. Может продуцировать энтеротоксин
 4. Вызывает бленорею
- А. *S.aureus*
- Б. *S.pyogenes*
- Б. *N.gonorrhoeae*

21.

1. МОРФОЛОГИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ ГОНОРЕИ:

- А. Диплококк бобовидной формы
- Б. Ланцетовидный диплококк
- В. Коккобактерия
- Г. Стрептококк

**ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ
ПАТОГЕННЫМИ И УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫМИ КОККАМИ**
II ВАРИАНТ

Выберите один или несколько верных ответов:

1. Кокки могут передаваться:

- 1. Контактным путем
- 2. Воздушно-капельным путем
- 3. Алиментарным путем
- 4. Половым путем

2. Гонококки и менингококки в чистой культуре и исследуемом материале обычно располагаются:

- 1. Одиночно
- 2. Цепочками
- 3. Попарно
- 4. Гроздьями

3. Материал для бактериологического метода исследования при менингококковой инфекции:

- 1. Ликвор
- 2. Мазок из носоглотки
- 4. Сыворотка
- 3. Кровь
- 4. Сыворотка

4. Пневмонию могут вызывать:

- 1. Пневмококк
- 2. Микоплазмы
- 3. Стaphилококк
- 4. Неспорообразующие анаэробные кокки

5. Материал для бактериологического исследования при скарлатине:

- 1. Кровь
- 2. Моча
- 3. Сыворотка
- 4. Мазок из зева

6. Основные методы диагностики пневмококковых инфекций

- 1. Аллергический
- 2. Бактериологический
- 3. Серологический
- 4. Биологический

7. Кокки могут быть:

- 1. Факультативными анаэробами
- 2. Облигатными анаэробами
- 3. Аэробами
- 4. Капнофилами

8. Стaphилококки в чистой культуре обычно располагаются:

- 1. Парами

2. Одиночно
3. Цепочками
4. Гроздьями

9. Какие факторы патогенности могут быть у стафилококков:

1. Эксфолиативный токсин
2. Экзоферменты
3. Гемолизины
4. Энтеротоксины

10. Антигенами стафилококков являются:

1. Протеин А
2. Тейхоевые кислоты
3. Токсины
4. Липополисахарид

11. Для лечения: тяжелых острых стафилококковых инфекций (сепсис и др.) можно использовать:

1. Иммуноглобулин
2. Убитая вакцина
3. Гипериммунная плазма
4. Живая вакцина

12. Для какого возбудителя характерен незавершенный фагоцитоз?

1. Золотистый стафилококк
2. Стреptококк
3. Эпидермальный стафилококк
4. Гонококк

13. В каких формах может протекать менингококковая инфекция?

1. Менингит
2. Назофарингит
3. «Здоровое» носительство
4. Фурункулез

14. Клетки какого возбудителя в бульонной культуре располагаются цепочками:

1. Гонококк
2. Эпидермальный стафилококк
3. Золотистый стафилококк
4. Стреptококк

15. Основной путь передачи бленореи новорожденных

1. Контактный
2. Контактно-бытовой
3. Половой
4. Водный

17. Какие кокки чувствительны к оптохину и желчи:

1. Стреptококк
2. Стафилококк
3. Пневмококк

4. Менингококк

18. Для \square -гемолитических стрептококков характерно:

1. Имеют адгезины - комплекс липотефоевой кислоты
2. Неподвижны, спор и капсул не образует
3. Продуцируют ферменты: стрептокиназу и гиалуронидазу
4. Выделяют токсины

Составьте логические пары вопрос-ответ

18.

1. Лечение тяжелых острых гнойно-воспалительных заболеваний стафилококковой природы
 2. Лечение хронической гонореи
 3. Профилактика бленореи новорожденных
 4. Специфическая профилактика менингококковой инфекции
- A 0 8% раствор NaCl
Б. 2% раствор нитрата серебра
В. Химическая вакцина

19.

1. Лецитовителазная активность на желточно-солевом агаре
 2. Наличие плазмокоагулазы
 3. Отсутствие плазмокоагулазы
 4. Пигментообразование
- A. Золотистый стафилококк
Б. Эпидермальный стафилококк
В. Оба
Г. Ни то, ни другое

20.

Основные методы диагностики:

1. Острая гонорея
 2. Стапилококковые инфекции
 3. Ревматизм
- A. Серологический (определение титра анти О-стрептолизина)
Б. Биологический
В. Микроскопический

Г. Бактериологический

21.

1. Возбудитель гонореи культивируется:

- A. На средах, содержащих сыворотку и кровь в аэробных условиях
Б. На средах, содержащих кусочки органов в анаэробных условиях
В. На простых питательных средах в аэробных условиях
Г. Ничего из перечисленного не верно

Выберите один или несколько верных ответов:

1. Кокки:
 1. Прокариоты
 2. Спор не образуют
 3. Неподвижны
 4. Клетки имеют окружную форму

2. Грамотрицательные бактерии:
 1. Менингококки
 2. Стафилококки
 3. Гонококки
 4. Стрептококки

3. Методы микробиологической диагностики пневмококковой инфекции:
 1. Бактериологический
 2. Серологический
 3. Биологический
 4. Аллергический

4. Какие бактерии в чистой культуре и исследуемом материале располагаются попарно?
 1. Пневмококки
 2. Ставилококки
 3. Менингококки
 4. Все вышеперечисленное верно

5. Какой материал для микробиологического исследования следует брать у пациента при подозрении на гонорею?
 1. Отделяемое уретры
 2. Вагинальный мазок
 3. Мазок т зева
 4. Ректальный мазок

6. После какого заболевания стрептококковой этиологии формируется прочный иммунитет?
 1. Тонзиллит
 2. Ревматизм
 3. Скарлатина
 4. Сепсис

7. Назовите токсин возбудителя скарлатины:
 1. Фибринолизин
 2. Эритрогенин
 3. Эритролизин
 4. Плазмокоагулаза

8. Антигенами и стафилококков являются:
 1. Протеин А
 2. Тейхоевые кислоты
 3. Токсины
 4. Липополисахарид

9. Для лечения тяжелых острый стафилококковых инфекций (сепсис и др.) можно использовать:

1. 1.Иммуноглобулин
2. Убитая вакцина
3. Гипериммунизированная плазма
4. Живая вакцина

10. Для какого возбудителя характерен незавершенный фагоцитоз?

1. Золотистый стафилококк
2. Пиогенный стрептококк
3. Эпидермальный стафилококк
4. Гонококк

11. В каких формах может протекать менингококковая инфекция?

1. Менингит
2. Назофарингит
3. «Здоровое» носительство
4. Фурункулез

12. Клетки какого возбудителя в бульонной культуре располагаются цепочками:

1. Гонококк
2. Эпидермальный стафилококк
3. Золотистый стафилококк
4. Стрептококк

13. Основной путь передачи бленореи новорожденных:

1. Контактный
2. Контактно-бытовой
3. Половой
4. Водный

17. Какие кокки чувствительны к оптохину и желчи:

1. Стрептококк
2. Страфилококк
3. Гонококк
4. Менингококк

18. Для β-гемолитических стрептококков характерно:

1. Имеют адгезины - комплекс липотефоевой кислоты
2. Неподвижны, спор и капсул не образует
3. Продуцируют ферменты: стрептокиназу и гиалуронидазу
4. Выделяют токсины

19. Для культивирования каких кокков необходимо использовать сложные питательные среды с обязательным добавлением нативного белка?

1. Менингококки
2. Энтерококки
3. Гонококки
4. Страфилококки

20. Гнойно-воспалительные заболевания, вызываемые условно-патогенными кокками, характеризуются:

1. Различной локализацией
2. Многообразием клинических форм
3. Снижением резистентности макроорганизма

4. Возможностью генерализации процесса

СОСТАВЬТЕ ЛОГИЧЕСКИЕ: ПАРЫ ВОПРОС-ОТВЕТ

18.

- 1. Менингококк
- 2. Пневмококк
- 3. Гонококк
- А. Род Meningococcus
- Б. Род Neisseria
- В. Род Streptococcus
- Г. Род Gonococcus
- Д. Род Pneumococcus

19.

- 1. Отсутствие тропизма
- 2. Низкая ферментативная активность
- 3. Высокая ферментативная активность
- 4. Рост на солевых средах
- 5. Рост только на богатых белком средах
- А. Патогенные нейссерии
- Б. Стaphилококки
- В. Оба
- Г. Ни то, ни другое

20.

- 1. Незавершенный фагоцитоз
- 2. Образует цепочки клеток в бульонной культуре
- 3. Может продуцировать энтеротоксин
- 4. Вызывает бленорею
- А. S.aureus
- Б. S.pyogenes
- В. N.gonorrhoeae

21.

- 1. Морфология возбудителя гонореи:
- А. Диплококк бобовидной формы
- Б. Ланцетовидный диплококк
- В. Коккобактерия
- Г. Стрептококк

**ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ
ПАТОГЕННЫМИ И УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫМИ КОККАМИ**

IV ВАРИАНТ

Выберите один или несколько верных ответов:

- 1. Условно-патогенные кокки, способные вызывать заболевания различной локализации:
 - 1. Стaphилококки
 - 2. Пневмококки
 - 3. Стрептококки
 - 4. Менингококки
2. К грамположительным бактериям относятся:

1. Стaphилококк
2. Пневмококк
3. Стрептококк
4. Менингококк

3. Основной путь передачи гонореи:

1. Половой
2. Контактно-бытовой
3. Пищевой
4. Трансмиссивный

4. Какие бактерии в чистой культуре и исследуемом материале располагаются попарно?

1. Пневмококки
2. Стaphилококки
3. Менингококки
4. Все вышеперечисленное верно

5. Биологические свойства возбудителя гонореи:

1. Чувствителен к факторам внешней среды
2. Патогенен только для человека
1. Растет на питательных средах с добавлением человеческого белка.
2. Подвижен

6. Основные методы диагностики пневмококковых инфекций:

1. Аллергический
2. Бактериологический
3. Серологический
4. Биологический

7. Материалом для исследования при гнойно-воспалительных заболеваниях стрептококковой этиологии может быть:

1. Мазок из зева
2. Гной
3. Мокрота
4. Раневое отделяемое

8. Для какого возбудителя характерен незавершенный фагоцитоз

1. Золотистый стaphилококк
2. Пиогенный стрептококк
3. Эпидермальный стaphилококк
4. Гонококк

9. Какой из типов токсинов обуславливает появление сыпи при скарлатине?

1. Энтеротоксин
2. Эритроген
3. Эксфолиатин
4. Гемолизин

10. Множественная лекарственная резистентность у стaphилококков обусловлена наличием:

1. капсулы
2. Ent-плазмиды
3. Гиалуронидазы

4. R-плазмиды

11. Факторы патогенности стафилококков:

1. Адгезины
2. Токсин синдрома токсического шока
3. Белок A
4. Плазмокоагулаза

12. Лейцитовителлазную активность стафилококков можно выявить на:

1. Желточно-солевом агаре
2. Среде Левина
3. Кровяном агаре
4. Среде Эндо

13. Для лечения тяжелых острых стафилококковых инфекций (сепсис и др.) можно использовать:

1. Иммуноглобулин
2. Убитую вакцину
3. Гипериммунную плазму
4. Живую вакцину

14. Питательные среды, которые можно использовать для выделения условно-патогенных стафилококков:

1. 10% желточно-солевой агар
2. Кровяной агар
3. Сывороточный агар
4. МПА

15. Антигенами стафилококков являются:

1. Протеин A
2. Тейхоевые кислоты
3. Токсины
4. Липополисахарид

16. Какие кокки чувствительны к оптохину и желчи:

1. Стреptококк
2. Стaфило kokк
3. Гонококк
4. Менингококк

17. Для β-гемолитических стрептококков характерно:

1. Имеют адгезины - комплекс липотеихоевой кислоты
2. Неподвижны, спор и капсул не образует
3. Продуцируют ферменты: стрептокиназу и гиалуронидазу
4. Выделяют токсины

18.

1. Профилактика бленореи новорожденных
2. Лечение хронических стафилококковых инфекций
3. Активная профилактика менингококковой инфекции в отдельных коллективах
 - A. Химическая полисахаридная вакцина
 - Б. Анатоксин

В. Гипериммунная сыворотка
Г. 2% раствор нитрата серебра

19. Возбудитель гонореи:

1. Стреptококк
2. Стaфилокoкк
3. N. meningitidis
4. N.gonorrhoeae

20. Характерное расположение в чистой культуре:

1. Стaфилокoкки
2. Бета-гемолитические стрептококки серогруппы А
3. Нейссерии
- А. Гроздьями
- Б. Цепочками
- В. Попарно
- Г. Тетрадами

21.

1. Рожистое воспаление
2. Бленорея
3. Синдром токсического шока
4. Ревматизм
- А. Стaфилокoкк
- Б. Гонококк
- В. Бета -гемолитические стрептококки группы А
- Г. Пневмококк

**ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ №2
ПО ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ**

**ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА БАКТЕРИАЛЬНЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ
I ВАРИАНТ**

Выберите один или несколько верных ответов:

1. Таксономическое положение возбудителя брюшного тифа:

1. Род Salmonella
2. Семейство Vibrionaceae
3. Семейство Enterobacteriaceae
4. Род Vibrio

2. Свойства бактерий рода Salmonella:

1. Продуцируют H₂S
2. Лактозоотрицательны
3. Подвижны
4. Грамположительны

3. Материал для бактериологического исследования при холере:

1. Кровь
2. Рвотные массы
3. Моча

4. Испражнения

4. Для серологического метода диагностики брюшного тифа применяют реакции:

1. РПГА
2. ИФА
3. ПЦР
4. РА на стекле

5. Диареегенные кишечные палочки:

1. Продуцируют энтеротоксины
2. Лактозоположительны
3. Имеют плазмиды патогенности
4. Имеют эндотоксин

6. Питательные среды для выделения и идентификации возбудителя шигеллеза:

1. Плоскирева
2. Клиглера
3. Эндо
4. Щелочная пептонная вода

7. Свойства бактерий рода Shigella:

1. Образуют споры
2. Лактозоотрицательны
3. Имеют Н- антиген
4. Не продуцируют H₂S

8. Факторы патогенности возбудителей холеры:

1. Инвазивные белки наружной мембранны
2. Энтеротоксин
3. Токсин Шига
4. Нейраминидаза

9. Условия культивирования возбудителя кишечного иерсиниоза:

1. Щелочные питательные среды
2. Строго анаэробные условия
3. Время инкубации 5-7 суток
4. Температура 20-25° С

10. Методы микробиологической диагностики кишечного иерсиниоза:

1. Бактериологический
2. Бактериоскопический
3. Серологический
4. Биологический

11. Питательные среды для выделения и идентификации гемокультуры возбудителя при брюшном тифе:

1. Желчный бульон
2. Клиглера
3. Щелочная пептонная вода
4. Левина

12. Серологический метод диагностики брюшного тифа позволяет:

1. Оценить динамику заболевания

2. Выявить бактерионосительство
3. Провести ретроспективную диагностику
4. Серотипировать возбудителя

13. Материал для бактериологического исследования на 1-й неделе заболевания брюшным тифом:

1. Моча
2. Испражнения
3. Сыворотка
4. Кровь

14. Значение кишечной палочки для макроорганизма:

1. Антагонист патогенной гнилостной микрофлоры
2. Расщепляет клетчатку
3. Может вызвать воспалительный процесс в мочевом и желчном пузырях
4. Может вызвать сепсис

15. Методы микробиологической диагностики брюшного тифа на 3-й неделе заболевания:

1. Бактериоскопический
2. Бактериологический
3. Биологический
4. Серологический

16. Развитие диарейного синдрома при сальмонеллезе является результатом:

1. Действия энтеротоксина
2. Размножения сальмонелл в эпителиальных клетках поверхностного эпителия
3. Активации эндотоксином каскада арахидоновой кислоты
4. Действия шигаподобного токсина

17. Питательные среды для выделения и идентификации сальмонелл:

1. Висмут-сульфитный агар
2. Левина
3. Клиглера
4. Желчный бульон

СОСТАВЬТЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ПАРЫ В ОПРОС-ОТВЕТ

18.

1. Холера
2. Шигеллез
3. Сальмонеллез
4. Кишечный эшерихиоз

А.ЭТКП

Б. *S enteritidis*

В. *S.typhi*

Г. *V.cholerae*

Д. *S.sonnei*

19.

1. Агглютинируются поливалентной эшерихиозной ОК-сывороткой (антитела к 0157)
 2. Вызывают гнойно-воспалительные заболевания различной локализации
 3. Продуцируют энтеротоксины
 4. Обладает психрофильностью
- А. Условно -патогенные кишечные палочки
- Б. Диареегенные кишечные палочки

- В. Оба
Г. Ни то, ни другое
20.
1. Прикрепление и колонизация поверхности эпителия тонкой кишки
2. Инвазия и размножение в эпителии толстой кишки
3. Трансцитоз эпителия тонкой кишки с размножением в регионарной лимфоидной ткани
А. Шигеллы
Б. Холерный вибрион
В. Сальмонеллы
Г. ЭПКП
21
1. Прикрепление и повреждение апикальной части ворсинок эпителия тонкой кишки
2. Инвазия и внутриклеточное размножение в эпителии толстой кишки
3. Прикрепление и колонизация поверхности эпителия тонкой кишки
А. *V.cholerae*
Б. *S. typhi*
В. ЭПКП
Г. ЭИКП

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА БАКТЕРИАЛЬНЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ П ВАРИАНТ

Выберите один или несколько верных ответов:

1. Какие методы используются для диагностики брюшного тифа?
 1. Бактериоскопический
 2. Бактериологический
 3. Биологический
 4. Серологический

2. Свойства бактерий рода *Escherichia*
 1. Грамположительны
 2. Лактозоположительны
 3. Образуют споры
 4. Не продуцируют H_2S

3. Какими свойствами обладают бактерии сем. *Enterobactericeal*:
 1. Грамотрицательные палочки
 2. Не образуют спор
 3. Факультативные анаэробы
 4. Имеют зерна волотина

4. Назовите факторы патогенности шигелл:
 1. Инвазивные белки наружной мембранны
 2. W, V-антителы
 3. Шига-подобный токсин
 4. Холероген

5. Какими факторами патогенности обладает возбудитель холеры:
 1. Инвазивные белки наружной мембранны
 2. Энтеротоксин
 3. Токсин Шига
 4. Нейраминидаза

6. Серологический метод диагностики брюшного тифа позволяет:
1. Оценить динамику инфекционного процесса
 2. Выявить бактерионосительство
 3. Провести ретроспективную диагностику
 4. Серопитирать возбудителя
7. Какие среды используют при выделении возбудителя холеры?
1. Щелочная пептонная вода
 2. Клиглера
 3. Щелочной агар
 4. Желчный бульон
8. По каким свойствам различаются диареогенные кишечные палочки?
1. Наличие плазмид вирулентности
 2. Лактозонегативность
 3. Антигенная структура
 4. Продукция H_2S
9. Назовите препараты для специфической профилактики брюшного тифа:
1. Химическая вакцина
 2. Инактивированная корпускулярная вакцина
 3. Бактериофаг
 4. Анатоксин
10. Возбудитель кишечного иерсииоза характеризуется следующими свойствами:
1. Продуцирует энтеротоксин
 2. Обладает психрофильностью
 3. Характеризуется незавершенностью фагоцитоза
 4. Продуцирует нейротоксин
11. Какие препараты используются для лечения и профилактики дизентерии?
1. Интести-бактериофаг
 2. Дизентерийный бактериофаг
 3. Vi-бактериофаг
 4. Пиоционеус-бактериофаг
12. Какие виды шигелл образуют экзотоксин?
1. Sh.flexneri
 2. Sh.boydii
 3. Sh.disenteriae
 4. Sh.sonnoe
13. Какие методы диагностики холеры относятся к ускоренным?
1. Иммобилизация в темном поле
 2. Агглютинация в темном поле
 3. Метод Ермольевой
 4. Иммунофлюоресцентный метод
14. Диареогенные кишечные палочки различаются по:
1. Наличию плазмид вирулентности
 2. Факторам патогенности
 3. Антигенной структуре

4. Продукции H₂S

15. Питательные среды для выделения и идентификации возбудителя колиэнтерита:

1. Эндо
2. Клиглера
3. Гисса
4. Желчный бульон

16. Материал для бактериологического исследования при шигеллезе:

1. Кровь
2. Сыворотка крови
3. Моча
4. Испражнения

17. Диареегенные и условно-патогенные кишечные палочки различаются по:

1. Тинкториальным свойствам
2. Способности утилизировать лактозу
3. Морфологическим свойствам
4. Антигенной структуре

СОСТАВЬТЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ПАРЫ В ОПРОС-ОТВЕТ

18.

1. Холера
 2. Паратиф А
 3. Кишечный эшерихиоз
 4. Шигеллез
- A. S.dysenteriae
Б. V.cholerae
В. S.typhimurium
Г. ЭПКП
Д. S.paratyphi

19.

1. Относится к серогруппе O1
2. Устойчив к полимиксину
3. Чувствителен к бактериофагу C
4. Продуцирует энтеротоксин

А. Биовар cholerae

Б. Биовар eltor

В. Оба

Г. Ни то, ни другое

20. Трансцитоз эпителия с цитотоксическим эффектом

А Иерсинии

Б. Холерный вибрион

В. Сальмонеллы

Г. Шигеллы

21. Укажите правильную последовательность действий при микробиологической диагностике шигиллеза:

- А. Идентификация выделенной чистой культуры
- Б. Пересев лактозонегативных колоний на среду Клиглера
- В. Посев материала на среды Левина и Плоскирева
- Г. Определение чувствительности к антибиотикам

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА БАКТЕРИАЛЬНЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

III ВАРИАНТ

Выберите один или несколько верных ответов:

1. Какой материал используют для бактериологического исследования на 1-й неделе заболевания брюшным тифом?
 1. Моча
 2. Испражнения
 3. Сыворотка
 4. Кровь

1. Какие свойства характерны для представителей семейства Enterobacteriaceal:
 1. Нуждаются в щелочных питательных средах
 2. Грамотрицательные палочки
 3. Образуют споры
 4. Ферментируют углеводы

3. Какие среды используют для выделения и идентификации возбудителя колиэнтерита?
 1. Эндо
 2. Клиглера
 3. Левина
 4. Желчный бульон

4. Реакции, используемые для серологического метода диагностики брюшного тифа:
 1. РПГА
 2. ИФА
 3. Развернутая РА
 4. РА на стекле

5. Материал для бактериологического исследования при шigelлезе:
 1. Кровь
 2. Сыворотка
 3. Моча
 4. Испражнения

6. Какие среды используют для накопления возбудителя холеры?
 1. Эндо
 2. Клиглера
 3. Желчный Бульон
 4. Щелочная пептонная вода

7. По каким свойствам различаются биовары вибриона cholerae и eltor?
 1. По реакции агглютинации с 01-сывороткой
 2. По чувствительности к полимиксину
 3. По отношению к сыворотке Инаба
 4. По чувствительности к специфическим бактериофагам

8. Развитие диарейного синдрома при сальмонеллезе связано с:
 1. Действием энтеротоксина.

2. Размножением сальмонелл в эпителиальных клетках поверхностного эпителия
3. Активизацией экзотоксином каскада арахидоновой кислоты
4. Блокированием нейрососудистых рецепторов
9. Какие условия необходимо соблюдать при культивировании возбудителя кишечного иерсиниоза?
1. Щелочные питательные среды
 2. Строго анаэробные условия
 3. Температура 37 °C
 4. Температура 20-25 °C
10. Назовите серовары холерного вибриона?
1. Огава
 2. Инаба
 3. Гикошима
 4. Холересуис
11. По каким свойствам различаются диареегенные и условно-патогенные кишечные палочки?
1. Психрофильность
 2. Способность утилизировать лактозу
 3. Способность продуцировать H2S
 4. Антигенная структура
12. Методы микробиологической диагностики брюшного тифа на 3-й неделе заболевания:
1. Бактериологический
 2. Бактериоскопический
 3. Биологический
 4. Серологический
13. На первом этапе бактериологического исследования при инфекциях, вызванных представителями семейства кишечных бактерий, посев испражнений производится на среды:
1. МПА
 2. Клигера
 3. Пептонную воду
 4. Лактозосодержащие дифференциально-диагностические среды
14. Какие среды используют при выделении и идентификации возбудителя сальмонеллеза?
1. Висмут-сульфитный агар
 2. Плоскирева
 3. Клиглера
 4. Селенитовый бульон
15. Таксономическое положение возбудителя брюшного тифа:
1. Род *Salmonella*
 2. Семейство *Vibrionaceae*
 3. Семейство *Enterobacteriaceae*
 4. Род *Vibrio*

16. Свойства бактерий рода *Salmonella*:

1. Продуцируют H₂S
2. Лактозоотрицательны
3. Подвижны
4. Грамположительны

17. Материал для бактериологического исследования при холере:

1. Кровь
2. Рвотные массы
3. Моча
4. Испражнения

Составьте логические пары вопрос-ответ

18.

1. Сальмонеллез
2. Кишечный иерсиниоз
3. Брюшной тиф
4. Шигеллез
 - A. *S. typhi*
 - Б. *S. enteritidis*
 - В. *Y. enterocolitica*
 - Г. *S. flexneri*
 - Д. *V. cholerae*

19.

1. Трансцитоз эпителия тонкой кишки с размножением в регионарной лимфоидной ткани кишечника
2. Инвазия и внутриклеточное размножение в эпителии толстой кишки
3. Прикрепление и колонизация поверхности эпителия тонкой кишки
 - А. Шигеллы
 - Б. Сальмонеллы
 - В. Холерный вибрион
 - Г. ЭПКП

20.

1. Укажите правильную последовательность действий при бактериологическом методе диагностики брюшного тифа:
 - А. Пересев на среды Эндо, Левина
 - Б. Фаготипирование
 - В. Пересев лактозонегативных колоний на среду Клиглера
 - Г. Идентификация выделенной культуры
 - Д. Посев исследуемого материала на желчный бульон

21.

1. Расщепляют маннит
2. Чаще передается водным путем
3. Чаще передается контактно-бытовым путем
4. Размножается в ткани кишечника
 - А. *S. flexneri*
 - Б. *S. dysenteriae*
 - В. Оба
 - Г. Ни то, ни другое

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА БАКТЕРИАЛЬНЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

IV ВARIANT

Выберите один или несколько верных ответов:

1. Какие антигены имеют сальмонеллы брюшного тифа?
 1. О
 2. Н
 3. В
 4. К
 5. МА

2. Какие антигены вирулентности есть у E.coli?
 1. Е
 2. В
 3. Н
 4. К

3. Какие среды используют для накопления холерного вибриона?
 1. Сахарный бульон
 2. Желчный бульон
 3. Сывороточный бульон
 4. Щелочная пептонная вода

4. Какие методы исследования используют для диагностики кишечного иерсиниоза?
 1. Бактериологический
 2. Бактериоскопический
 3. Серологический
 4. Биологический

5. Материал для бактериологического исследования при шигеллезе:
 1. Кровь
 2. Моча
 3. Испражнения
 4. Сыворотка

6. Какими свойствами обладают бактерии рода Shigella?
 1. Образуют споры
 2. Лактозоотрицательны
 3. Обладают Н-антителом
 4. Не производят H₂S

7. Препараты для специфической профилактики брюшного тифа:
 1. Химическая вакцина
 2. Инактивированная корпуксуллярная вакцина
 3. Бактериофаг
 4. Анатоксин

8. Значение кишечной палочки для макроорганизма:
 1. Антагонист патогенной гнилостной микрофлоры
 2. Расщепляет клетчатку
 3. Может вызвать воспалительный процесс в мочевом и желчном пузырях

4. Может вызвать сепсис

9. Какие вакцины используются для профилактики сальмонеллеза

1. О-вакцины
2. ТАВ -вакцины
3. АКСД-вакцины
4. Тифо-паратифостолбнячные вакцины
5. БЦЖ

10. Возбудитель брюшного тифа поражает:

1. Слизистую оболочку желудка
2. Эпителий тонкого кишечника
3. Печень
4. Почки

11. Какой фактор патогенности вызывает обезвоживание организма:

1. Гиалуронидаза
2. ДНКЗ-а
3. Арахидоновая кислота
4. Гемолизин

12. Для серологического метода диагностики брюшного тифа применяют реакции:

1. РПГА
2. ИФА
3. ПЦР
4. РА на стекле

13. Диагностические препараты, используемые при серологическом методе диагностики брюшного тифа:

1. Эритроцитарный О-диагностикум
2. Адсорбированная монорецепторная сыворотка О9
3. Эритроцитарный Н-диагностикум
4. Адсорбированная монорецепторная Hd – сыворотка

14. Диареегенные кишечные палочки:

1. Продуцируют энтеротоксины
2. Лактозоположительны
3. Имеют плазмиды патогенности
4. Имеют эндотоксин

15. Питательные среды для выделения и идентификации возбудителя шигеллеза:

1. Плоскирева
2. Клиглера
3. Эндо
4. Щелочная пептонная вода

16. Методы микробиологической диагностики брюшного тифа на 3 неделе заболевания:

1. Бактериоскопический
2. Бактериологический
3. Биологический
4. Серологический

17. Серологический метод диагностики брюшного тифа позволяет:

1. Оценить динамику заболевания

2. Выявить бактерионосительство
3. Провести ретроспективную диагностику
4. Серотипировать возбудителя

СОСТАВЬТЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ПАРЫ: ВОПРОС-ОТВЕТ

18.

1. Брюшной тиф
2. Шигеллез
3. Холера
4. Кишечный иерсиниоз

А V.cholerae

Б. S.typhi

В. Y.enterocolitica

Г. S.sonnei

Д. Y.pestis

19.

1. Трансцитоз эпителия тонкой кишки с размножением в регионарной лимфоидной ткани кишечника

2. Инвазия и внутриклеточное размножение в эпителии толстой кишки

3. Прикрепление и колонизация поверхности эпителия тонкой кишки

А. Шигеллы

Б. Сальмонеллы

В. Холерный вибрион

Г. ЭПКП

20.

1. Укажите правильную последовательность действий при бактериологической диагностике холеры:

А. Определение чувствительности к антибиотикам

Б. Постановка реакции агглютинации с сыворотками О1 и 0139, пересев на скошенный агар

В. Посев исследуемого материала на щелочную пептонную воду

Г. Пересев с щелочной пептонной воды на щелочной агар

Д. Идентификация выделенной чистой культуры

21.

1. Основной путь передачи - контактно-бытовой

2. Основной путь передачи – водный

3. Вырабатывает шигаподобный токсин

4. Вырабатывает Шига -токсин

А. S.sonnei

Б. S.dysenteriae

В. Оба

Г. Ни то, ни другое

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ №3 ПО ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ

ПАТОГЕННЫЕ МИКОБАКТЕРИИ, КОРИНЕБАКТЕРИИ, КЛОСТРИДИИ

1 вариант

1. Какую форму может иметь возбудитель дифтерии?

А. Кокковидную

- Б. Полиморфных палочек
- В. Извитую (2-3 завитка)
- Г. Ветвящуюся

2. Микроскопию возбудителя дифтерии проводят:

- А. При окраске по Цилю – Нельсену
- Б. В темном поле зрения
- В. При окраске по Нейссеру
- Г. Негативным способом

3. Для окраски микобактерий используют метод:

- А. Ожешко
- Б. Циля – Нельсена
- В. Леффлера
- Г. Романовского-Гимза
- Д. Нейссера

4. Возникновение заболевания столбняком обусловлено попаданием в организм:

- А. Brucella melitensis
- Б. Экзотоксинов Clostridium difficile
- В. Clostridium tetani и ее экзотоксином
- Г. Clostridium novyi через рану

5. По типу дыхания клостридии:

- А. облигатные анаэробы
- Б. Факультативные анаэробы
- В. Облигатные аэробы
- Г. Факультативные аэробы
- Д. Микроаэрофилы.

6. К возбудителям газовой гангрены относятся:

- А. Clostridium perfringens
- Б. Clostridium tetani
- В. Clostridium botulinum
- Г. Clostridium novyi

7. Пути передачи ботулизма:

- А. Парентеральный
- Б. Раневой
- В. Контактно-бытовой
- Г. Пищевой.

8. Последовательность этапов бактериологического метода исследования при дифтерии:

- А. Определение токсичности
- Б. Посев исследуемого материала на специальные среды
- В. Изучение биохимических свойств
- Г. Пересев колонии для получения чистой культуры.

9. Токсичность дифтерийной палочки определяют с помощью реакции:

- А. Агглютинации на стекле
- Б. Гемагглютинация
- В. Кольцепреципитации
- Г. Преципитации в геле

10. Назовите основные методы микробиологической диагностики дифтерии:

- А. Микроскопический
- Б. Биологический
- В. Бактериологический
- Г. Аллергический

11. Методы микробиологической диагностики коклюша:

- А. Бактериоскопический
- Б. Бактериологический
- В. Аллергический
- Г. Серологический

12. Назовите основные методы диагностики туберкулеза:

- А. Микроскопический
- Б. Бактериологический
- В. Аллергический
- Г. Серологический

13. Какой метод используют для ускоренной бактериологической диагностики туберкулеза?

- А. Гомогенизация
- Б. Микрокультивирование
- В. Осаждение
- Г. Метод Прайса

14. Вакцина для специфической профилактики туберкулеза:

- А. Убитая
- Б. Живая
- В. Анатоксин
- Г. БЦЖ

15. Отличить возбудителя туберкулеза от возбудителя лепры при проведении микробиологической диагностики можно по:

- А. Кислотоустойчивости
- Б. Росту на искусственных питательных средах
- В. Результатам ПЦР
- Г. Результатам биопробы

16. Для профилактики лепры применяют:

- А. Сухой очищенный туберкулин
- Б. Интегральный лепромин
- В. АКДС
- Г. БЦЖ

17. Иммунитет после перенесенного ботулизма:

- А. Антитоксический
- Б. Антибактериальный
- В. Местный
- Г. Не формируется

18. Иммунологические препараты для создания активного иммунитета:

- | | | |
|----------------------------------|---------------------|--|
| 1. АКДС | | |
| 2. Секстаанатоксин | А. Столбняк | |
| 3. Тетраанатоксин | Б. Газовая гангрена | |
| 4. АДС-м | В. Оба | |
| 5. Противогангренозная сыворотка | Г. Ни то, не другое | |

19. Составьте логические пары: вопрос-ответ

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Расщепляют мочевину | А. Возбудитель дифтерии |
| 2. Не обладают цистиназой | Б. Условно-патогенные коринебактерии |
| 3. Не имеют уреазу | В. Оба |
| 4. Вырабатывают цистиназу | Г. Ни то, не другое |

20. Опишите ход исследования при дифтерии

- | | |
|-----------|--|
| 1. 1 этап | А. Пересев подозрительных колоний на свернутую сыворотку |
| 2. 2 этап | Б. Посев исследуемого материала на среду Клауберга |
| 3. 3 этап | В. Идентификация выделенной чистой культуры |

21. Составьте логические пары: вопрос-ответ

- | | |
|--------------------|---|
| 1. M. leprae | A. Располагаются внутриклеточно, образуя шары |
| 2. M. bovis | Б. Грамотрицательные кокки |
| 3. M. tuberculosis | В. Длинные тонкие палочки |
| | Г. Короткие толстые палочки |

ПАТОГЕННЫЕ МИКОБАКТЕРИИ, КОРИНЕБАКТЕРИИ, КЛОСТРИДИИ
2 вариант.

1. Какими морфологическими структурами обладает возбудитель дифтерии?

- А. Спорами
- Б. Пилями
- В. Жгутиками
- Г. Зернами волютина

2. Пути передачи возбудителя туберкулеза:

- А. Воздушно- капельный
- Б. Половой
- В. Воздушно - пылевой
- Г. Трансмиссивный

3. Назовите основные источники туберкулеза:

- А. Больные с открытой формой туберкулеза
- Б. Больные с закрытой формой туберкулеза
- В. Больные сельскохозяйственные животные
- Г. Морские свинки

4. Какой материал берут на исследование при легочных формах туберкулеза?

- А. Мокрота
- Б. Плевральная жидкость
- В. Промывные воды бронхов
- Г. Асцитическая жидкость

5. Заболевания, вызываемые микобактериями:

- А. Актиномикоз
- Б. Туберкулез
- В. Глубокие микозы
- Г. Лепра

6. Проба Манту ставится для:

- А. Отбора лиц, подлежащих ревакцинации
- Б. Лечебной цели
- В. Профилактики туберкулеза
- Г. Контроля эффективности лечения

7. Какие препараты используют для специфической профилактики туберкулеза?

- А. ЖКСВ-Е
- Б. БЦЖ-М
- В. АКДС
- Г. БЦЖ

8. При диагностике дифтерии делают посев исследуемого материала на среду:

- А. Ру
- Б. Эндо
- В. Левина
- Г. Клауберга
- Д. Плюскирева

9. Заболевание ботулизмом обусловлена попаданием в организм человека:

- А. Brucella bovis

- Б. Экзотоксинов Clostridium tetani
- В. Clostridium botulinum и их экзотоксинов
- Г. Спор Clostridium difficile

10. Факторами вирулентности возбудителя туберкулеза являются:

- А. Капсула
- Б. Корд-фактор
- В. Эндотоксин
- Г. Экзотоксин
- Д. Липиды клеточной стенки

11. Какие методы «обогащения» применяют при микроскопической диагностике туберкулеза?

- А. Гомогенизация и осаждение
- Б. Метод Прайса
- В. Метод флотации
- Г. Метод глубинного культивирования

12. Клостридии образуют:

- А. Гемозолин
- Б. Каталазу
- В. Лецитиназу

13. Клостридиальные анаэробы культивируют в среде:

- А. Вильсона-Блера
- Б. Солевые среды
- В. Желчный бульон
- Г. Высокий столбик сахарного агара

14. Факторы патогенности возбудителя коклюша:

- А. Филаментозный гемагглютинин
- Б. Коклюшный токсин
- В. Внеклеточная аденилатцилаза
- Г. Эндотоксин

15. Свойство возбудителя коклюша:

- А. Требуетелен к питательным средам
- Б. Биохимически мало активен
- В. Высокочувствителен к факторам окружающей среды
- Г. Растет на простых средах

16. На каких средах растет возбудитель коклюша?

- А. МПА
- Б. Казеиново - угольный агар
- В. Среда Клауберга
- Г. Среда Борде-Жангу

17. Какие эпидемиологические особенности характерны для лепры?

- А. Источник- больной человек
- Б. Контактный путь передачи
- В. Воздушно-капельный путь передачи
- Г. Источник - грызуны

18. Какие принципы лежат в основе клинико-иммунологической классификации лепры?

- А. Гистологические проявления
- Б. Бактериоскопические данные
- В. Результаты кожно-аллергической пробы
- Г. Бактериологические данные

19. Какие методы позволяют отличить возбудители туберкулеза от возбудителя лепры при проведении микробиологической диагностики?

- А. Окраска по Цилю-Нельсену
- Б. Рост на искусственных питательных средах
- В. Постановка кожно-аллергических проб
- Г. Определение патогенности для морских свинок и кроликов

20. Составьте логические пары: вопрос-ответ

Морфологические и тинкториальные свойства возбудителей:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. грамположительные палочки | А. возбудитель столбняка |
| 2. Терминальные споры | Б. возбудители газовой гангрены |
| 3. Некоторые имеют капсулу | В.Оба |
| 4. Располагаются цепочкой | Г. Ни то, ни другое |

21. Составьте логические пары: вопрос-ответ

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. M. leprae | А. Лепра |
| 2. M. kansasii | Б. Микобактериоз |
| 3. M. africanum | В. Туберкулез |
| 4. M. Avium | |

ПАТОГЕННЫЕ МИКОБАКТЕРИИ, КОРИНЕБАКТЕРИИ, КЛОСТРИДИИ

3 вариант

1. Как в чистой культуре расположены дифтерийные палочки?

- А. Беспорядочно
- Б. Расположение клеток в виде цепочек
- В. Расположение клеток в виде «частокола»
- Г. Расположение клеток в виде V, X

2. Пути передачи дифтерии:

- А. Воздушно-капельный
- Б. Контактный
- В.Алиментарный
- Г. Трансмиссивный

3. Какой материал для микробиологического исследования следует взять от больного при подозрении на дифтерию?

- А. Слизь из зева
- Б. Пленка из зева
- В. Слизь из носа
- Г. Кровь

4. Возбудители столбняка являются:

- А. Фузобактерии
- Б. Клостридии
- В. Бактероиды
- Г. Пептококки

5. Для клостридии характерно:

- А. Образование капсулы
- Б. Образование спор
- В. Наличие зерен волютина
- Г. Анаэробный тип дыхания

6. Питательные среды для культивирования возбудителя дифтерии:

- А. МПА
- Б. Кровяной теллуритовый агар
- В. Желточно-солевой агар
- Г. Свернутая сыворотка

7. Методы микробиологической диагностики ботулизма:

- А. Бактериоскопический

Б. Бактериологический

В. Биологический

Г. Серологический

8. Чем обусловлена кислотоустойчивость микобактерий?

А. Большим количеством пептидогликана

Б. Наличием туберкулина

В. Наличием ЛПС в наружной мемbrane

Г. Миколовыми кислотами

9. Clostridium perfringens является возбудителем:

А. Пищевой токсикоинфекции

Б. Псевдомемброзного колита

В. Газовой гангрены

Г. Токсинемической инфекции

10. Для культивирования M. leprae проводят:

А. Посев на кровяной агар

Б. Заражение броненосцев

В. Заражение кролика *in testis*

Г. Заражение платяных вшей

11. Характерное расположение возбудителя лепры в пораженных тканях:

А. В межклеточных пространствах

Б. Внутриклеточно

В. В виде длинных цепочек

Г. Образует скопления клеток в виде шаров

12. Метод ускоренной бактериологической диагностики туберкулеза:

А. Гомогенизация

Б. Микрокультивирование

В. Осаждение

Г. Метод Прайса

13. Какие культуральные свойства характерны для M.tuberculosis?

А. Сухие колонии с неровными краями

Б. R-формы

В. Нежная морщинистая пленка на поверхности жидкой питательной среды

Г. Гладкие ровные колонии белого или серого цвета

14. Какой антиген используют при постановке реакции Мицуды?

А. Автоклавированную суспензию возбудителя лепры, полученную путем гомогенизации содержимого лепром

Б. Лепромин-А

В. Интегральный лепромин

Г. Сухой очищенный туберкулин

15. Неспорообразующие анаэробы:

А. Бактероиды

Б. Клостридии

В. Фузобактерии

Г. Вейлонеллы

16. Иммунобиологические препараты для профилактики и лечения ботулизма:

А. Антитоксическая сыворотка

Б. АКДС

В. Тетраанатоксин

Г. АДС

17. Плановая специфическая профилактика дифтерии отложена до 3-4 месячного возраста ребенка в связи с:

А. Поступлением секреторных Ig A с молоком матери

- Б. Отсутствием сформировавшейся нормальной микрофлоры
- В. Выработкой высоких титров собственных антител
- Г. Наличие Ig G, поступивших от матери через плаценту

18. Составьте логические пары: вопрос-ответ

- 1. Биовар gravis А. Образует крупные гладкие красные колонии
- 2. Биовар mitis Б. Образует мелкие черные колонии
- В. Образует крупные шероховатые серые колонии

19. Составьте логические пары: вопрос-ответ

- 1. B. Pertussis А. Паракоклюш
- 2. L. Pneumophila Б. Коклюш
- 3. B. Parapertussis В. Паратиф
- Г. Легионеллез

20. Составьте логические пары: вопрос-ответ

- 1. M. Bovis А. Морские свинки
- 2. M. leprae Б. Кролики
- 3. M. tuberculosis В. Броненосцы

21. Составьте логические пары: вопрос-ответ

- 1. Выделяют очень много возбудителей
- 2. Выделяют немного возбудителей
- 3. Более опасные для окружающих
- 4. Могут быть источником инфекции при дифтерии
 - А. Больные дифтерией
 - Б. Бактерионосители возбудители дифтерии
 - В. Оба
 - Г. Ни то, ни другое

ПАТОГЕННЫЕ МИКОБАКТЕРИИ, КОРИНЕБАКТЕРИИ, КЛОСТРИДИИ

4 вариант

1. Столбняк - это инфекция:

- А. Анаэробная
- Б. Контактная
- В. Кишечная
- Г. Раневая

2. Для культивирования возбудителей туберкулеза используют питательные среды:

- А. Левенштейна-Йенсена
- Б. Левина
- В. Петраньяни
- Г. Клауберга

3. Пути передачи возбудителя проказы:

- А. Воздушно-капельный
- Б. Половой
- В. Контактный
- Г. Трансмиссивный

4. Профилактика туберкулеза проводится введением:

- А. Анатоксина
- Б. Антитоксина
- В. Туберкулина
- Г. БЦЖ

5. К возбудителям анаэробной инфекции относится:

- А. Клостридии
- Б. Микоплазмы

В. Микобактерии

Г. Хламидии

6. Клостридии - это:

А. Грам+ аэробы

Б. Грам- аэробы

В. Грам+ анаэробы

Г. Грам- анаэробы

7. Характерное расположение дифтерийных палочек в чистой культуре:

А. Гроздьями

Б. В виде цепочек

В. В виде «частокола»

Г. Под углом друг к другом

8. Противодифтерийная антитоксическая сыворотка применяется для:

А. Экстренной профилактики

Б. Плановой профилактики

В. Лечения

Г. Постановки кожно - аллергической пробы

9. Основные тесты, используемые для идентификации дифтерийной палочки:

А. Проба на цистиназу

Б. Пробы на индол

В. Проба на уреазу

Г. Проба на H₂S

10. Для диагностики газовой гангрены применяют:

А. Бактериологический метод исследования

Б. Биологический

В. Микроскопический

Г. Серологический метод

11. Установите соответствие вызываемой инфекции и вида возбудителя:

А. Столбняк

1. Clostridium botulinum

Б. Газовая гангрена

2. Clostridium tetani

В. Ботулизм

3. Fusobacterium nucleatum

Г. Фузоспирохетоз

4. Clostridium novyi

12. Свойства возбудителя коклюша:

А. Грамотрицательная палочка

Б. Образует экзотоксин

В. Биохимический малоактивен

Г. Образует споры

13. Биологические модели для культивирования возбудителя лепры:

А. Морские свинки

Б. Кролики

В. Золотистые хомячки

Г. Броненосцы

14. Методы «обогащения» исследуемого материала при микроскопической

диагностике туберкулеза:

А. Гомогенизация и осаждение

Б. Метод Прайса

В. Метод флотации

Г. ПЦР

15. Для профилактики лепры применяют:

А. Сухой очищенный туберкулин

Б. Интегральный лепромин

В. АКДС

Г. БЦЖ

16. На какие органы оказывает патологическое действие дифтерийный токсин?

- А. Сердечная мышца
- Б. Почки
- В. Надпочечники
- Г. Нервные ганглии

17. На каких средах можно культивировать возбудителя дифтерии?

- А. МПА
- Б. Кровяной теллуритовый агар
- В. Желточно-солевой агар
- Г. Свернутая сыворотка

18. Какими свойствами обладает возбудитель коклюша?

- А. Требователен к питательным средам
- Б. Биохимический мало активен
- В. Высокочувствителен к факторам окружающей среды
- Г. Растет на простых средах

19. Составьте логические пары: вопрос-ответ

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| А. Грамотрицательные | 1. Бактероиды |
| Б. Кокки | 2. Вейлонеллы |
| В. Палочки | 3. Оба |
| Г. Образуют субтерминальные споры | 4. Ни то, ни другое |

20. Составьте логические пары: вопрос-ответ

- | | |
|----------------------|----------------------|
| А. Кокки | 1. Пептострептококки |
| Б. Грамположительные | 2. Клостридии |
| В. Аэробы | 3. Оба |
| Г. Анаэробы | 4. Ни то, ни другое |

21. Иммунобиологические препараты для создания активного иммунитета:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| А. АКДС | 1. Столбняк |
| Б. Секстаанатоксин | 2. Газовая гангрена |
| В. Тетраанатоксин | 3. Оба |
| Г. АДС-М | 4. Ни то, ни другое |
| Д. Противогангренозная сыворотка | |

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ №4 ПО ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ

ВОЗБУДИТЕЛИ ЗООНОЗНЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИИ, ПАТОГЕННЫЕ СПИРОХЕТЫ, РИККЕТСИИ

1 ВАРИАНТ

1. Вакцины для профилактики зоонозных бактериальных инфекций:

- А. Убитые
- Б. Анатоксин
- В. Химические
- Г. Живые

2. Морфологические и тинкториальные свойства возбудителя чумы:

- А. Грамположительные
- Б. Палочки
- В. Диплобацилла
- Г. Биполярная окрашиваемость

3. Форма чумы, источником инфекции при которой является только человек:

- А. Бубонная

- Б. Кишечная
- Г. Кожно-бубонная
- Д. Легочная

4. Методы микробиологической диагностики чумы:

- А. Бактериологический
- Б. Бактериоскопический
- В. Биологический
- Г. Серологический

5. Методы дифференциации видов бруцелл:

- А. Потребность в СО₂
- Б. Тинкториальные свойства
- В. Бактериостатическое действие клеток
- Г. Антигенная структура

6. Заражение людей бруцеллезом происходит :

- А. При контакте с больными животными
- Б. Через молоко и молочные продукты
- В. Через послеродовые выделения
- Г. При контакте с больными людьми

7. Возбудитель сифилиса:

- А. T. pertenue
- Б. T. pallidum
- В. N. gonorrhoeae
- Г. N. meningitidis

8. Охарактеризуйте возбудителя лептоспироза:

- А. Тонкие светлые нити с загнутыми концами
- Б. Окрашиваются в фиолетовый цвет
- В. Число завитков 20-40
- Г. Образуют цисты

9. Для постановки пробы Бюрне применяют:

- А. Пестин
- Б. Антраксин
- В. Тулярин
- Г. Бруцеллин

10. Факторы вирулентности возбудителя туляремии:

- А. Пили
- Б. Экзотоксин
- В. Эндотоксин
- Г. Жгутики

11. Для постановки кожно-аллергической пробы при туляремии применяют:

- А. Пестин
- Б. Антраксин
- В. Бруцеллин
- Г. Тулярин

12. Бактерии, проявляющие вирулентности в R-форме:

- А. Иерсинии
- Б. Франциселлы
- В. Сибираязвенные бациллы
- Г. Бруцеллы

13. Реакцию термопреципитации обычно используют для поиска сибираязвенного антигена в:

- А. Моче
- Б. Испражнениях

В. Ликворе

Г. Шерсти и шкурах животных

14. Источник инфекции при сыпном тифе:

А. Больной

Б. Носитель

В. Животные

Г. Вши

15. Иммунитет при сыпном тифе:

А. Антибактериальный

Б. Антитоксический

В. Нестерильный

Г. Местный

16. Методы культивирования риккетсии:

А. На лабораторных животных

Б. В анаэробате

В. В курином эмбрионе

Г. На сывороточных средах

17. Устойчивость возбудителя сифилиса в окружающей среде:

А. Устойчив к дезинфектантам

Б. Слабоустойчив в окружающей среде

В. Устойчив к повышенной температуре

Г. Устойчив к высыханию

18. Составьте логические пары:

А. Биопроба на кроликах-сосунках

Б. Хорошо воспринимают анилиновые красители

В. Микроскопируют в темном поле зрения

1. Возбудители болезни Лайма
2. Возбудитель лептоспироза
3. Оба
4. Ни то, ни другое

19. Составьте логические пары:

Материал для исследования:

А. Кровь

1. Чума

Б. Моэрота

2. Сыпной тиф

В. Пунктат лимфоузла

3. Оба

Г. Мазок из зева

4. Ни то, ни другое

20. Составьте логические пары:

А. Грамположительные палочки

1. Возбудитель сибирской язвы

Б. Грамотрицательные палочки

2. Возбудитель столбняка

В. Образуют капсулу

3. Оба

Г. Подвижны

4. Ни то, ни другое

21. Составьте логические пары:

Основные методы микробиологической диагностики

А. Бактериоскопический

1. Туляремия

Б. Бактериологический

2. Сыпной тиф

В. Серологический

3. Оба

Г. Биологический

4. Ни то, ни другое

Д. Аллергологический

1. Вакцины, применяемые при зоонозах:

- А. Живая корпскулярная Эльберта-Гайского
- Б. ЕВ
- В. Живая корпскулярная Вершиловой (ВА-19А)
- Г. СТИ

2. Питательные среды для культивирования возбудителя чумы:

- А. Эндо
- Б. Левина
- В. Сабуро
- Г. МПА с генцианвиолетом

3. Питательные среды для культивирования возбудителя сибирской язвы:

- А. ЖСА
- Б. Кровяной агар
- В. Щелочной агар
- Г. МПА

4. Членистоногие-переносчики чумы:

- А. Клещи
- Б. Клопы
- В. Вши
- Г. Блохи

5. Препараты для профилактики и лечения чумы:

- А. Анатоксин
- Б. Антибиотики
- В. Пестин
- Г. Живая вакцина

6. Факторы патогенности бруцелл:

- А. Пили
- Б. Экзотоксин
- В. Эндотоксин
- Г. Капсула

7. Для серодиагностики бруцеллеза применяют:

- А. РПГА
- Б. Реакция Видаля
- В. Опсоно - фагоцитарную реакцию
- Г. Реакцию Вассермана

8. Иммунитет при бруцеллезе:

- А. Антитоксический
- Б. Нестерильный
- В. Пожизненный
- Г. Антибактериальный

9. Питательные среды для культивирования возбудителя туляремии:

- А. Щелочной агар
- Б. Желточный агар
- В. МПА
- Г. Глюкозоцистиновый агар с кровью

10. Аллерген для постановки кожно-аллергической пробы при туляремии:

- А. Туберкулин
- Б. Тулярин
- В. Пестин
- Г. Бифидобактерин

11. Морфологические и тинкториальные свойства сибиреязвенных бацилл:

- А. Грамположительные стрептобациллы

- Б. Образуют капсулу
- В. Образуют споры
- Г. Подвижны

12. Материал от больного для микробиологического исследования при сибирской язве:

- А. Отделяемое язвы
- Б. Мокрота
- В. Кровь
- Г. Испражнения

13. Реакцию термопреципитации по Асколи ставят для диагностики:

- А. Чумы
- Б. Туляремии
- В. Бруцеллеза
- Г. Сибирской язвы

14. Морфология возбудителя сифилиса:

- А. Тонкая бактерия спиралевидной формы
- Б. Толстая палочка
- В. Кокки бобовидной формы
- Г. Вибрион

15. Культуральные свойства возбудителя сифилиса:

- А. Можно культивировать в яичке кролика
- Б. Можно культивировать на средах, содержащих кусочки органов
- В. Культивируют в анаэробных условиях
- Г. Культивировать можно в аэробных условиях

16. Методы бактериоскопической диагностики сифилиса:

- А. Окраска серебрением
- Б. Окраска метиленовым синим
- В. Темнопольная микроскопия
- Г. Окраска по Граму

17. Источник инфекции при сыпном тифе:

- А. Больной
- Б. Носитель
- В. Животные
- Г. Вши

18. Серологические реакции, используемые при диагностике сыпного тифа:

- А. Агглютинация
- Б. РСК
- В. РПГА
- Г. Преципитация

19. Составьте логические пары:

- А. Передаются воздушно-капельным путем
- Б. Передаются половым путем
- В. Имеют липоидный антиген, идентичный липоидному экстракту бычьего сердца
- Г. При попадании в фагоциты вызывают незавершенный фагоцитоз
 - 1. T.pallidum
 - 2.N.gonorrhoeae
 - 3. Оба
 - 4. Ни то, ни другое

20. Морфологические и тинкториальные свойства возбудителей кровяных инфекций:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| А. Грамположительные палочки | 1. Йерсинии чумы |
| Б. Грамотрицательные палочки | 2. Возбудитель туляремии |
| В. Овощная форма | 3. Оба |
| Г. Образует субтерминальные споры | 4. Ни то, ни другое |

21. Членистоногие – переносчики кровяных инфекций:

- | | |
|------------|---------------------|
| А. Блохи | 1. Сыпной тиф |
| Б. Клеци | 2. Туляремия |
| В. Комары | 3. Оба |
| Г. Вши | 4. Ни то, ни другое |
| Д. Москиты | |

**ВОЗБУДИТЕЛИ ЗООНЗНЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИИ, ПАТОГЕННЫЕ
СПИРОХЕТЫ, РИККЕТСИИ**
3 ВАРИАНТ

1. Для лечения хронической формы каких зоонозных инфекций применяют убитые вакцины?

- А. Чума
- Б. Туляремия
- В. Сибирская язва
- Г. Бруцеллез

2. Бактерии вирулентные в R-форме:

- А. Бруцеллы
- Б. Сибираязвенные бациллы
- В. Франциселлы
- Г. Иерсинии

3. Наиболее часто встречающиеся возбудители бруцеллеза:

- А. B. melitensis
- Б. B. ovis
- В. B. abortus
- Г. B. neotomae

4. Факторы патогенности бруцелл:

- А. Эндотоксин
- Б. Экзотоксин
- В. Ферменты агрессии
- Г. Капсула

5. Для серодиагностики бруцеллеза применяют:

- А. Реакцию Райта
- Б. Опсонно-фагоцитарную реакцию
- В. Реакцию Хеддльсона
- Г. РПГА

6. Вакцина, применяемая для профилактики бруцеллеза:

- А. СТИ
- Б. Живая корпскулярная Эльберта-Гайского
- В. EV
- Г. Живая корпскулярная Вершиловой (ВА-19А)

7. Материал от больного для бактериологического исследования при туляремии:

- А. Кровь
- Б. Пунктат лимфоузлов
- В. Мокрота
- Г. Сыворотка крови

8. Факторы патогенности сибираязвенных бацилл:

- А. Пили
- Б. Споры
- В. Эндотоксин
- Г. Экзотоксин

9. Тест «жемчужного ожерелья» на среде с пенициллином применяют для индентификации:

- А. Иерсинии
- Б. Франциселл
- В. Бруцелл
- Г. Сибиреязвенных бацилл

10. Для кожно аллергической пробы при сибирской язве применяют:

- А. Пестин
- Б. Тулярин
- В. Бруцеллин
- Г. Антраксин

11. Оптимальная температура для культивирования возбудителя чумы:

- А. -5°
- Б. +5°
- В. +37 °
- Г. +28 °

12. Морфологические и тинкториальные свойства возбудителя чумы:

- А. Грамположительные палочки
- Б. Грамотрицательные палочки
- В. Биполярная окрашиваемость
- Г. Наличие спор

13. Культуральные свойства чумы:

- А. Факультативный анаэроб
- Б. Психрофил
- В. Образует R-формы колонии
- Г. Не требователен к питательным средам

14. Методы окраски риккетсии:

- А. По Романовскому-Гимзе
- Б. По Здрадовскому
- В. По Граму
- Г. По Ожешко

15. Заболевания, относящиеся к риккетсиозам:

- А. Лихорадка Ку
- Б. Лихорадка цуцугамуши
- В. Сыпной тиф
- Г. Лихорадка скалистых гор

16. Вакцина, используемая для профилактики сыпного тифа:

- А. Живая
- Б. Убитая
- В. Химическая
- Г. Комбинированная

17. Для сифилиса характерно:

- А. Проникновение возбудителя через кожу и слизистые
- Б. заражение трансплацентарным путем
- В. Протекает циклически
- Г. Протекает в виде сепсиса

18. Антигены, используемые для постановки РСК при диагностике сифилиса:

- А. О-антитело
- Б. Кардиолипиновый
- В. Растворимый антиген
- Г. Трепонемальный специфический

19. Составьте логические пары: вопрос-ответ

Методы культивирования возбудителей:

- А. Куриный эмбрион
- Б. Культура животных клеток
- В. Организм членистоногих
- Г. Желточные среды
- Д. Среда Эндо

- 1. Сыпного тифа
- 2. Туляремии
- 3. Оба
- 4. Ни то, ни другое

20. Составьте логические пары: вопрос-ответ

- А. Для бактериологической диагностики используют микроскопию в темном поле.
- Б. Для бактериологической диагностики проводят микроскопию мазков, окрашенных по Граму.
- В. Для диагностики ставят кожно-аллергическую пробу
- Г. Возможен контактно-бытовой путь передачи.
- Д. Антропоноз.

- 1. Сифилис
- 2. Гонорея
- 3. Оба
- 4. Ни то, ни другое

21. Составьте логические пары: вопрос-ответ

Материал для исследования:

- А. Кровь
- Б. Мокрота
- В. Пунктат лимфоузла
- Г. Моча

- 1. Чума
- 2. Сыпной тиф
- 3. Оба
- 4. Ни то, ни другое

**ВОЗБУДИТЕЛИ ЗООНОЗНЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ, ПАТОГЕННЫЕ СПИРОХЕТЫ, РИККЕТИСИИ
4 ВАРИАНТ**

1. Бактерии, имеющие овощную форму с bipolarной окраской (морфология «английских булавок»):

- А. Бруцеллы
- Б. Сибиреязвенные бациллы
- В. Францицеллы
- Г. Иерсинии

2. Факторы патогенности возбудителя чумы:

- А. Капсула
- Б. Ферменты агрессии
- В. Пили
- Г. Эндотоксин

3. Экспресс-диагностика чумы:

- А. Газожидкостная хроматография
- Б. РИФ
- В. Фаготипирование
- Г. Фагодиагностика

4. Наиболее опасная в эпидемиологическом плане форма чумы:

- А. Кожная
- Б. Бубонная
- В. Легочная
- Г. Септическая

5. Морфологические и тинкториальные свойства бруцелл:

- А. Грамотрицательные палочки
- Б. Неподвижны
- В. Спор не образуют

Г. Образуют капсулу

6. Материал от больного для исследования на бруцеллез:

А. Кровь

Б. Моча

В. Костный мозг

Г. Испражнения

7. Для серодиагностики бруцеллеза применяют:

А. Реакцию Видаля

Б. Реакцию Райта

В. Реакцию Вейля- Феликса

Г. ИФА

8. Морфологические и тинкториальные свойства возбудителя туляремии:

А. Крупные клетки с «обрубленными» концами

Б. Грамположительные палочки

В. Подвижны

Г. Спор не образуют

9. Для серодиагностики туляремии применяют:

А. РНГА

Б. РСК

В. РИФ

Г. Развернутая РА

10. Питательные среды для культивирования возбудителя туляремии:

А. Желточные среды

Б. Эндо

В. Среда с цистеином

Г. Сабуро

11. Питательные среды для культивирования сибиреязвенных бацилл:

А. ЖСА

Б. Щелочной агар

В. Желчный бульон

Г. МПА

12. Методы диагностики, позволяющие выделять чистую культуру сибиреязвенных бацилл из материала от больного:

А. Бактериологический

Б. Бактериоскопический

В. Биологический

Г. Серологический

13. Вакцина для профилактики сибирской язвы:

А. ЕВ

Б. Живая корпускулярная Эльберта- Гайского

В. Живая корпускулярная Вершиловой (ВА-19А)

Г. СТИ

14. Пути передачи сыпного тифа:

А. Воздушно-капельный

Б. Контактно-бытовой

В. Алиментарный

Г. Трансмиссивный

15. Серологические реакции, используемые при диагностике сыпного тифа:

А. Агглютинация

Б. РСК

В. РПГА

Г. Преципитация

16. Вакцина, используемая для профилактики сыпного тифа:

- А. Живая
- Б. Убитая
- В. Химическая
- Г. Комбинированная

17. Болезнь Бриля представляет собой:

- А. Реинфекцию
- Б. Суперинфекцию
- В. Эндогенный рецидив
- Г. Вторичное инфицирование

18. Особенности боррелий:

- А. Извитые бактерии с 3-8 завитками
- Б. Тонкие извитые клетки с загнутыми концами
- В. Окрашиваются по Романовскому-Гимзе в фиолетовый цвет
- Г. Слабо воспринимают анилиновые красители

19. Составьте логические пары: вопрос-ответ

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| А. Эпидемический возвратный тиф | 1. <i>B. burgdorferi</i> |
| Б. Сифилис | 2. <i>L. interrogans</i> |
| В. Болезнь Лайма | 3. <i>B. recurrentis</i> |
| Г. Лептоспироз | 4. <i>T. pallidum</i> |

20. Составьте логические пары: вопрос-ответ

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| А. Грамположительные палочки | 1. Возбудитель бруцеллеза |
| Б. Неподвижны | 2. Возбудитель сибирской язвы |
| В. Образуют капсулу | 3. Оба |
| Г. Биполярная окраска | 4. Ни то, ни другое |
| Д. Располагаются цепочкой | |

21. Составьте логические пары: вопрос-ответ

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| А. Аэробы | 1. Бруцеллы |
| Б. Культивируются в курином эмбрионе | 2. Франциселлы |
| В. Психрофилы | 3. Оба |
| Г. Факультативные анаэробы | 4. Ни то, ни другое |

**ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ №5
ПО ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ**

**ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
I ВАРИАНТ**

Выберите один или несколько верных ответов:

1. Установить серологический тип вируса гриппа можно с помощью:
 - а) реакции агглютинации на стекле;
 - б) реакции торможения гемагглютинации;
 - в) реакции непрямой гемагглютинации;
 - г) реакции гемагглютинации.

2. В патогенезе СПИДа важное место занимает:
 - а) трансформация PrP^c-белков в PrP^{sc}-белки;
 - б) безудержная пролиферация В-лимфоцитов;
 - в) накопление патологических миеломных белков;
 - г) поражение Т-хелперов и макрофагов.

3. Интерферон обеспечивает противовирусную защиту клетки, т.к. препятствует:
- а) адсорбции вируса на клетке;
 - б) проникновению вируса в клетку;
 - в) репродукции вируса;
 - г) лизису пораженной клетки;
 - д) активации киллеров.
4. В патогенезе вирусных болезней решающую роль играет:
- а) вирулентность вируса;
 - б) токсигенность вируса;
 - г) уровень лизоцима;
 - д) реакция организма на клетки, пораженные вирусом.
5. ВИЧ относится к группе вирусов:
- а) ДНК-геномных;
 - б) РНК-геномных;
 - в) сложных.
6. Для серодиагностики вирусных гепатитов применяют:
- а) реакцию торможения гемагглютинации;
 - б) иммуноферментный анализ;
 - в) реакцию непрямой (пассивной) гемагглютинации;
 - г) реакцию гемагглютинации;
 - д) реакцию агглютинации на стекле.
7. Нейротропными вирусами считаются:
- а) вирус гриппа;
 - б) вирус гепатита С;
 - в) вирус бешенства;
 - г) вирус простого герпеса;
 - д) вирус герпес-зостер.
8. Возбудителями медленных инфекций могут быть:
- а) прионы;
 - б) вирус клещевого энцефалита;
 - в) вирусы группы герпеса;
 - г) ВИЧ и др. лимфотропные вирусы;
 - д) вирусы детских инфекций;
 - е) вирус гриппа.
9. Для плановой специфической профилактики полиемилита используют:
- а) живую вакцину;
 - б) анатоксин;
 - в) убитую вакцину;
 - г) специфическую сыворотку;
 - д) интерферон.
10. Семейство ретровирусов отличается наличием
- а) РНК-полимеразы
 - б) ДНК-полимеразы
 - в) эндонуклеазы
 - г) обратной транскриптазы

д) экзонуклеазы

11. Вирус птичьего гриппа относится

- а) к вирусу гриппа типа С
- б) к вирусу гриппа типа А
- в) к вирусу гриппа типа В
- г) к вирусу гриппа типа Д

12. Вирусы полиомиелита относят к семейству

- а) калицивирусов
- б) ретровирусов
- в) поксвирусов
- г) пикорнавирусов

13. Основной путь передачи вируса гепатита А

- а) парентеральный
- б) воздушно-капельный
- в) фекально-оральный
- г) контактный

14. Какой тип нуклеиновой кислоты содержит вирус гепатита В?

- а) РНК
- б) ДНК
- в) ДНК и РНК

15. ВИЧ передается следующими способами:

- а) половым
- б) воздушно-капельным
- в) фекально-оральным
- г) парентеральным
- д) трансплацентарно

16. Укажите правильное утверждение. ВИЧ-инфекция это:

- а) сапроноз
- б) антропоноз
- в) зооноз
- г) зооантропоноз

17. Укажите правильное утверждение. СПИД - это:

- а) оппортунистическая инфекция
- б) синоним ВИЧ-инфекции
- в) стадия болезни
- г) самостоятельное заболевание

18. Укажите неправильное утверждение. При попадании крови больного ВИЧ-инфекцией на слизистую оболочку полости рта медицинского работника во время проведения реанимационных мер для полоскания рта следует использовать:

- а) 0.05% раствор перманганата калия
- б) 70% этиловый спирт
- в) 2% раствор карбоната натрия (сода углекислая)
- г) 1% раствор борной кислоты

19. Укажите неправильное утверждение. Инфицирование медицинского персонала ВИЧ возможно при:

- а) проведении парентеральных процедур
- б) оперативных вмешательствах
- в) проведении физиотерапевтических процедур
- г) удалении зубного камня
- д) подготовке полости рта к протезированию

20. Укажите соответствие между путём передачи вируса и заболеванием

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Фекально-оральный | а. гепатиты В, С, дельта и TTV |
| 2. Парентеральный | б. геморрагические лихорадки |
| 3. Трансмиссивный | в. гепатиты А, Е |
| | г. полиомиелит |
| | д. энцефалит |

СОСТАВЬТЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ПАРЫ ВОПРОС-ОТВЕТ

21. Пути передачи вирусов:

- 1. Гепатита Е
- 2. Гепатита С
 - а. фекально-оральный
 - б. парентеральный
 - в. оба
 - г. ни то, ни другое

22. Какие реакции используют при диагностике:

- 1. Полиомиелита
- 2. Гепатита В
 - а. реакцию нейтрализации цветной пробы
 - б. реакцию непрямой гемагглютинации
 - в. обе
 - г. ни то, ни другое

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ II ВАРИАНТ

Выберите один или несколько верных ответов:

1. Реакция торможения гемагглютинации может быть применена для:

- а) обнаружения вируса гриппа в исследуемом материале;
- б) идентификация вируса гриппа;
- в) определение количества вируса в исследуемом материале;
- г) обнаружения антител к вирусу в крови;
- д) определения количества вируса в аллантоисной жидкости.

2. Укажите вирус гепатита, требующий для репликации участие «вируса-помощника»:

- а) VGA;
- б) VGB;

- в) VGC;
- г) VGD;
- д) VGE.

3. Интерферон обладает следующим действием:

- а) лизирующим в отношении пораженной клетки;
- б) стимулирующим фагоцитоз;
- в) ингибирующим трансляцию;
- г) специфическим связыванием с вирусом;
- д) активирующим трансляцию.

4. Определить антитела в крови больного к определенному серотипу вируса гриппа можно с помощью:

- а) реакции агглютинации на стекле;
- б) реакции гемагглютинации;
- в) иммуноферментного анализа.

5. Вирус гриппа относится к группе вирусов:

- а) ДНК-геномных;
- б) РНК-геномных;
- в) сложных;
- г) семейства ортомиксовирусов;
- д) семейства буньиавирусов.

6. Характерными признаками семейства ретровирусов являются:

- а) Н и Н антигены капсида;
- б) фермент обратная транскриптаза;
- в) фрагментированность генома;
- г) две идентичные нити РНК в геноме;
- д) выход из клетки почкованием.

7. Энтеротропными считаются:

- а) вирус полиомиелита;
- б) вирус гепатита С;
- в) вирус бешенства;
- г) вирусы Коксаки и ЭхоДНК;
- д) вирус энцефалита.

8. Клиника СПИДа определяется рядом осложнений, вызванных оппортунистическими агентами:

- а) герпес-вирусами;
- б) возбудителем дифтерии;
- в) грибами Кандида;
- г) фузобактериями;
- д) микобактериями туберкулеза.

9. Для специфической профилактики бешенства используют:

- а) живую вакцину;
- б) анатоксин;
- в) инактивированную вакцину;
- г) гамма-глобулин;
- д) гамма-интерферон.

10. Антигенный дрейф и шифт имеют отношение к следующим антигенам вируса гриппа

- а) рибонуклеопротеиду NP
- б) матричному белку M
- в) нейраминидазе N
- г) гемагглютинину H
- д) гликопротеину gp 120

11. Какой тип нуклеиновой кислоты содержит вирус ветряной оспы?

- а) РНК
- б) ДНК
- в) ДНК и РНК
- г) не содержит нуклеиновую кислоту

12. Вирусы полиомиелита – это:

- а) ДНК-содержащие вирусы
- б) простые вирусы
- в) РНК-содержащие вирусы
- г) сложные вирусы

13. Какой тип нуклеиновой кислоты содержат вирусы гепатитов А и Е?

- а) ДНК
- б) РНК
- в) ДНК и РНК

14. К какому семейству относится возбудитель ВИЧ-инфекции?

- а) Рабдовирусов
- б) Тогавирусов
- в) Коронавирусов
- г) Ретровирусов
- д) Поксвирусов

15. Укажите неправильное утверждение. Наибольшее количество ВИЧ присутствует в следующих биологических жидкостях:

- а) крови
- б) моче
- в) грудном молоке
- г) сперме
- д) влагалищном содержимом

16. Укажите неправильное утверждение. Путь передачи ВИЧ:

- а) воздушно-капельный
- б) трансплантационный
- в) половой
- г) трансплацентарный
- д) парентеральный

17. Укажите неправильное утверждение. ВИЧ-инфицированные лица имеют право:

- а) на доступное медицинское освидетельствование
- б) на получение квалифицированной медицинской помощи всех видов
- в) быть донором
- г) добровольного обследования
- д) анонимного обследования

18. Для специфической профилактики эпидемического паротита используют

- а) АКДС
- б) БЦЖ
- в) живую вакцину, полученную Смородинцевым А.А. и сотр.
- г) ремантадин

19. Для диагностики натуральной оспы используют:

- а) обнаружение телец Гварниери в цитоплазме пораженных клеток
- б) обнаружение телец Бабеша-Негри в пораженных клетках
- в) РТГА
- г) РСК
- д) реакцию преципитации

20. Установите соответствие между путём заражения и видом вируса гепатита

1. Фекально-оральный	а. VGA
2. Парентеральный	б. VG B
3. Половой	в. VGC
	г. VGE

СОСТАВЬТЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ПАРЫ: ВОПРОС-ОТВЕТ

21. Какой тип нуклеиновой кислоты содержат вирусы?

- 1. Герпесвирусы
- 2. Вирус клещевого энцефалита
- 3. Вирус крымской геморрагической лихорадки
 - а. ДНК
 - б. РНК
 - в. ДНК и РНК
 - г. ни то, ни другое

22. Какую вакцину используют для специфической профилактики

- 1. Бешенства
- 2. Гепатита В
- 3. Полиомиелита
 - а. вакцину Смородинцева А.А. и Чумакова М.П.
 - б. антирабическую вакцину
 - в. генно-инженерную вакцину

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ III ВАРИАНТ

Выберите один или несколько верных ответов:

1. ВИЧ культивируют в:
- а) курином эмбрионе;
 - б) культуре клеток ПЭ4;
 - в) легких белых мышей;
 - г) культуре CD4 лимфоцитов;

2. Синтез интерферонов кодируется:

- а) геномом вируса;
- б) генами HLA;
- в) профагом;
- г) провирусом;
- д) плазмидами.

3. Вирус гриппа культивируют в:

- а) культуре CD4 лимфоцитов;
- б) культуре CD8 лимфоцитов;
- в) легких белых мышей;
- г) курином эмбрионе;
- д) культуре клеток ПЭ4.

4. Специфическими факторами защиты организма от вирусов являются:

- а) NK - клетки (нормальные киллеры);
- б) ингибиторы;
- в) интерфероны;
- г) slgA;
- д) CD8 - клетки (T-киллеры).

5. Неспецифическая резистентность к вирусам гриппа зависит от наличия:

- а) лизоцима;
- б) комплемента;
- в) ингибиторов;
- г) интерферонов;
- д) иммуноглобулинов.

6. К вирусам гепатита, имеющим сложное строение относят:

- а) VGA;
- б) VGB;
- в) VGC;
- г) VGD;
- д) VGE.

7. Медленные вирусные болезни характеризуются:

- а) инкубационный период продолжается месяцы и годы;
- б) рецидивирующее поражение ЦНС и иммунной системы;
- в) прогрессирующее течение с летальным исходом;
- д) острым течением с поражением жизненно важных органов.

8. Клиника СПИДа определяется рядом осложнений, вызванных оппортунистическими агентами:

- а) герпес-вирусами;
- б) возбудителем дифтерии;
- в) грибами Кандида;
- г) фузобактериями;
- д) микобактериями туберкулеза.

9. Для специфической профилактики клещевого энцефалита используют:

- а) живую вакцину;

- б) анатоксин;
- в) убитую вакцину;
- г) антигриппин;
- д) тетрациклин.

10. Вирусы гриппа относят к семейству

- а) коронавирусов
- б) аденонаековирусов
- в) парамиксовирусов
- г) ортомиксовирусов

11. Для вируса натуральной оспы характерно:

- а) РНК-содержащий вирус
- б) ДНК-содержащий вирус
- в) простой вирус
- г) сложный вирус
- д) содержит гемагглютинин
- е) не содержит гемагглютинин

12. Какой класс иммуноглобулинов сыворотки крови больного гепатитом А свидетельствует об активности (остроте) процесса?

- а) IgG
- б) Ig A
- в) Ig M
- г) Ig E

13. Сколько серотипов имеют вирусы полиомиелита?

- а) 5
- б) 7
- в) 3
- г) 2

14. Вирус иммунодефицита человека характеризуется следующими свойствами:

- а) ДНК-содержащий
- б) РНК-содержащий
- в) содержит ДНК и РНК
- г) простой вирус
- д) сложный вирус

15. Укажите правильное утверждение. ВИЧ-инфицированный человек является источником инфекции:

- а) только в периодах, выраженных клинически
- б) только в терминальной стадии
- в) только в стадии бессимптомной инфекции (II Б)
- г) только в стадии острой инфекции (II А)
- д) пожизненно

16. Укажите неправильное утверждение. Для профилактики распространения ВИЧ-инфекции разработаны государственные меры:

- а) создание центров профилактики и борьбы со СПИДом
- б) создание скрининговых лабораторий
- в) создание кабинетов психо-социального консультирования

- г) создание кабинетов добровольного (анонимного) обследования
- д) создание специализированных стационаров для постоянной изоляции больных ВИЧ-инфекцией

17. Какие реакции можно использовать для диагностики гепатита Е?

- а) ИФА
- б) РИА
- в) ПЦР
- г) РСК

18. Возбудители каких вирусных гепатитов обладают онкогенными свойствами?

- а) А
- б) В
- в) С
- д) Д
- е) Г

19. Укажите неправильное утверждение. Заражение ВИЧ-инфекцией может произойти при:

- а) сексуальном контакте
- б) переливании инфицированной крови
- в) грудном вскармливании
- г) пользовании общим туалетом
- д) приеме родов у ВИЧ-инфицированной женщины

20. Установите соответствие между основными источниками инфекции и вирусными заболеваниями:

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1. Грызуны | а. Лихорадка Денге |
| 2. Олени | б. Энцефалит |
| 3. Человек | в. Омская геморрагическая лихорадка |
| 4. Хищники, ежи | г. Бешенство |

СОСТАВЬТЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ПАРЫ ВОПРОС-ОТВЕТ:

21. У каких вирусов обнаружены следующие антигены?

- 1. HBs –антigen
- 2. Гемагглютинин
 - а. вирус кори
 - б. вирус гепатита В
 - в. вирус полиомиелита

22. Основной путь передачи вирусов:

- 1. Гепатита А
- 2. Гриппа
- 3. Полиомиелита
 - а. половой
 - б. воздушно-капельный
 - в. фекально-оральный
 - г. парентеральный

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ **IV ВАРИАНТ**

Выберите один или несколько верных ответов:

1. Специфическими факторами защиты организма от вирусов являются:
 - а) интерфероны;
 - б) sIgA;
 - в) CD8- клетки (т-киллеры);
 - г) ингибиторы

2. Интерферон обеспечивает противовирусную защиту клетки, т.к. препятствует:
 - а) репродукции вируса;
 - б) лизису пораженной клетки;
 - в) активации киллеров;
 - г) адсорбции вируса на клетке

3. Неспецифическими факторами защиты организма от гриппа являются:
 - а) система комплемента;
 - б) ингибиторы;
 - в) интерфероны;
 - г) sIgA;
 - д) NK-клетки (натуральные киллеры)

4. ВИЧ относится к группе вирусов:
 - а) ДНК-геномных;
 - б) РНК-геномных;
 - в) сложных;
 - г) семейства ортомиксовирусов;
 - д) семейства ретровирусов.

5. Передача ВИЧ-инфекции происходит следующими путями:
 - а) парентеральным;
 - б) алиментарным;
 - в) половым;
 - г) воздушно-капельным.

6. Для серодиагностики вирусных гепатитов применяют:
 - а) реакцию торможения гемагглютинации;
 - б) иммуноферментный анализ;
 - в) реакцию непрямой (пассивной) гемагглютинации;
 - г) реакцию гемагглютинации;
 - д) реакцию агглютинации на стекле.

7. Возбудителями медленных инфекций могут быть:
 - а) прионы;
 - б) вирус клещевого энцефалита;
 - в) вирус группы герпеса;
 - г) ВИЧ и другие лимфотропные вирусы;
 - д) вирусы детских инфекций;
 - е) вирус гриппа.

8. Энтеротропными считаются:

- а) вирус полиомиелита;
- б) вирус бешенства;
- в) вирус гепатита С
- г) вирусы Коксаки и Эхо

9. Для плановой специфической профилактики гриппа используют:

- а) живую вакцину;
- б) анатоксин;
- в) убитую вакцину;
- г) антигриппин;
- д) тетрациклин.

10. Вирус кори по строению

- а) простой вирус
- б) сложный вирус
- в) имеет суперкапсид
- г) не имеет суперкапсид
- д) имеет нуклеокапсид

11. Вирусы парагриппа относят:

- а) к роду Paramyxovirus
- б) к роду Lyssavirus
- в) к роду Pneumovirus
- г) к роду Morbillivirus

12. Для специфической профилактики полиомиелита используют:

- а) БЦЖ
- б) АКДС
- в) живую вакцину, полученную Смородинцевым А.А. и Чумаковым М.П.
- г) антирабическую вакцину

13. Какой путь передачи гепатитов В, С, Д, Г является основным?

- а) фекально-оральный
- б) парентеральный
- в) воздушно-капельный
- г) контактный

14. Чаще всего инфицируются и заболевают ВИЧ-инфекцией лица, принадлежащие к группам риска:

- а) гомосексуалисты
- б) наркоманы
- в) проститутки
- г) больные гемофилией

15. Укажите правильное утверждение. При обнаружении ВИЧ-инфекции у беременной женщины следует:

- а) обязательно прервать беременность
- б) назначить противоретровирусные средства
- в) рекомендовать грудное вскармливание новорожденного
- г) рекомендовать смешанное вскармливание новорожденного

16. Укажите правильное утверждение. При случайном уколе иглой пальца медицинского работника, проводившего внутривенное введение лекарственного препарата больному ВИЧ-инфекцией

необходимо:

- а) тщательно вымыть руки с мылом и заклеить ранку пластырем
- б) выдавить каплю крови из ранки и заклеить пластырем
- в) обработать, ранку 5% раствором йода
- г) выдавить каплю крови из ранки, вымыть руки с мылом, обработать место укола 70% спиртом, а затем 5% раствором йода
- д) тщательно вымыть руки водой с мылом и обработать место укола 70% спиртом, а затем 5% раствором йода

17. Какой материал, взятый у больного, исследуется при диагностике гепатитов С, Д, Г?

- а) фекалии
- б) моча
- в) кровь
- г) мокрота

18. Присутствие в сыворотке крови каких антител является показателем острого периода вирусного гепатита В?

- а) анти-HBc IgM
- б) анти-HBs IgG
- в) анти-HBe IgM
- г) анти-HBc IgG

19. Укажите правильное утверждение. Скрининговое обследование групп риска с целью первичного выявления ВИЧ-инфицированных лиц проводят постановкой следующей реакции:

- а) РТГА
- б) ИФА
- в) иммунного blottinga
- г) ПЦР
- д) РАЛ

20. Установите соответствие между типом нуклеиновой кислоты генома и видом вируса гепатита

- | | |
|--------|--------|
| 1-ДНК | а. VGA |
| 2- РНК | б. VGB |
| | в. VGC |
| | г. VGD |
| | д. VGE |

СОСТАВЬТЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ПАРЫ: ВОПРОС-ОТВЕТ

21. Какие реакции используют при диагностике

- 1. Полиомиелита
- 2. Гепатита В
 - а. реакцию нейтрализации цветной пробы
 - б. реакцию непрямой гемагглютинации
 - в. обе

г. ни то, ни другое

22. Какой тип нуклеиновой кислоты содержат вирусы?

1. Герпесвирусы
2. Вирус клещевого энцефалита
3. Вирус крымской геморрагической лихорадки
 - a. ДНК
 - б. РНК
 - в. ДНК и РНК
- г. ни то, ни другое