

Иридоциклит

Формы протекания иридоциклита

Есть несколько разновидностей переднего увеита по форме его протекания:

острый;
хронический;
серозный;
фибринозно-пластический.
Другие признаки серозного иридоциклита:

отечность;
покраснение радужной оболочки;
помутнение стекловидного тела с формированием на нем спаек.

Диагностика иридоциклита Все процедуры можно разделить на 4 группы:

офтальмологические;
рентгенологические;
лабораторно-диагностические;
осмотр пациента врачами узкой специализации.
Офтальмологическое обследование включает в себя:

визометрию;
тонометрию;
УЗИ глаза;
биомикроскопию;
офтальмоскопию;
флуоресцентную ангиографию.
Назначаются и лабораторные исследования:

общие анализы крови и мочи;
биохимический анализ крови, включая ревмопробы;
коагулограмма — оценка свертываемости крови;
аллергические пробы;
иммуноферментный анализ — лабораторный иммунологический метод.

Лечение иридоциклита.

антибиотики;
нестероидные противовоспалительные препараты;
антигистаминные таблетки и капли;
гормональные;
иммуномодуляторы и пр.
Что касается физиотерапевтического лечения, то начальной стадии переднего увеита назначаются такие процедуры:

лечение лампой соллюкс;
низкочастотная магнитотерапия;
согревающие компрессы;
терапия диадинамическими токами;
УВЧ.

Иридоциклит — это глазное заболевание, которое поражает ресничное тело сосудистой оболочки глазного яблока и радужку. Болезнь носит воспалительный характер и может спровоцировать другие опасные офтальмопатологии, приводящие к полной потере зрения.

Причины иридоциклита. Это заболевание может быть спровоцировано экзогенными и эндогенными факторами. инфекционные заболевания грибковой, бактериальной, вирусной этиологии;
хронические инфекции — гайморит, кариес, тонзиллит;
системные патологии, связанные с поражением соединительных тканей — ревматизм, ревматоидный артрит, саркоидоз;
проблемы с эндокринной системой и обменные нарушения — сахарный диабет и подагра.
стрессовые ситуации;
расстройства иммунитета;
переохлаждение;
тяжелая физическая нагрузка.

Симптомы. покраснение глазного яблока;
болевы́е ощущения, усиливающиеся при надавливании на глаз;
слезоточивость;
светобоязнь;
затуманенное зрение. Разные виды иридоциклита сопровождаются различными симптомами:

вирусное воспаление развивается стремительно и приводит к образованию серозного экссудата;
хламидийная инфекция протекает на фоне конъюнктивита и уретрита, с характерными для этих заболеваний признаками;
аутоиммунные нарушения, приводящие к переднему увеиту, возникают при обострении основной патологии;
туберкулезный иридоциклит характеризуется слабой выраженностью симптомов, среди которых — затуманивание зрения и образование бугорков на радужке желтоватого оттенка.