

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России)

Кафедра Фармации

БИДАРОВА Ф.Н.,КАРАЕВА А.М.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
ПО БИОТЕХНОЛОГИИ**

основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы специалитета по специальности 33.05.01 Фармация,
утвержденной 26.02.2021 г

Владикавказ, 2021г.

Содержание

Занятие № 1. ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Введение в биотехнологию. Основы фармацевтической биотехнологии. Биосистемы, используемые в БТ. ДНК, РНК, синтез белка. Основы получения рекомбинантных ДНК.....	4
Занятие № 2. ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Общая характеристика биотехнологического процесса.....	11
Занятие №3. ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Геномика и протеомика. Антисмыловыеオリゴнуклеотиды. Конформационные болезни.....	16
Занятие № 4. ТЕМА ЗАНЯТИЯ: GMP, GLP и GCP в биотехнологии. Экологические аспекты биотехнологии.....	18
Занятие № 5. ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Модуль № 1 по темам 1-3.....	24
Занятие № 6. ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Иммунобиотехнология. Вакцины. Сыворотки. Цитокины.....	34
Занятие № 7. ТЕМА ЗАНЯТИЯ: ЛВ и ЛС, полученные на основе рекомбинантных м/о: моноклональные антитела, тромболитики и антикоагулянты.....	38
Занятие № 8. ТЕМА ЗАНЯТИЯ: ЛВ и ЛС, полученные на основе рекомбинантных м/о: гормональные препараты. Стероидные гормоны.....	41
Занятие № 9. ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Биотехнология аминокислот, витаминов и коферментов.....	45
Занятие № 10. ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Модуль № 2 по темам 5-8.....	49
Занятие № 11. ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Антибиотики. Общая характеристика. Общая схема поучения антибиотиков.....	56
Занятие № 12. ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Частная технология антибиотиков.....	61
Занятие № 13. ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Ферменты. Иммобилизованные ферменты.....	66
Занятие № 14. ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Препараты нормофлоры. Пребиотики. Биопрепараты растительного происхождения.....	71
Занятие № 15. ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Модуль № 3 по темам: 10-14.....	77

Занятие № 1.

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «Введение в биотехнологию. Основы фармацевтической биотехнологии. Биосистемы, используемые в БТ. ДНК, РНК, синтез белка. Основы получения рекомбинантных ДНК».

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: студенты должны изучить введение в дисциплину «Биотехнология», биообъекты, используемые в биотехнологии, характеристику прокариотических и эукариотических клеток, изучить генную инженерию, этапы и особенности биотехнологического процесса, биосистемы в биотехнологии, основы получения рекомбинантных ДНК.

ЗНАЧИМОСТЬ: в биотехнологии используют последние достижения науки: молекулярную биологию, генную инженерию, физику и химию ферментов и т.д. Биотехнология, вытесняя традиционные технологии, открывает принципиально новые возможности. Большинство биотехнологических ЛС получают методами генной инженерии. Поэтому будущий специалист должен знать основы фармацевтической биотехнологии, ориентироваться в основах генной инженерии, а также знать биосистемы, используемые в генной инженерии, и биотехнологии в целом.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ (в академических часах) – 3.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: 527 аудитория, 2 корпус.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ И БЮДЖЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

1. Организационный момент 5 мин.
2. Тестовый контроль входного уровня знания 10 мин.
3. Опрос, дискуссия, разбор ситуационной задачи на занятии 47 мин.
4. Перерыв 10 мин.
5. Опрос, дискуссия, самостоятельное решение ситуационной задачи 47 мин.
6. Тестовый контроль исходного уровня знания 10 мин.
7. Подведение итогов занятия, задание к следующему занятию 6 мин.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ:

Контрольные вопросы:

1. Понятия биотехнология, биообъект, эукариоты, прокариоты, термофиллы, мезофиллы, психрофиллы, эубактерии и археобактерии.
2. История развития БТ.
3. Связь БТ с другими науками.
4. Этапы биотехнологического процесса.
5. Сравнительная характеристика и основные отличия прокариот и эукариот.
6. Характеристика *E. coli* как биообъект БТ.
7. Характеристика *Saccharomyces cerevisiae* как биообъект БТ.

8. Понятия ДНК, Транскрипция, Трансляция, Репликация, Гены, Пульс – электрофорез, ДНК-футпринтинг, Денатурация, Ренатурация, Генотип, Фенотип, Сайты, Экзоны, Интроны, Сплайсинг, Антикодон, Кодон, Оперон.
9. Синтез ДНК.
10. Универсальные аминокислоты.
11. ДНК, РНК; типы РНК.
12. Генетическая информация, методы ее получения, Геном человека.
13. Генная инженерия, задачи.
14. Клонирование, этапы.
15. Ферменты рестрикции, плазмиды, бактериофаги, бакмиды, косимиды, фазмиды.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ:

1. Что присуще м/о – E. coli

- а) грамотрицательная палочка
- б) размер менее 1 мкм
- в) непатогенная бактерия
- г) размер более 1 мкм
- д) патогенная бактерия

2. Эубактерии населяют:

- а) почву
- б) болота
- в) воду
- г) океанские глубины
- д) горячие кислые источники

3. Установите соответствие:

- | | |
|---------------|--|
| а) термофилы | |
| б) мезофилы | |
| в) психрофилы | |
| 1) 45 -90° C | |
| 2) -5 - 35° C | |
| 3) 10 -47° C | |

4. Отличительные особенности эукариотической клетки:

- а) больший размер
- б) наличие ядра
- в) ригидная клеточная стенка
- г) отсутствие субклеточных органелл
- д) хромосомная ДНК в цитоплазме

5. Типичные направления использования микроорганизмов – психрофилов:

- а) источники генов, кодирующих термолабильные вещества
- б) источники генов, кодирующих термостабильные вещества
- в) утилизация токсических отходов
- г) производство спирта этилового
- д) производство биогаза

6. Начало послепастеровского периода в развитии биотехнологии относят к:

- а) 1941 г.

- б) 1866 г.
- в) 1975 г.
- г) 1982 г.

7. Открыл микроорганизмы и ввел понятие биообъекта:

- а) Д. Уотсон
- б) Ф. Крик
- в) Ф. Сенгер
- г) Л. Пастер

8. Период антибиотиков в развитии биотехнологии относится к:

- а) 1866-1940 гг.
- б) 1941-1960 гг.
- в) 1961-1975 гг.
- г) 1975-2001 гг.

9. Структуру белка инсулина установил:

- а) Д. Уотсон
- б) Ф. Крик
- в) Ф. Сенгер
- г) Л. Пастер

10. Разработка технологии рекомбинантных ДНК относится к периоду развития биотехнологии:

- а) антибиотиков
- б) допастеровскому
- в) послепастеровскому
- г) управляемого биосинтеза

11. Получение хлебопекарных и пивных дрожжей относится к периоду развития биотехнологии:

- а) допастеровскому
- б) послепастеровскому
- в) антибиотиков
- г) управляемого биосинтеза
- д) новой и новейшей биотехнологии

12. Производство этанола относится к периоду развития биотехнологии:

- а) допастеровскому
- б) послепастеровскому
- в) антибиотиков
- г) управляемого биосинтеза
- д) новой и новейшей биотехнологии

13. Период развития производства витаминов относится к периоду развития биотехнологии:

- а) допастеровскому
- б) послепастеровскому
- в) новой и новейшей биотехнологии
- г) управляемого биосинтеза

14. Получение вирусных вакцин относится к периоду развития биотехнологии:

- а) допастеровскому

- б) послепастеровскому
- в) антибиотиков
- г) управляемого биосинтеза
- д) новой и новейшей биотехнологии

15. Первая рекомбинантная ДНК получена:

- а) в 1953 г. Дж. Уотсоном и Ф. Криком
- б) в 1972 г. П. Бергом
- в) в 1963 г. М. Ниренбергом
- г) в 1953 г. Ф. Сенгером

РАЗБОР СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ НА ЗАНЯТИИ.

Задача. Существуют вполне определенные требования и условия для создания и развития биотехнологического производства ЛС. В частности, это касается проблемы выбора биообъектов для масштабирования производства. Имеются существенные различия между диким штаммом и промышленным штаммом. Штамм обладает вполне конкретными свойствами природного характера, а производственный процесс имеет свои требования к этому штамму. Существуют способы воздействия на дикий штамм с целью удовлетворения требований производства ЛС.

Проанализируйте данную ситуацию с точки зрения:

- представления о биообъекте и его функциях;
- соответствия свойств продуцента требованиям производства ЛС и проблем безопасности при работе с продуцентами;
- применения конкретных методов преобразования биообъекта для дальнейшего использования его в создании новых продуцентов ЛС.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РАБОТА. РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ.

Задача. В современной биотехнологии при создании ЛС особое место отводится генной инженерии, суть технологии которой заключается в искусственном соединении отдельных фрагментов ДНК *in vitro* с последующим введением изолированной ДНК в живую клетку с целью получения рекомбинантных белков. Для осуществления этого необходимы определенные условия, наличие транспортного устройства для внесения ДНК в клетку продуцента, использование ферментов для включения нового гена. Генная инженерия оперирует такими понятиями, как вектор, рестриктазы, липкие концы, сайт узнавания, лигазы, ген-маркер, компетентность клетки, экзон, инtron.

С представленных общих позиций по генной инженерии сформулируйте конкретные условия:

- расшифруйте понятие «вектор» и пути его введения в клетку;
- предложите ферменты, работающие в этой ситуации;
- предложите технику генно-инженерного эксперимента (стадии);
- сравните процесс образования мРНК у эукариот и прокариот.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИСХОДЯЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ:

1. Азотистые основания соответствуют ДНК:

- а) аденин
- б) гуанин
- в) тимин
- г) цитозин
- д) урацил

2. Азотистые основания соответствуют РНК:

- а) аденин
- б) гуанин
- в) тимин
- г) цитозин
- д) урацил

3. Структурные гены, которые разделены кодирующими областями называются:

- а) интроны
- б) экзоны
- в) кодоны

4. Уникальная пространственная структура молекулы РНК определяет:

- а) процесс репликации
- б) генотип
- в) фенотип
- г) характер взаимодействия с другими молекулами и внешними условиями
- д) локализацию молекулы РНК

5. Сплайсинг:

- а) вырезание из предшественников мРНК экзонов и ковалентное соединение инtronов с образованием зрелых молекул мРНК
- б) вырезание из предшественников мРНК инtronов и ковалентное соединение экзонов с образованием зрелых молекул мРНК
- в) синтез зрелых молекул тРНК путем сшивки отдельных нуклеотидов «торец в торец»
- г) вырезание из предшественников мРНК инtronов и их ковалентное соединение с образованием зрелых молекул мРНК

6. Понятию «Биообъект в процессах биосинтеза» соответствует следующее определение:

- а) организм, на котором испытывают новые биологически активные вещества
- б) организм, вызывающий контаминацию биотехнологического оборудования
- в) фермент, используемый в аналитических целях
- г) организм, продуцирующий биологически активные соединения
- д) фермент – промышленный биокатализатор

7. Понятию «Биообъект в процессах биотрансформации» соответствует следующее определение:

- а) организм, на котором испытывают новые биологически активные вещества
- б) организм, вызывающий контаминацию биотехнологического оборудования
- в) фермент, используемый в аналитических целях
- г) организм, продуцирующий биологически активные соединения
- д) фермент – промышленный биокатализатор

8. Донор – это:

- а) биообъект, поставляющий материал для процесса производства лекарственных средств
- б) биообъект, поставляющий материал для процесса производства лекарственных средств без ущерба для своей жизнедеятельности
- в) биообъект, у которого забор материала для производства лекарственных средств оказывается несовместим с продолжением жизнедеятельности
- г) биообъект, поставляющий материал для очистки продуцентов

9. К прокариотам относятся:

- а) бактерии
- б) вирусы
- в) простейшие
- г) грибы

10. Клеточная стенка грамположительных бактерий и актиномицетов состоит из:

- а) хитина
- б) пептидогликана
- в) липополисахаридов
- г) целлюлозы
- д) белка

11. Клеточная стенка грамотрицательных бактерий состоит из:

- а) хитина
- б) пептидогликана
- в) липополисахаридов
- г) целлюлозы
- д) белка

12. Клеточная стенка плесневых грибов состоит из:

- а) пептидогликана
- б) липополисахаридов
- в) целлюлозы
- г) белка
- д) хитина

13. Эукариотами являются:

- а) грибы
- б) эубактерии
- в) актиномицеты
- г) вирусы

14. Главный критерий отбора продуцента в качестве биообъекта:

- а) быстрое накопление биомассы
- б) устойчивость к заражению посторонней микрофлорой
- в) способность синтезировать целевой продукт
- г) способности расти на дешевых питательных средах
- д) секреция целевого продукта в культуральную жидкость

15. Донатор – это биологический объект:

- а) фермент-биокатализатор процесса биотрансформации
- б) поставляющий материал для процесса производства лекарственных средств
- в) поставляющий материал для процесса производства лекарственных средств без ущерба для своей жизнедеятельности
- г) поставляющий материал для процесса производства лекарственных средств с прекращением дальнейшей жизнедеятельности

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ:

Основная:

1. Биотехнология. Ю.О. Сазыкин, С.Н. Орехов, И.И. Чакалева – М.: «Академия», 2007. – С. 85-101, 182-191, 204-218.
2. Фармацевтическая биотехнология: Учебное пособие для студентов высших уч. заведений Прищеп Т.П., Чучалин В.С., Зайков К.Л., Михалева Л.К., Белова Л.С. Ростов-на-Дону Феникс Томск Издательство НТЛ Сибирский Государственный медицинский Университет, 2006. – 251 с.
3. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям: учеб. пособие / С.Н. Орехов ; под ред. В.А. Быкова, А.В. катлинского. – м.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – С. 123-142.
4. Лекция № 1.
- 5.Фармацевтическая биотехнология: руководство к практическим занятиям: учеб. пособие /. 2-е изд., перераб. и доп. С.Н. Орехов М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. – 432 с.
Дополнительная:
6. Терминологический словарь по биотехнологии
7. Биология: учеб.пособие / Г.Г. Чебышев ; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 416 с.
- 8.Микробиология, вирусология и иммунология: рук. к лаб. занятиям: учеб. пособие / В.С. Сбойчакова; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 320 с.
9. Микробиология: учебник для студентов фармацевтических ВУЗов / А.А. Воробьев и др.; – М.: «Медицина», 2003. – 336 с.

Занятие № 2.

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «Общая характеристика биотехнологического процесса».

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: студенты должны изучить биотехнологический процесс, как основу фармацевтической биотехнологии, оборудование, используемое в биотехнологическом процессе.

ЗНАЧИМОСТЬ: будущий специалист должен знать основы биотехнологического процесса, общие принципы и основные этапы биотехнологического производства, так как большое количество ЛП на сегодняшний день получаем методами биотехнологии.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ (в академических часах) – 3.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: 527 аудитория, 2 корпус.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ И БЮДЖЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

1. Организационный момент 5 мин.
2. Тестовый контроль входного уровня знания 7 мин.
3. Опрос, дискуссия, разбор ситуационной задачи на занятии 50 мин.
4. Перерыв 10 мин.
5. Опрос, дискуссия, самостоятельное решение ситуационной задачи 50 мин.
6. Тестовый контроль исходного уровня знания 7 мин.
7. Подведение итогов занятия, задание к следующему занятию 6 мин.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ:

Контрольные вопросы:

1. Стадии биотехнологического процесса.
2. Составы питательных сред для культивирования микроорганизмов.
3. Приготовление посевного материала и культивирование микроорганизмов.
4. Оборудование, используемое в биотехнологии: биореакторы, УЗ-моечные машины; Машины используемые в производстве инъекционных ЛФ и некоторое другое оборудование.
5. Методы повышения эффективности ферментации.
6. Методы контроля биомассы и количества клеток при культивировании. Апоптоз и некроз.
7. Выделение продуктов биосинтеза и получение конечного коммерческого продукта.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ:

1. Биореакторы, через которые для перемешивания содержимого пропускают воздух называются:

- а) эрлифтные
- б) барботажные колонны
- в) реакторы с механическим перемешиванием

2. Перемешивание культуральной среды вместе с клетками восходящими потоками воздуха, равномерно циркулируя по всему объему, осуществляется в:

- а) эрлифтные
- б) барботажные колонны
- в) реакторы с механическим перемешиванием

3. Процесс ферментации контролируют по:

- а) pH
- б) температуре
- в) концентрации растворенного водорода

4. Описание морфологических, физиологических характеристик питательных сред, условий выращивания и срока хранения изложены в:

- а) ГФ 12 издания
- б) паспорте на штамм культуры
- в) справочной и научной литературе

5. Режим хранения культур – продуцентов предполагает:

- а) замораживание при температуре ниже – 20° С
- б) лиофильное высушивание
- в) консервирование

6. Участок разделения культуральной жидкости как элемент биотехнологической системы относится к ступени иерархии:

- а) первой
- б) второй
- в) третьей
- г) четвертой

7. Технологический воздух для биотехнологического производства стерилизуют:

- а) УФ-облучением
- б) нагреванием
- в) фильтрованием
- г) радиацией в малых дозах
- д) антибиотическими веществами

8. Фотоафтофотофиты – организмы, которые для роста и развития:

- а) нуждаются в факторах роста
- б) используют диоксид углерода и минеральные вещества
- в) используют органические вещества
- г) используют энергию окисления неорганических веществ

9. Донатор – это биологический объект:

- а) фермент-биокатализатор процесса биотрансформации
- б) поставляющий материал для процесса производства лекарственных средств
- в) поставляющий материал для процесса производства лекарственных средств без ущерба для своей жизнедеятельности

г) поставляющий материал для процесса производства лекарственных средств с прекращением дальнейшей жизнедеятельности

10. Хемолитотрофы – организмы, которые для роста и дыхания:

- а) нуждаются в факторах роста
- б) используют органические вещества
- в) используют энергию окисления неорганических веществ
- г) используют энергию света

РАЗБОР СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ НА ЗАНЯТИИ.

Задача.Стадия ферментации - центральная среди этапов промышленного производства. Под ферментацией понимают всю совокупность последовательных операций от внесения в заранее приготовленную и термостатированную среду инокулята до завершения процессов роста, биосинтеза или биотрансформации.

1. Какие два вида ферментации вам известны?
2. С помощью какого оборудования осуществляется ферментация? Его основные элементы, схематическое изображение.
3. Как технологическое оформление процессов промышленной биотехнологии зависит от отношения микроорганизма-продуцента к кислороду? Три группы биореакторов.
4. Способы управления процессом ферментации

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. ТЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ.

Задача. Установите правильную последовательность стадий и операций технологического процесса, представленных на схеме, заполните недостающие операции стадии «Выделение целевого продукта». Предложите методы и аппаратное оснащение операции «Дезинтеграция клеток».

1. Подготовка и стерилизация газового потока
2. Подготовка и стерилизация оборудования и коммуникаций
3. Подготовка и стерилизация субстрата
4. Разделение культуральной суспензии
5. Обработка культуральной суспензии
6. Анализ целевого продукта
7. Дезинтеграция клеток
8. Выделение индивидуального вещества
9. Культивирование биообъекта
10. Подготовка биообъекта
11. Сушка целевого продукта
12. Фасовка, упаковка, маркировка лекарственной субстанции
13. Выделение целевого продукта
14. Биологическая очистка отходов

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИСХОДЯЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ:

- 1. Колоночный биореактор для иммобилизации целых клеток должен отличаться от реактора для иммобилизации ферментов**
- а)большим диаметром колонки
 - б) отводом газов

- в) более быстрым движением растворителя
- г) формой частиц нерастворимого носителя
- д) размерами частиц нерастворимого носителя

2. Регулируемая ферментация в процессе биосинтеза достигается при способе

- а) периодическом
- б) непрерывном
- в) отъемно-доливном
- г) полуperiодическом
- д) циклическом

3. Борьба с фаговой инфекцией в цехах ферментации антибиотической промышленности наиболее рациональна путем

- а) ужесточения контроля за стерилизацией технологического воздуха
- б) ужесточения контроля за стерилизацией питательной среды
- в) получения и использования фагоустойчивых штаммов биообъекта
- г) ужесточения контроля за стерилизацией оборудования
- д) ужесточения контроля за фильтрационными установками

4. Способ сохранения нужной биотехнологии продуктивности культур микроорганизмов

- а) в холодильнике
- б) под слоем минерального масла
- в) в сыпучих материалах
- г) сублимационное высушивание
- д) криоохранение

5. Преимущество клеточной инженерии перед скрещиванием:

- а) направленные комбинации генов
- б) быстрая селекция новых вариантов
- в) преодоление видовых и родовых барьеров
- г) мутационные изменения генома

6. Основные методы совершенствования биообъекта в современной биотехнологии:

- а) индуцированный мутагенез
- б) селекция
- в) генная инженерия
- г) интродукция растений

7. Скрининг лекарственных средств:

- а) совершенствование путем химической трансформации
- б) совершенствование путем биотрансформации
- в) поиск и отбор («просеивание») природных структур
- г) полный химический синтез
- д) изменение пространственной конфигурации природных структур

8. Роль индуктора могут выполнять:

- а) субстраты
- б) конечный продукт реакции
- в) первичные метаболиты
- г) вторичные метаболиты

9. Оператор – это:

- а) начальный участок транскриптона
- б) стартовая точка транскрипции
- в) начальный участок экзона
- г) участок ДНК, связывающий белки-регуляторы транскрипции в прокариотической клетке
- д) участок ДНК, связывающий белки-регуляторы транскрипции в эукариотической клетке

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ:

Основная:

- 1.** Биотехнология. Ю.О. Сазыкин, С.Н. Орехов, И.И. Чакалева – М.: «Академия», 2007. – С. 85-101, 182-191, 204-218.
- 2.** Фармацевтическая биотехнология: Учебное пособие для студентов высших уч. заведений Прищеп Т.П., Чучалин В.С., Зайков К.Л., Михалева Л.К., Белова Л.С. Ростов-на-Дону Феникс Томск Издательство НТЛ Сибирский Государственный медицинский Университет, 2006. – 251 с.
- 3.** Фармацевтическая биотехнология: рук. к практическим занятиям: учеб. пособие / С.Н. Орехов; под ред. В.А. Быкова, А.В. катлинского. – м.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – С. 123-142.
- 4.** Лекция № 1,2
- 5.**Фармацевтическая биотехнология: руководство к практическим занятиям: учеб. пособие /. 2-е изд., перераб. и доп. С.Н. Орехов М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. – 432 с.

Дополнительная:

- 6.** Терминологический словарь по биотехнологии
- 7.** Биология: учеб.пособие / Г.Г. Чебышев ; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 416 с.
- 8.**Микробиология, вирусология и иммунология: рук. к лаб. занятиям: учеб. пособие / В.С. Сбойчакова; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 320 с.
- 9.** Микробиология: учебник для студентов фармацевтических ВУЗов / А.А. Воробьев и др.; – М.: «Медицина», 2003. – 336 с.

Занятие № 3.

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «Геномика и протеомика. Антисмыловыеолигонуклеотиды. Конформационные болезни».

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: студенты должны изучить геномику и протеомику, их взаимосвязь между собой и значение в фармацевтической биотехнологии.

ЗНАЧИМОСТЬ: будущий специалист должен знать о существовании конформационных болезнях, способах их исследования и возможных причинах возникновения; о создании антисмыловыхолигонуклеотидов и препаратов на их основе.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ (в академических часах) – 3.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: 527 аудитория, 2 корпус.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ И БЮДЖЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

1. Организационный момент 5 мин.
2. Тестовый контроль входного уровнязнания 7 мин.
3. Опрос, дискуссия, разбор ситуационной задачи на занятии50 мин.
4. Перерыв 10 мин.
5. Опрос, дискуссия, самостоятельное решение ситуационной задачи 50 мин.
6. Тестовый контроль исходного уровнязнания 7 мин.
7. Подведение итогов занятия, задание к следующему занятию 6 мин.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ:

Контрольные вопросы:

1. Генетика. История развития.
2. Геномика. Цели и задачи геномики.
3. Протеомика.
4. Связь протеомики и геномики.
5. Сравнительная геномика.
- 6.Структурная геномика.
7. Функциональная геномика.
8. Таргетный скрининг.
9. Секвенирование генома.
10. Проект «геном человека».
11. Генотерапия.
12. Антисмыловыеолигонуклеотиды.
13. Конформационные болезни.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВХОДЯЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ:

1. Установление степени близости по последовательности нуклеотидов в генах, полученных из разных источников – это:

- а) геномика сравнительная;
- б) геномика структурная;
- в) геномика функциональная.

2. Установление полной последовательности нуклеотидных пар в гене, хромосоме – это:

- а) геномика сравнительная;
- б) геномика структурная;
- в) геномика функциональная.

3. Определение функций белка, кодируемого каждым отдельным геном, и роли этого белка в метаболизме – это:

- а) геномика сравнительная;
- б) геномика структурная;
- в) геномика функциональная.

4. Секвенирование – это:

- а) определение последовательности нуклеотидных пар;
- б) определение существенности нуклеотидных пар;
- в) отбор и поиск генов.

5. Международный проект «Геном человека» был завершен в:

- а) 2003 году;
- б) 2000 году;
- в) 1993 году.

6. Международный проект «Геном человека» утвержден в:

- а) 1953 г.
- б) 1972 г.
- в) 1963 г.
- г) 1990 г.
- д) 2005 г.

7. Целью проекта «Геном человека» является:

- а) установление структуры ДНК
- б) разработка технологии рекомбинантных ДНК
- в) полное секвенирование генома человека
- г) идентификация и клонирование генов наследственных заболеваний
- д) клонирование человека

РАЗБОР СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ НА ЗАНЯТИИ.

Задача. В процессе биотехнологического процесса из ядра клетки патогенного для человека микроорганизма выделен геном, в котором был выбран определенный ген (участок нуклеиновой кислоты микроорганизма). Данный ген размножен сприменением ПЦР. В базе antimикробных агентов выбран один, взаимодействие с которым подавило активность гена наиболее эффективно. Затем выбранный из antimикробный агент был опробован в действии на целую микробную клетку исходного микроорганизма, вызвав выраженное подавление ее жизнедеятельности.

1. Определите вид скрининга антимикробной структуры для конкретного патогена.
2. Выделите основные этапы скрининга, определите их значение в ходе скрининга.
3. Для чего применяется данный вид скрининга антимикробной структуры.
4. Что послужит продолжением указанного процесса?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ.

Задача. Генная инженерия появилась благодаря работам многих исследователей в разных отраслях биохимии и молекулярной генетики. Генная инженерия совокупность методов, позволяющих в пробирке переносить генетическую информацию из одного организма в другой. Перенос генов дает возможность преодолевать межвидовые барьеры и передавать отдельные наследственные признаки одних организмов другим. ЦЕЛЬ - получение клеток, в промышленных масштабах нарабатывать некоторые белки.

- Что представляют из себя плазиды, их роль в генной инженерии.
- Для чего бактериальные клетки вырабатывают рестриктазы?
- Сущность процесса клонирования для получения рекомбинантной ДНК с применением плазмид и рестриктаз.
- Основные продуценты, используемые в построении рекомбинантных белков.
- Понятие вектора в генной инженерии

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИСХОДЯЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ:

1. В качестве основного метода геномики используют:

- а) микроскопию
- б) газожидкостную хроматографию
- в) двухмерный электрофорез
- г) секвенирование
- д) спектральный анализ

2. Протеомика характеризует состояние микробного патогена по:

- а) ферментативной активности
- б) скорости роста
- в) экспрессии отдельных белков
- г) нахождению на конкретной стадии ростового цикла
- д) метаболизму

3. В качестве основного метода протеомики используют:

- а) микроскопию
- б) газожидкостную хроматографию
- в) двухмерный электрофорез
- г) радиоизотопный анализ
- д) спектральный анализ

4. Направление геномики, непосредственно связанное с протеомикой:

- а) структурная
- б) сравнительная
- в) функциональная
- г) формальная

5. Целью структурной геномики является:

- а) установление связи между геномом и метаболизмом
- б) определение существенности отдельных генов
- в) идентификация генов по молекулярной массе, количеству в геноме, нуклеотидной последовательности
- г) определение уникальности и степени гомологии генов разных организмов

6. Целью сравнительной геномики является:

- а) установление связи между геномом и метаболизмом
- б) определение существенности отдельных генов
- в) идентификация генов по молекулярной массе, количеству в геноме, нуклеотидной последовательности
- г) определение уникальности и степени гомологии генов разных организмов

7. Антисмысловые олигонуклеотиды перспективны для лечения:

- а) инфекционных бактериальных болезней
- б) онкологические заболевания
- в) противогрибковых заболеваний
- г) наследственных моногенных заболеваний
- д) вирусных заболеваний

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ:

Основная:

- 1.** Биотехнология. Ю.О. Сазыкин, С.Н. Орехов, И.И. Чакалева – М.: «Академия», 2007. – С. 85-101, 182-191, 204-218.
- 2.** Фармацевтическая биотехнология: Учебное пособие для студентов высших уч. заведений Прищеп Т.П., Чучалин В.С., Зайков К.Л., Михалева Л.К., Белова Л.С. Ростов-на-Дону Феникс Томск Издательство НТЛ Сибирский Государственный медицинский Университет, 2006. – 251 с.
- 3.** Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям: учеб. пособие / С.Н. Орехов ; под ред. В.А. Быкова, А.В. катлинского. – м.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – С. 123-142.

4. Лекция № 2

- 5.**Фармацевтическая биотехнология: руководство к практическим занятиям: учеб. пособие /. 2-е изд., перераб. и доп. С.Н. Орехов М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. – 432 с.

Дополнительная:

- 6.** Терминологический словарь по биотехнологии
- 7.** Биология: учеб.пособие / Г.Г. Чебышев ; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 416 с.
- 8.**Микробиология, вирусология и иммунология: рук. к лаб. занятиям: учеб. пособие / В.С. Сбоячакова; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 320 с.
- 9.** Микробиология: учебник для студентов фармацевтических ВУЗов / А.А. Воробьев и др.; – М.: «Медицина», 2003. – 336 с.

Занятие № 4.

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «GMP, GLP и GCP в биотехнологии. Экологические аспекты биотехнологии».

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: студенты должны изучить экологические основы в биотехнологии, аспекты использования правил GMP в биотехнологическом производстве.

ЗНАЧИМОСТЬ: продукция биотехнологических предприятий на всех этапах – от исследования и лабораторных испытаний до производства и упаковки конечного продукта – требует строгих правил к качеству, чистоте, безопасности ЛП. Производство стерильных препаратов особенно точно регулируется ОСТом GMP «Правила производства и контроля качества ЛС». Правила GMP обязательны для всех фармацевтических предприятий. Биотехнологическое производство не лишено проблем, относящихся к ликвидации и очистке отходов. Будущий специалист должен знать правила GMP, а также владеть приемами утилизации отходов.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ (в академических часах) – 3.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: 527 аудитория, 2 корпус.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ И БЮДЖЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

1. Организационный момент 5 мин.
2. Тестовый контроль входного уровня знания 10 мин.
3. Опрос, дискуссия, разбор ситуационной задачи на занятии 47 мин.
4. Перерыв 10 мин.
5. Опрос, дискуссия, самостоятельное решение ситуационной задачи 47 мин.
6. Тестовый контроль исходного уровня знания 10 мин.
7. Подведение итогов занятия, задание к следующему занятию 6 мин.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ:

Контрольные вопросы:

1. Система GMP производства и контроля качества ЛС.
2. Общая характеристика правил GLP и GCP.
3. Экологические аспекты биотехнологии
4. Эколо-биохимические взаимодействия в организменных сообществах.
5. Биодеградация токсических соединений и утилизация биомассы.
6. Основные санитарные и экологические требования к биотехнологическому производству.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВХОДЯЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.

1. Для сбраживания субстрата при производстве этанола целесообразнее использовать:

- A) *S. cerevisiae*.
- Б) *Zymomonas mobilis*.
- В) *E. coli*.
- Г) *C. albicans*.

2. Феромоны, вызывающие немедленные поведенческие эффекты:

- А) феромоны – релизеры.
- Б) феромоны – праймеры.

3. Мицелий продуцента после его отделения от культуральной жидкости представляет собой:

- А) жидкие отходы.
- Б) твердые отходы.
- В) газообразные отходы.

4. Какие основные виды микроорганизмов присутствуют в «активном иле»:

- А) рода *Staphylococcus*
- Б) рода *Pseudomonas*
- В) рода *Streptococcus*
- Г) рода *Bacterium*

5. Препарат «Phenobac» используют:

- А) для утилизации углеводородов
- Б) для окисления полисахаридов
- В) для освобождения от синтетических детергентов.

6. Функцией феромонов является:

- а) антимикробная активность
- б) противовирусная активность
- в) изменение поведения организма со специфическим рецептором
- г) терморегулирующая активность
- д) противоопухолевая активность

7. Значение алломонов как сигнально-коммуникативных веществ для секреции организма:

- а) адаптивно выгодное
- б) органические популяции
- в) узнавание на территории
- г) половые атTRACTАНты

8. Значение крайромонов в природе:

- а) антимикробная активность
- б) регуляция численности популяции
- в) привлечение особей своего вида
- г) отпугивание особей других видов

РАЗБОР СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ НА ЗАНЯТИИ.

Задача. Правила GMP - руководящий нормативный документ международного значения, который должны обязательно принимать к сведению как отдельные фирмы, так и все производство фармацевтических препаратов в целом. Это правила организации и контроля производства, которые составляют единую систему требований к качеству выпускаемой продукции. Все производства, интегрированные в международный рынок ЛС и медицинских препаратов, выпускающие готовые лекарственные формы и любую продукцию медицинского назначения, включая субстанции, обязаны работать по этим правилам. В то же время каждая страна, производящая ЛС, имеет свою Государственную фармакопею как руководящий документ проверки качества той или иной медицинской продукции. Проведите сравнительный анализ: правил GMP и государственных фармакопеи с позиций требований для экспорта фармацевтической продукции; необходимости проведения валидации как любого фармацевтического производства, так и биотехнологической продукции в частности; правил международного значения для получения достоверных данных о проведенных испытаниях и безопасности ЛС.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ.

ЗАДАЧА. Биосинтез ЛС или БАВ в условиях производства требует создания стерильных условий при многостадийности всего процесса в целом. При этом для успешного осуществления биосинтеза необходимо не допустить контаминации целевого продукта. В условиях поставленной задачи укажите:

- в чем выражается многостадийность биосинтеза;
- способы предотвращения контаминации целевого продукта;
- схему очистки воздуха, используемую в процессе биосинтеза.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.

1. В состав активного ила входят:

- а) вирусы
- б) бактериофаги
- в) бактерии
- г) сине-зеленые водоросли

2. При очистке стоков биотехнологических производств применяют активный ил – это:

- а) природный комплекс микроорганизмов
- б) сорбент
- в) смесь сорбентов
- г) смесь микроорганизмов, полученных генно-инженерными методами

3. Биологическая очистка сточных вод основана на:

- а) способности микроорганизмов к минерализации органических веществ
- б) химическом окислении органических веществ
- в) сжигании органических веществ в токе кислорода
- г) окислении органических веществ под действием хлора

4. Аппараты, в которых осуществляется деструкция органических загрязнений сточных вод, называется:

- а) усреднители
- б) отстойники
- в) аэротенки
- г) регенераторы

5. Правила ГМР предусматривают производство в отдельных помещениях и на отдельном оборудовании:

- а) пенициллинов
- б) аминогликозидов
- в) тетрациклических
- г) макролидов
- д) полиенов

6. GLP регламентируют:

- а) лабораторные исследования
- б) планирование поисковых работ
- в) набор тестов при предклинических испытаниях
- г) методы математической обработки данных
- д) проведение валидации

7. При очистке промышленных стоков в «часы пик» применяют штаммы-деструкторы:

- а) природные микроорганизмы
- б) постоянные компоненты активного ила
- в) стабильные генно-инженерные штаммы
- г) не стабильные генно-инженерные штаммы

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ:

Основная:

1. Биотехнология. Ю.О. Сазыкин, С.Н. Орехов, И.И. Чакалева – М.: «Академия», 2007. – С. 85-101, 182-191, 204-218.

2. Фармацевтическая биотехнология: Учебное пособие для студентов высших уч. заведений Прищеп Т.П., Чучалин В.С., Зайков К.Л., Михалева Л.К., Белова Л.С. Ростов-на-Дону Феникс Томск Издательство НТЛ Сибирский Государственный медицинский Университет, 2006. – 251 с.

3. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям: учеб. пособие / С.Н. Орехов ; под ред. В.А. Быкова, А.В. катлинского. – м.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – С. 123-142.

4. Лекция № 10.

5.Фармацевтическая биотехнология: руководство к практическим занятиям: учеб. пособие /. 2-е изд., перераб. и доп. С.Н. Орехов М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. – 432 с.

Дополнительная:

6. Терминологический словарь по биотехнологии

7. Биология: учеб.пособие / Г.Г. Чебышев ; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 416 с.

8.Микробиология, вирусология и иммунология: рук. к лаб. занятиям: учеб. пособие / В.С. Сбойчакова; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 320 с.

9. Микробиология: учебник для студентов фармацевтических ВУЗов / А.А. Воробьев и др.; – М.: «Медицина», 2003. – 336 с.

Занятие № 5.

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Модуль № 1 по темам:

«Предмет, объекты и методы биотехнологии», «Биосистемы, используемые в БТ. ДНК, РНК, синтез белка. Получение рекомбинантных ДНК (генная инженерия), Общая характеристика биотехнологического процесса. GMP, GLP и GCP в биотехнологии. Экологические аспекты биотехнологии».

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: закрепление и систематизация знаний у студентов по изученным за модуль темам.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ (в академических часах) – 3.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: 527 аудитория, 2 корпус.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ И БЮДЖЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

1. Организационный момент 5 мин.
2. Выполнение тестовых и контрольных модульных заданий (письменно) 80 мин.
3. Перерыв 10 мин.
4. Опрос 35 мин.
5. Подведение итогов занятия, задание к следующему занятию 5 мин.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ:

Контрольные вопросы:

1. Понятия биотехнология, биообъект, эукариоты, прокариоты, термофиллы, мезофиллы, психрофиллы, эубактерии и археобактерии.
2. История развития БТ.
3. Связь БТ с другими науками.
4. Этапы биотехнологического процесса.
5. Сравнительная характеристика и основные отличия прокариот и эукариот.
6. Характеристика *E. coli* как биообъект БТ.
7. Характеристика *Saccharomyces cerevisiae* как биообъект БТ.
8. Понятия ДНК, Транскрипция, Трансляция, Репликация, Гены, Пульс – электрофорез, ДНК-футпринтинг, Денатурация, Ренатурация, Генотип, Фенотип, Сайты, Экзоны, Интроны, Сплайсинг, Антикодон, Кодон, Оперон.
9. Синтез ДНК.
10. Универсальные аминокислоты.
11. ДНК, РНК; типы РНК.

12. Генетическая информация, методы ее получения, Геном человека.
15. Ферменты рестрикции, плазмиды, бактериофаги, бакмиды, косимды, фазмиды.
16. Стадии биотехнологического процесса.
17. Составы питательных сред для культивирования микроорганизмов.
18. Приготовление посевного материала и культивирование микроорганизмов.
19. Оборудование, используемое в биотехнологии: биореакторы, УЗ-моечные машины; Машины используемые в производстве инъекционных ЛФ и некоторое другое оборудование.
20. Методы повышения эффективности ферментации.
21. Методы контроля биомассы и количества клеток при культивировании. Апоптоз и некроз.
22. Выделение продуктов биосинтеза и получение конечного коммерческого продукта.
23. Генетика. История развития.
24. Геномика. Цели и задачи геномики.
25. Протеомика.
26. Связь протеомики и геномики.
27. Сравнительная геномика.
- 28.Структурная геномика.
29. Функциональная геномика.
30. Таргетный скрининг.
31. Секвенирование генома.
32. Проект «геном человека».
33. Генотерапия.
34. Антисмыловые олигонуклеотиды.
35. Конформационные болезни.
36. Система GMP производства и контроля качества ЛС.Общая характеристика правил GLP и GCP.
37. Экологические аспекты биотехнологии
38. Эколо – биохимические взаимодействия в организменных сообществах.
39. Биодеградация токсических соединений и утилизация биомассы.
40. Основные санитарные и экологические требования к биотехнологическому производству.
41. От гена до прототипа лекарства. Новые подходы к разработке лекарств в постгеномную эру.
42. Поиск биомишеней для создания новых лекарственных средств на основе анализа геномных данных.
43. Основные критерии селекции мишеней для создания антимикробных средств.
44. Экспериментальные технологии валидации потенциальных мишеней.
45. Стратегия поиска соединений – лидеров.
46. Дизайн молекул. Структурные критерии.
47. Конструирование лекарств на основе известной структуры мишени (технология SBDD).

ЭТАЛОНЫ ТЕСТОВЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ МОДУЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ:

Тестовые модульные задания:

Вариант 1

1. Что присуще м/о – E. coli

- а) грамотрицательная палочка
- б) размер менее 1 мкм
- в) непатогенная бактерия
- г) размер более 1 мкм
- д) патогенная бактерия

2. Эубактерии населяют:

- а) почву
- б) болота
- в) воду
- г) океанские глубины
- д) горячие кислые источники

3. Установите соответствие:

- а) термофилы
- б) мезофилы
- в) психрофилы
- 1) 45 -90° С
- 2) -5 - 35° С
- 3) 10 -47° С

4. Отличительные особенности эукариотической клетки:

- а) больший размер
- б) наличие ядра
- в) ригидная клеточная стенка
- г) отсутствие субклеточных органелл
- д) хромосомная ДНК в цитоплазме

5. Типичные направления использования микроорганизмов – психрофилов:

- а) источники генов, кодирующих термолабильные вещества
- б) источники генов, кодирующих термостабильные вещества
- в) утилизация токсических отходов
- г) производство спирта этилового
- д) производство биогаза

6. Установление степени близости по последовательности нуклеотидов в генах, полученных из разных источников – это:

- а) геномика сравнительная;
- б) геномика структурная;
- в) геномика функциональная.

7. Установление полной последовательности нуклеотидных пар в гене, хромосоме – это:

- а) геномика сравнительная;
- б) геномика структурная;
- в) геномика функциональная.

8. Определение функций белка, кодируемого каждым отдельным геном, и роли этого белка в метаболизме – это:

- а) геномика сравнительная;

- б) геномика структурная;
- в) геномика функциональная.

9. Секвенирование – это:

- а) определение последовательности нуклеотидных пар;
- б) определение существенности нуклеотидных пар;
- в) отбор и поиск генов.

10. Международный проект «Геном человека» был завершен в:

- а) 2003 году;
- б) 2000 году;
- в) 1993 году.

11. Биореакторы, через которые для перемешивания содержимого пропускают воздух называются:

- а) эрлифтные
- б) барботажные колонны
- в) реакторы с механическим перемешиванием

12. Перемешивание культуральной среды вместе с клетками восходящими потоками воздуха, равномерно циркулируя по всему объему, осуществляется в:

- а) эрлифтные
- б) барботажные колонны
- в) реакторы с механическим перемешиванием

13. Процесс ферментации контролируют по:

- а) pH
- б) температуре
- в) концентрации растворенного водорода

14. Описание морфологических, физиологических характеристик питательных сред, условий выращивания и срока хранения изложены в:

- а) ГФ 12 издания
- б) паспорте на штамм культуры
- в) справочной и научной литературе

15. Режим хранения культур – продуцентов предполагает:

- а) замораживание при температуре ниже – 20° С
- б) лиофильное высушивание
- в) консервирование

16. Биологическая очистка сточных вод основана на:

- а) способности микроорганизмов к минерализации органических веществ
- б) химическом окислении органических веществ
- в) сжигании органических веществ в токе кислорода
- г) окислении органических веществ под действием хлора

17. Согласно ССР в обязанности этических комитетов входят:

- а) контроль за санитарным состоянием лечебно-профилактических учреждений
- б) защита прав больных, на которых испытываются новые лекарственные препараты
- в) утверждение назначаемых режимов лечения
- г) контроль за соблюдением внутреннего распорядка

18. Значение крайромонов в природе:

- а) антимикробная активность
- б) регуляция численности популяции
- в) привлечение особей своего вида

г) отпугивание особей других видов

19. Директором (главным инженером) фармацевтического предприятия должен являться согласно требованиям GMP:

- а) инженер-экономист
- б) юрист
- в) провизор
- г) врач

Вариант 2

1. Начало послепастеровского периода в развитии биотехнологии относят к:

- а) 1941 г.
- б) 1866 г.
- в) 1975 г.
- г) 1982 г.

2. Открыл микроорганизмы и ввел понятие биообъекта:

- а) Д. Уотсон
- б) Ф. Крик
- в) Ф. Сенгер
- г) Л. Пастер

3. Период антибиотиков в развитии биотехнологии относится к:

- а) 1866-1940 гг.
- б) 1941-1960 гг.
- в) 1961-1975 гг.
- г) 1975-2001 гг.

4. Структуру белка инсулина установил:

- а) Д. Уотсон
- б) Ф. Крик
- в) Ф. Сенгер
- г) Л. Пастер

5. Разработка технологии рекомбинантных ДНК относится к периоду развития биотехнологии:

- а) антибиотиков
- б) допастеровскому
- в) послепастеровскому
- г) управляемого биосинтеза

6. Международный проект «Геном человека» утвержден в:

- а) 1953 г.
- б) 1972 г.
- в) 1963 г.
- г) 1990 г.
- д) 2005 г.

7. Целью проекта «Геном человека» является:

- а) установление структуры ДНК
- б) разработка технологии рекомбинантных ДНК

- в) полное секвенирование генома человека
 - г) идентификация и клонирование генов наследственных заболеваний
 - д) клонирование человека

8. Возникновение геномики как научной дисциплины стало возможным после:

- а) установления структуры ДНК
 - б) создания концепции гена
 - в) дифференциации регуляторных и структурных участков гена
 - г) полного секвенирования генома у ряда организмов
 - д) подтверждения концепции о двойной спирали ДНК

9. В качестве основного метода геномики используют:

- а) микроскопию
 - б) газожидкостную хроматографию
 - в) двухмерный электрофорез
 - г) секвенирование
 - д) спектральный анализ

10. Протеомика характеризует состояние микробного патогена по:

- а) ферментативной активности
 - б) скорости роста
 - в) экспрессии отдельных белков
 - г) нахождению на конкретной стадии ростового цикла
 - д) метаболизму

11. Участок разделения культуральной жидкости как элемент биотехнологической системы относится к ступени иерархии:

- a) первой
 - б) второй
 - в) третьей
 - г) четвертой

12. Технологический воздух для биотехнологического производства стерилизуют:

- а) УФ-облучением
 - б) нагреванием
 - в) фильтрованием
 - г) радиацией в малых дозах
 - д) антибиотическими веществами

13. Фотоафторофы – организмы, которые для роста и развития:

- а) нуждаются в факторах роста
 - б) используют диоксид углерода и минеральные вещества
 - в) используют органические вещества
 - г) используют энергию окисления неорганических веществ

14. Донатор – это биологический объект:

- а) фермент-биокатализатор процесса биотрансформации
 - б) поставляющий материал для процесса производства лекарственных средств
 - в) поставляющий материал для процесса производства лекарственных средств без ущерба для своей жизнедеятельности
 - г) поставляющий материал для процесса производства лекарственных средств с прекращением дальнейшей жизнедеятельности

15. Хемолитотрофы – организмы, которые для роста и дыхания:

- а) нуждаются в факторах роста
- б) используют органические вещества
- в) используют энергию окисления неорганических веществ
- г) используют энергию света

16. Мицелий продуцента после его отделения от культуральной жидкости представляет собой:

- а) жидкие отходы.
- б) твердые отходы.
- в) газообразные отходы.

17. GLP регламентируют:

- а) лабораторные исследования
- б) планирование поисковых работ
- в) набор тестов при предклинических испытаниях
- г) методы математической обработки данных
- д) проведение валидации

18. Значение алломонов как сигнально-коммуникативных веществ для секреции организма:

- а) адаптивно выгодное
- б) органические популяции
- в) узнавание на территории
- г) половые атTRACTАНты

19. Правила GMP предусматривают производство в отдельных помещениях и на отдельном оборудовании:

- а) пенициллинов
- б) аминогликозидов
- в) тетрациклических
- г) макролидов
- д) полиенов

Вариант 3

1. Получение хлебопекарных и пивных дрожжей относится к периоду развития биотехнологии:

- а) допастеровскому
- б) послепастеровскому
- в) антибиотиков
- г) управляемого биосинтеза
- д) новой и новейшей биотехнологии

2. Производство этанола относится к периоду развития биотехнологии:

- а) допастеровскому
- б) послепастеровскому
- в) антибиотиков
- г) управляемого биосинтеза
- д) новой и новейшей биотехнологии

3. Период развития производства витаминов относится к периоду развития биотехнологии:

- а) допастеровскому
- б) послепастеровскому

- в) новой и новейшей биотехнологии
- г) управляемого биосинтеза

4. Получение вирусных вакцин относится к периоду развития биотехнологии:

- а) допастеровскому
- б) послепастеровскому
- в) антибиотиков
- г) управляемого биосинтеза
- д) новой и новейшей биотехнологии

5. Первая рекомбинантная ДНК получена:

- а) в 1953 г. Дж. Уотсоном и Ф. Криком
- б) в 1972 г. П. Бергом
- в) в 1963 г. М. Ниренбергом
- г) в 1953 г. Ф. Сенгером

6. В качестве основного метода протеомики используют:

- а) микроскопию
- б) газожидкостную хроматографию
- в) двухмерный электрофорез
- г) радиоизотопный анализ
- д) спектральный анализ

7. Направление геномики, непосредственно связанное с протеомикой:

- а) структурная
- б) сравнительная
- в) функциональная
- г) формальная

8. Целью структурной геномики является:

- а) установление связи между геномом и метаболизмом
- б) определение существенности отдельных генов
- в) идентификация генов по молекулярной массе, количеству в геноме, нуклеотидной последовательности
- г) определение уникальности и степени гомологии генов разных организмов

9. Целью сравнительной геномики является:

- а) установление связи между геномом и метаболизмом
- б) определение существенности отдельных генов
- в) идентификация генов по молекулярной массе, количеству в геноме, нуклеотидной последовательности
- г) определение уникальности и степени гомологии генов разных организмов

10. Антисмысловые олигонуклеотиды перспективны для лечения:

- а) инфекционных бактериальных болезней
- б) онкологические заболевания
- в) противогрибковых заболеваний
- г) наследственных моногенных заболеваний
- д) вирусных заболеваний

11. Преимущество клеточной инженерии перед скрещиванием:

- а) направленные комбинации генов
- б) быстрая селекция новых вариантов

в) преодоление видовых и родовых барьеров

г) мутационные изменения генома

12. Основные методы совершенствования биообъекта в современной биотехнологии:

а) индуцированный мутагенез

б) селекция

в) генная инженерия

г) интрандукция растений

13. Скрининг лекарственных средств:

а) совершенствование путем химической трансформации

б) совершенствование путем биотрансформации

в) поиск и отбор («просеивание») природных структур

г) полный химический синтез

д) изменение пространственной конфигурации природных структур

14. Роль индуктора могут выполнять:

а) субстраты

б) конечный продукт реакции

в) первичные метаболиты

г) вторичные метаболиты

15. Оператор – это:

а) начальный участок транскриптона

б) стартовая точка транскрипции

в) начальный участок экзона

г) участок ДНК, связывающий белки-регуляторы транскрипции в прокариотической клетке

д) участок ДНК, связывающий белки-регуляторы транскрипции в эукариотической клетке

16. Какие основные виды микроорганизмов присутствуют в «активном иле»:

а) рода Staphylococcus

б) рода Pseudomonas

в) рода Streptococcus

г) рода Bacterium

17. Правила GMP предусматривают производство в отдельных помещениях и на отдельном оборудовании:

а) пенициллинов

б) аминогликозидов

в) тетрацикличес

г) макролидов

д) полиенов

18. Биологическая очистка сточных вод основана на:

а) способности микроорганизмов к минерализации органических веществ

б) химическом окислении органических веществ

в) сжигании органических веществ в токе кислорода

г) окислении органических веществ под действием хлора

19. GLP регламентируют:

а) лабораторные исследования

б) планирование поисковых работ

в) набор тестов при предклинических испытаниях

г) методы математической обработки данных

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:

Основная:

- 1.** Биотехнология. Ю.О. Сазыкин, С.Н. Орехов, И.И. Чакалева – М.: «Академия», 2007. – С. 85-101, 182-191, 204-218.
 - 2.** Фармацевтическая биотехнология: Учебное пособие для студентов высших уч. заведений Прищеп Т.П., Чучалин В.С., Зайков К.Л., Михалева Л.К., Белова Л.С. Ростов-на-Дону Феникс Томск Издательство НТЛ Сибирский Государственный медицинский Университет, 2006. – 251 с.
 - 3.** Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям: учеб. пособие / С.Н. Орехов ; под ред. В.А. Быкова, А.В. катлинского. – м.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – С. 123-142.
 - 4.** Лекция № 1,2.
 - 5.**Фармацевтическая биотехнология: руководство к практическим занятиям: учеб. пособие /. 2-е изд., перераб. и доп. С.Н. Орехов М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. – 432 с.
- Дополнительная:
- 6.** Терминологический словарь по биотехнологии
 - 7.** Биология: учеб.пособие / Г.Г. Чебышев ; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 416 с.
 - 8.**Микробиология, вирусология и иммунология: рук. к лаб. занятиям: учеб. пособие / В.С. Сбоячакова; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 320 с.
 - 9.** Микробиология: учебник для студентов фармацевтических ВУЗов / А.А. Воробьев и др.; – М.: «Медицина», 2003. – 336 с.

Занятие № 6.

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «Иммунобиотехнология. Вакцины. Сыворотки. Цитокины».

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: студенты должны изучить основы получения вакцин, цитокинов, интерферонов и др. ЛП, используемых для лечения инфекционных препаратов и иммунодефицитных состояний.

ЗНАЧИМОСТЬ: проблемы лечения и профилактики инфекционных заболеваний в настоящее время не утратили своей актуальности. Вакцины, цитокины, интерфероны и др. ЛС занимают лидирующее место в лечении и профилактике инфекционных заболеваний. В связи с чем, будущий специалист должен знать биотехнологию данных ЛС.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ (в академических часах) – 3.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: 527 аудитория, 2 корпус.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ И БЮДЖЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

1. Организационный момент 5 мин.
2. Тестовый контроль входного уровня знания 7 мин.
3. Опрос, дискуссия, разбор ситуационной задачи на занятии 50 мин.
4. Перерыв 10 мин.
5. Опрос, дискуссия, самостоятельное решение ситуационной задачи 50 мин.
6. Тестовый контроль исходного уровня знания 7 мин.
7. Подведение итогов занятия, задание к следующему занятию 6 мин.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ:

Контрольные вопросы:

1. Вирусы, их строение. Репликация вирусов.
2. Подходы к разработке вакцин с помощью технологии рекомбинантных ДНК.
3. ДНК – вакцины. Принципы их действия.
4. Противогерпетические и противосальмонеллезные вакцины.
5. Цитокины. Интерфероны. Типы ИФН человека. Классификация, характеристика каждой группы. Методы получения различных интерферонов, краткая характеристика каждого метода.
6. Получение кДНК из ИФН.

7. Интерлейкины.
8. Препараты ИФН человека.
9. Каковы особенности получения сывороток?

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВХОДЯЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ:

1. Применение человеческих противовирусных вакцин ограничено:

- а) невозможностью культивирования всех патогенных микроорганизмов
- б) потенциальной опасностью в работе с патогенными микроорганизмами и вирусами
- в) возможностью аттенуированных штаммов к исходному вирулентному штамму
- г) высокой стоимостью производства традиционных вакцин

2. Субъединичные вакцины - это:

- а) вакцины против одного возбудителя
- б) генетически модифицированный патогенный микроорганизм
- в) непатогенные микроорганизмы с клонированным геном, кодирующим антигенные детерминанты патогенного организма

3. Недостатки субъединичных вакцин:

- а) низкая эффективность
- б) высокая стоимость
- в) риск изменения конформации белка (антигенных свойств)
- г) способность проявлять вирулентность

4. Пероральные вакцины, созданные методом двойной делеции, это:

- а) мертвые вакцины, прошедшие двойную стерилизацию
- б) живые вакцины на основе патогенных бактерий с удаленными из генома областями, отвечающими за независимые жизненно важные функции
- в) живые вакцины на основе патогенных бактерий с удаленными из генома областями, отвечающими за вирулентность

5. Большие количества ИФН получают из:

- а) шестидневных однослоистых культур клеток куриного эмбриона
- б) культивируемых лейкоцитов крови человека, зараженных определенным видом вируса
- в) генно-инженерным путем

6. Период получения вирусных вакцин относится к периоду развития биотехнологии:

- а) дрпастеровскому
- б) послепастеровскому
- в) управляемого биосинтеза
- г) антибиотиков
- д) новой и новейшей биотехнологии

7. По происхождению иммуностимуляторы подразделяют на:

- а) экзогенные
- б) химические
- в) биосинтетические
- г) экстракционные

8. Эндогенные иммуностимуляторы синтезируются:

- а) клетками микроорганизмов

- б) с помощью химических реакций
- в) клетками макроорганизма
- г) половыми клетками

РАЗБОР СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ НА ЗАНЯТИИ.

Задача. Иммунобиотехнология вносит весомый вклад в создание ЛС, профилактических и диагностических препаратов. Однако не у всех людей и не всегда иммунная система обеспечивает защиту организма от различных микробных и вирусных инфекций. Она может быть неадекватна внешним условиям, и иногда требуется помочь в усилении иммунного ответа. При анализе данной ситуации:

- сопоставьте виды и цели иммунизации с классификацией вакцин по способам их получения и применению;
- свяжите атакующие агенты (ксенобиотики) с ответной реакцией организма, используя понятия «антigen», «антитело», «антигенные детерминанты» («эпитопы»), «гаптены»;
- прокомментируйте проявление иммунного ответа и способы его усиления.

САОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ.

Задача. Проанализируйте описание технологического процесса по следующей схеме:

название иммунотропного лекарственного средства;

класс и группа препаратов, к которым относится данное средство;

достоинства и недостатки данного иммунотропного средства;

основные этапы получения;

показатели качества;

условия хранения и транспортирования;

влияние на иммунитет и применение.

«из плазмы или сыворотки крови доноров-добровольцев, иммунизированных вакциной против клещевого энцефалита, выделяют фракцию Ig с использованием этанолом при температуре ниже 00С глобулиновой части белков крови. Далее проводят лиофилизацию, изготовление 10% раствора, стерилизующую фильтрацию и ампулирование по 1 мл (1 доза)».

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИСХОДЯЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ:

1.ELISA – твердофазный иммуноферментный анализ является:

- а) иммунометрическим
- б) конкурентным
- в) быстрым
- г) гетерогенным

2. Варианты постановки ИФА:

- а) иммунометрический
- б) конкурентный
- в) люминисцентный

- г) радиоиммунный
- д) флюоресцентный

3. Вакцины формируют иммунитет:

- а) пассивный
- б) активный
- в) быстрый
- г) медленный

4. Преимущества ИФА перед методом РИА:

- а) меньшая стоимость анализа
- б) легкость освоения персоналом
- в) отсутствие радиоактивных изотопов
- г) возможность визуальной оценки результата

5. «Сэндвич» - анализ применим к:

- а) поликлональными иммуноглобулинами
- б) ионоклональным антителам
- в) поли- и моноклональным антителам
- г) аминокислотам

6. В качестве маркеров тесте ИФА установления факта беременности используют:

- а) йод-125
- б) тритий
- в) пероксидазу
- г) галактозидазу

7. Гомогенный ИФА основан на:

- а) разделении компонентов после проведения реакции
- б) изменении активности фермента в процессе реакции
- в) адсорбции фермента на носителе
- г) подавлении фермента

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ:

Основная:

1. Биотехнология. Ю.О. Сазыкин, С.Н. Орехов, И.И. Чакалева – М.: «Академия», 2007. – С. 85-101, 182-191, 204-218.
2. Фармацевтическая биотехнология: Учебное пособие для студентов высших уч. заведений Прищеп Т.П., Чучалин В.С., Зайков К.Л., Михалева Л.К., Белова Л.С. Ростов-на-Дону Феникс Томск Издательство НТЛ Сибирский Государственный медицинский Университет, 2006. – 251 с.

3. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практическим занятиям: учеб. пособие / С.Н. Орехов ; под ред. В.А. Быкова, А.В. катлинского. – м.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – С. 123-142.

4. Лекция № 3.

- 5.Фармацевтическая биотехнология: руководство к практическим занятиям: учеб. пособие /. 2-е изд., перераб. и доп. С.Н. Орехов М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. – 432 с.

Дополнительная:

6. Терминологический словарь по биотехнологии

7. Биология: учеб.пособие / Г.Г. Чебышев ; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 416 с.
- 8.Микробиология, вирусология и иммунология: рук. к лаб. занятиям: учеб. пособие / В.С. Сбоячакова; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 320 с.
9. Микробиология: учебник для студентов фармацевтических ВУЗов / А.А. Воробьев и др.; – М.: «Медицина», 2003. – 336 с.

Занятие № 7.

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «ЛВ и ЛС, полученные на основе рекомбинантных м/о: моноклональные антитела, тромболитики и антикоагулянты».

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: студенты должны изучить биотехнологические методы получения моноклональных антител, тромболитиков и антикоагулянтов.

ЗНАЧИМОСТЬ:на сегодняшний день с помощью рекомбинантных ДНК клонировано более 1000 генов различных белков человека, которые являются или могут быть использованы для получения ЛС. Будущий специалист должен знать получение рекомбинантных ЛС.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ (в академических часах) – 3.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: 527 аудитория, 2 корпус.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ И БЮДЖЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

1. Организационный момент 7 мин.
2. Тестовый контроль входного уровня знания 5 мин.
3. Опрос, дискуссия, разбор ситуационной задачи на занятии 50 мин.
4. Перерыв 10 мин.
5. Опрос, дискуссия, самостоятельное решение ситуационной задачи 50 мин.
6. Тестовый контроль исходного уровня знания 5 мин.
7. Подведение итогов занятия, задание к следующему занятию 7 мин.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ:

Контрольные вопросы:

1. Моноклональные антитела (МкАТ). Определение. Характеристика.Этапы производства МкАТ.
2. Антикоагулянты? Какую классификацию их вы знаете?
3. Тромболитики? Какую классификацию их вы знаете?
4. Что такое липосомы?

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ:

1. Тромболитик прямого действия, являющийся активатором Pg, и относящийся к тромболитикам 1 поколения, м.м. = 40000-50000:

А стрептокиназа

Б урокиназа

В стрептодеказа

2. Фрагмент антитела, состоящий из двух доменов Н-цепи, соединенных между собой дисульфидной связью, обозначается:

А Fc

Б Fab

В Fv

3. К АПг относятся:

А кабиказа

Б актилизе

В стрептаза

Г гепарин

4. Механизм получения пролекарства на основе моноклональных антител заключается в:

а) использовании лекарства в неактивной форме

б) использовании лекарства в активной форме

в) связывании лекарства с ферментом

г) заключении антитела в липосомы

д) связывании фермента с моноклональным антителом

5. Активация лекарственного средства у клетки – мишени происходит за счет:

а) введения активаторов связывания

б) локального повышения температуры вблизи клетки - мишени

в) связывания фермента с моноклональным антителом

РАЗБОР СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ НА ЗАНЯТИИ

ЗАДАЧА. Многие исследователи пытались отыскать способы получения антител сузкой специфичностью.

- Иммунизация *in vitro* при производстве моноклональных антител, преимущества.
- Клонирование гибридомных клеток, известные вам методы клонирования.
- Принцип работы теста для ранней диагностики беременности с помощью моноклональных антител.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ.

ЗАДАЧА. Многие исследователи пытались отыскать способы получения антител сузкой специфичностью.

- Какие этапы включает процедура получения моноклональных антител?
- Назначение процесса иммунизации животных при получении моноклональных антител.
- Какие клетки используют для гибридизации *in vivo* при производстве моноклональных антител?

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИСХОДЯЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

1. Моноклональные антитела получают в производстве:

а) фракционированием антител организма

б) фракционированием лимфоцитов

в) по гибридомной технологии

г) очисткой антител методом аффинной хроматографии

д) химико-ферментативным синтезом

2.Существенность гена у патогенного организма - кодируемый геном - продукт, необходим для

а)размножения клетки

б) поддержания жизнедеятельности

в)инвазии в ткани

г)инактивации антимикробного вещества

д)идентификации гена

3.Мишенью для физических и химических мутагенов в клетке

биообъектов являются

а) ДНК

б)ДНК-полимераза

в)РНК-полимераза

г)рибосома

д)информационная РНК

4.Мониторинг (применительно к лекарству) - это

а)введение в организм

б)выделение

в)выявление в тканях

г) слежение за концентрацией

д)дозирование

5.Способ сохранения нужной биотехнологии продуктивности культур микроорганизмов

а)в холодильнике

б)под слоем минерального масла

в)в сыпучих материалах

г) сублимационное высушивание

д)криохранение

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ:

Основная:

1. Биотехнология. Ю.О. Сазыкин, С.Н. Орехов, И.И. Чакалева – М.: «Академия», 2007. – С. 85-101, 182-191, 204-218.

2. Фармацевтическая биотехнология: Учебное пособие для студентов высших уч. заведений Прищеп Т.П., Чучалин В.С., Зайков К.Л., Михалева Л.К., Белова Л.С. Ростов-на-Дону Феникс Томск Издательство НТЛ Сибирский Государственный медицинский Университет, 2006. – 251 с.

3. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практическим занятиям: учеб. пособие / С.Н. Орехов ; под ред. В.А. Быкова, А.В. катлинского. – м.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – С. 123-142.

4. Лекция № 3.

- 5.**Фармацевтическая биотехнология: руководство к практическим занятиям: учеб. пособие /. 2-е изд., перераб. и доп. С.Н. Орехов М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. – 432 с.
- Дополнительная:
- 6.** Терминологический словарь по биотехнологии
- 7.** Биология: учеб.пособие / Г.Г. Чебышев ; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 416 с.
- 8.**Микробиология, вирусология и иммунология: рук. к лаб. занятиям: учеб. пособие / В.С. Сбоячакова; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 320 с.
- 9.** Микробиология: учебник для студентов фармацевтических ВУЗов / А.А. Воробьев и др.; – М.: «Медицина», 2003. – 336 с.

Занятие № 8.

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «ЛВ и ЛС, полученные на основе рекомбинантных м/о: гормоны. Стероидные гормоны».

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: студенты должны изучить биотехнологию гормональных препаратов.

ЗНАЧИМОСТЬ:данный раздел фармацевтической биотехнологии является очень обширным и достаточно важным достижением науки. Получение гормонов биотехнологическим методами позволяет получить химически чистые ЛС, лишенные множества побочных (токсических) реакций. Будущий специалист должен знать биотехнологию гормонов.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ (в академических часах) – 3.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: 527 аудитория, 2 корпус.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ И БЮДЖЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

1. Организационный момент 5 мин.
2. Тестовый контроль входного уровня знания 7 мин.
3. Опрос, дискуссия, разбор ситуационной задачи на занятии 50 мин.
4. Перерыв 10 мин.
5. Опрос, дискуссия, самостоятельное решение ситуационной задачи 50 мин.
6. Тестовый контроль исходного уровня знания 7 мин.
7. Подведение итогов занятия, задание к следующему занятию 6 мин.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ:

Контрольные вопросы:

1. Инсулин. История открытия и развития технологии. Методы получения различных инсулинов, механизм действия.
2. СТГ.
3. Эритропоэтин.
4. Пептидные факторы роста тканей.
5. Стероидные гормоны: общие сведения.
6. Биотрансформация.

7. Биоконверсия стероидов.
8. Микробиологический синтез преднизолона.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДНИЯ ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ:

1. Гормон гликопротеиновой природы, стимулирующий пролиферацию и дифференцировку чувствительных клеток в морфологически распознаваемые эритробласти – это:

- а) эритропоэтин
- б) соматотропный гормон
- в) инсулин

2. Соматотропный гормон состоит из:

- а) 191 аминокислоты
- б) 189 аминокислоты
- в) 101 аминокислоты

3. Производство инсулина, идентичного человеческому, осуществляется:

- а) высокоэффективной очисткой инсулина животного происхождения
- б) превращением свиного инсулина замещением аланина на треонин
- в) химическим синтезом
- г) генно-инженерным методом

4. Отличия препарата генно – инженерного соматотропина от гормона, выделяемого из гипофиза, заключаются в:

- а) разной степени чистоты
- б) разном аминокислотном составе
- в) отсутствии нейротоксических вирусов

5. Промышленным источником препаратов эритропоэтина являются:

- а) моча больных анемией
- б) донорская кровь животных, больных анемией
- в) культура клеток млекопитающих

6. Инсулин состоит из:

- а) 3-х пептидных цепей
- б) 2-х пептидных цепей
- в) 2-х дисульфидных мостиков
- г) 3-х дисульфидных мостиков

7. Длительность действия препаратов инсулина зависит от:

- а) количества ионов инсулина
- б) размеров кристаллов инсулина
- в) наличия аморфного инсулина
- г) количества консерванта нипагина и фенола

8. Инсулин образует стойкие комплексы с ионами:

- а) магния
- б) цинка
- в) кальция
- г) натрия

РАЗБОР СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ НА ЗАНЯТИИ.

ЗАДАЧА. При получении генно-инженерного инсулина, основанного на раздельном биосинтезе 2 цепей, в качестве продуцента используют определенные микроорганизмы и

модифицированный чужеродный ген (точнее, оперон) с лидерной последовательностью аминокислот (метионином и β -галактозидазой), отделяемой на последней стадии контакта секретируемого белка и клетки. Ферментацию проводят на среде с лактозой (или галактозой) для последующего объединения свободных инсулиновых цепей. Далее осуществляют выделение и очистку полученного инсулина.

На основе общей схемы получения инсулина и требований к его качеству проанализируйте и обоснуйте:

- условия выбора конкретного продуцента инсулина и конструкцию вектора, с помощью которого можно ввести в клетку чужеродный ген (ген инсулина);
- необходимость использования лидерной последовательности аминокислот с метионином и β -галактозидазой в синтезе инсулина и роль лактозы (галактозы) в процессе ферментации и получении завершенных инсулиновых цепей, и их объединении;
- возможность проявления токсичности генно-инженерного инсулина; с чем это может быть связано, учитывая видоспецифичность данного инсулина, его серийное качество и уровень культуры производства на предприятии? Прокомментируйте правила безопасности работы с микроорганизмами на генетическом и физическом уровнях.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ.

ЗАДАЧА. В качестве продуцента рекомбинантного человеческого инсулина используют также пекарские дрожжи *Saccharomyces cerevisiae*, так как они обладают рядом преимуществ перед другими изученными и культивируемыми в промышленном масштабе микроорганизмами.

- Тип нуклеиновой кислоты, применяемой для переноса в геном (построения вектора), в производстве рекомбинантного инсулина, источник ее получения.
- Селекцию трансформированных сахаромицетов при производстве рекомбинантного инсулина проводят на питательной среде, не содержащей аминокислоты лейцин. Почему?
- Метод культивирования продуцента *Saccharomyces cerevisiae* при производстве рекомбинантного инсулина.

Культуральную суспензию *Saccharomyces cerevisiae* разделяют центрифугированием, целевой продукт выделяют из культуральной жидкости и очищают методами ионообменной и гель-хроматографии. Далее его подвергают биоконверсии по реакции транспептидации, используя трипсин и бета-карбоксипептидазу. С какой целью производится реакция транспептидации?

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ИСХОДЯЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ:

1. Проинсулин – это белок, который состоит из:

- а) 2-х молекул инсулина
- б) 84-х аминокислотных остатков
- в) инсулина и инсулиноподобных белков
- г) 4-х молекул инсулина

2. Преимуществом генно-инженерного инсулина является:

- а) высокая активность
- б) меньшая аллергенность
- в) меньшая токсичность

г) большая стабильность

3. Молекула инсулина свиней отличается от молекулы человеческого инсулина следующими параметрами:

- а) тремя аминокислотами
- б) одной аминокислотой
- в) наличием дисульфидных мостиков
- г) количеством полипептидных цепей

4. Метод получения гена инсулина:

- а) химико-ферментативный
- б) ферментативный на основе мРНК
- в) выделение из генома рестриктазой
- г) химический

5. Активность субстанции инсулина определяют:

- а) на людях-добровольцах
- б) на кроликах
- в) на мышах
- г) на кошках

6. Инсулин стандартизуют по:

- а) молекулярной массе
- б) гипогликемическому эффекту
- в) повышению артериального давления
- г) гипергликемическому эффекту

7. Монокомпонентный инсулин получают методом:

- а) гель-хроматографии
- б) ионообменной хроматографии
- в) гидрофобной хроматографии
- г) аффинной хроматографии

8. Ослабление ограничений на использование в промышленности микроорганизмов-

рекомбинантов, производящих гормоны человека, стало возможным благодаря

- а) совершенствованию методов изоляции генно-инженерных рекомбинантов от окружающей среды
- б) повышению квалификации персонала, работающего с рекомбинантами
- в) установленной экспериментально слабой жизнеспособности рекомбинанта
- г) экспериментальному подтверждению обязательной потери чужеродных генов
- д) правилам GMP

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ:

Основная:

1. Биотехнология. Ю.О. Сазыкин, С.Н. Орехов, И.И. Чакалева – М.: «Академия», 2007. – С. 85-101, 182-191, 204-218.
2. Фармацевтическая биотехнология: Учебное пособие для студентов высших уч. заведений Прищеп Т.П., Чучалин В.С., Зайков К.Л., Михалева Л.К., Белова Л.С. Ростов-на-Дону Феникс Томск Издательство НТЛ Сибирский Государственный медицинский Университет, 2006. – 251 с.
3. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям: учеб. пособие / С.Н. Орехов ; под ред. В.А. Быкова, А.В. Катлинского. – м.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – С. 123-142.

4. Лекция № 3.

5.Фармацевтическая биотехнология: руководство к практическим занятиям: учеб. пособие / . 2-е изд., перераб. и доп. С.Н. Орехов М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. – 432 с.

Дополнительная:

6. Терминологический словарь по биотехнологии

7. Биология: учеб.пособие / Г.Г. Чебышев ; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 416 с.

8.Микробиология, вирусология и иммунология: рук. к лаб. занятиям: учеб. пособие / В.С. Сбоячакова; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 320 с.

9. Микробиология: учебник для студентов фармацевтических ВУЗов / А.А. Воробьев и др.; – М.: «Медицина», 2003. – 336 с.

Занятие № 9.

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «Биотехнология аминокислот, витаминов и коферментов».

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: студенты должны изучить биотехнологические методы получения аминокислот и витаминов.

ЗАЧИМОСТЬ:Получение аминокислот, витаминов и коферментов биотехнологическим методами позволяет получить высокоэффективные химически чистые ЛС. Будущий специалист должен знать биотехнологические способы получения данных лекарственных средств.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ (в академических часах) – 3.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: 527 аудитория, 2 корпус.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ И БЮДЖЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

1. Организационный момент 7 мин.
2. Тестовый контроль входного уровня знания 10 мин.
3. Опрос, дискуссия, разбор ситуационной задачи на занятии 50 мин.
4. Перерыв 10 мин.
5. Опрос, дискуссия, самостоятельное решение ситуационной задачи 50 мин.
6. Подведение итогов занятия, задание к следующему занятию 7 мин.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ:

Контрольные вопросы.

I. Вопросы для проверки уровня знаний:

1. Что такое аминокислоты? Какова их структура?
2. Методы получения аминокислот L-аскорбиновая кислота.
3. Механизмы регуляции биосинтеза аминокислот
4. Витамины. Традиционные методы получения.Перспективы развития биотехнологии в получении витаминных препаратов.
5. Микробиологический синтез витаминов.
6. Витамин B₁₂, Витамин PP, витамин B₂, пантотеновая кислота.
7. Витамин D, эргостерин, витамин A

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ:

1. Для промышленного получения аскорбиновой кислоты применяют метод Рейхштейна. Согласно данному методу, процесс состоит из 6 стадий, одна из которых является биотехнологической:

- а) получение D-сорбита из D-глюкозы методом каталитического восстановления водородом
- б) получением L-сорбозы из –сорбита методом глубинного аэробного окисления
- в) получение диацетон-L-сорбозы из L-сорбозы путем ее ацетонирования
- г) получение гидрата диацетон-2-кето-L-гулоновой кислоты путем окисления диацетон-L-сорбозы

2. Биотехнологический процесс получения аскорбиновой кислоты может включать:

- а) культивирование трансформированных клеток *Erwiniaherbicola*
- б) микробиологическое расщепление целлюлозы
- в) совместное культивирование микроорганизмов *Corinebacterium* и *Erwiniaherbiicola*
- г) последовательное культивирование микроорганизмов *Corinebacterium* и *Erwiniaherbiicola*

3. Аминокислоты в свете биотехнологического процесса являются:

- а) первичными метаболитами
- б) вторичными метаболитами
- в) витаминами
- г) внеклеточными целевыми продуктами

4. Периоду развития биотехнологии по производству витаминов соответствует период развития:

- а) допастеровский
- б) послепастеровский
- в) антибиотиков
- г) новой и новейшей биотехнологии
- д) управляемого биосинтеза

5. В биотехнологическом производстве никотиновой кислоты (витамина PP) в качестве продуцента НАД используют:

- а) *E. coli*
- б) бета-аланин и калия пантонат
- в) пекарские дрожжи
- г) крахмал

6. Дрожжи-сахаромицеты культивируют в аэробных условиях при избытке углеводов в питательной среде, сниженном количестве азота и оптимальном содержании кислорода для получения:

- а) сразу кристаллического витамина D₂
- б) рабофлавина
- в) аскорбиновой кислоты
- г) провитамина D₂

7. Кишечная палочка *E. Coli* является продуцентом для:

- а) витаминов B₁₂ и аскорбиновой кислоты
- б) витамина B₁₂ и убихинонов
- в) витамина B₁₂ и пантотеновой кислоты
- г) витамина B₁₂ и витамина D

8. Перспективно использование в качестве продуцента грибов рода *Candida* растущих на углеводных средах, *Candidamaltose*, при культивации которых получения липидная фракция называется «микробный жир» для получения:

- а) витаминов В₁₂ и аскорбиновой кислоты
- б) витамина В₁₂ и убихинонов
- в) эргостерина и пантотеновой кислоты
- г) убихинонов и витамина D₂

9. Витамин РР, его продуцент НАД в биотехнологическом производстве:

- а) пекарские дрожжи
- б) *E. coli*
- в) бета-аланин и калия пантонат
- г) крахмал

РАЗБОР СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ НА ЗАНЯТИИ.

Задача. В процессе промышленного производства аскорбиновой кислоты используют многостадийный химический синтез, в который наряду с тонкими химическими реакциями встроена и технологически необходимая биосинтетическая реакция, что является одним из примеров успешного сочетания органического синтеза с биосинтезом. При проведении технологического этапа биосинтеза на производстве применяют определенные микроорганизмы, осуществляющие биосинтетические реакции. Не менее важными являются оптимизация условий ферментации и контроль за количеством биомассы микроорганизмов в ферментационном аппарате.

Проанализируйте ситуацию с точки зрения:

- химической реакции биотрансформации, определяющей проведение биосинтеза и получение ожидаемого результата при осуществлении биотрансформации;
- выбора микроорганизмов для биоконверсии и оптимального подбора компонентов питательной среды (источников углерода, азота и фосфора);
- возможности увеличения выхода целевого продукта.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ.

Задача 1. Витамины как группа незаменимых органических соединений различной химической природы необходимы любому организму в небольших концентрациях с целью выполнения в нем катализических и регуляторных функций. С помощью биотехнологии сегодня можно получать в необходимых количествах такие витамины, как В₂, В₁₂, р-каротин, витамин РР, эргостерин, аскорбиновую кислоту.

Проведите сравнительный анализ получения вышеуказанных витаминов с помощью биотехнологии, принимая во внимание:

- биообъекты, которые используют в каждом конкретном случае;
- получение суперпродуцентов рибофлавина и витамина В₂,
- преимущества биотехнологического производства витаминов.

Задача 2. Аминокислоты известны как составные элементы белков. Биологически активными являются только L-стереоизомеры аминокислот. Чистые L-аминокислоты находят свое применение в медицине в качестве или самостоятельных лечебных препаратов (L-метионин), или в составе смесей для парентерального питания, и в фармацевтической промышленности при синтезе различных ЛС. Используют их и как

добавки при коррекции питания. Аминокислоты получают различными способами: биологическим, химическим, химико-энзи-матическим, микробиологическим. В настоящее время аминокислоты как ЛС завоевали себе определенный и довольно значительный сегмент от общего объема фармацевтической продукции.

С учетом представленной информации проведите сравнительный анализ:

- предложенных методов получения аминокислот на конкретных производствах;
- выбора микроорганизмов-биообъектов для создания штаммов-суперпродуцентов;
- особенностей подбора питательных сред с учетом ферментативной регуляции биосинтеза на клеточном уровне.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ:

Основная:

- 1.** Биотехнология. Ю.О. Сазыкин, С.Н. Орехов, И.И. Чакалева – М.: «Академия», 2007. – С. 85-101, 182-191, 204-218.
- 2.** Фармацевтическая биотехнология: Учебное пособие для студентов высших уч. заведений Прищеп Т.П., Чучалин В.С., Зайков К.Л., Михалева Л.К., Белова Л.С. Ростов-на-Дону Феникс Томск Издательство НТЛ Сибирский Государственный медицинский Университет, 2006. – 251 с.
- 3.** Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям: учеб. пособие / С.Н. Орехов ; под ред. В.А. Быкова, А.В. Катлинского. – м.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – С. 123-142.
- 4.** Лекция № 4.

- 5.**Фармацевтическая биотехнология: руководство к практическим занятиям: учеб. пособие /. 2-е изд., перераб. и доп. С.Н. Орехов М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. – 432 с.

Дополнительная:

- 6.** Терминологический словарь по биотехнологии
- 7.** Биология: учеб.пособие / Г.Г. Чебышев ; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 416 с.
- 8.**Микробиология, вирусология и иммунология: рук. к лаб. занятиям: учеб. пособие / В.С. Сбоячакова; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 320 с.
- 9.** Микробиология: учебник для студентов фармацевтических ВУЗов / А.А. Воробьев и др.; – М.: «Медицина», 2003. – 336 с.

Занятие № 10.

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Модуль № 2 по темам:

«ЛВ и ЛС, полученные на основе рекомбинантных м/о: моноклональные антитела, тромболитики и антикоагулянты, аминокислоты», «ЛВ и ЛС, полученные на основе рекомбинантных м/о: гормоны», «Вакцины. Цитокины. Иммунобиотехнология».

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: закрепление и систематизация знаний у студентов по изученным за модуль темам.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ (в академических часах) – 3.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: 527 аудитория, 2 корпус.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ И БЮДЖЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

1. Организационный момент 5 мин.
2. Выполнение тестовых и контрольных модульных заданий (письменно) 80 мин.
3. Перерыв 10 мин.
4. Опрос 35 мин.
5. Подведение итогов занятия, задание к следующему занятию 5 мин.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ:

Контрольные вопросы:

1. Моноклональные антитела.
2. Тромболитики и антикоагулянты.
3. Аминокислоты.
4. L-аскорбиновая кислота.
5. Витамины. Традиционные методы получения.
6. Микробиологический синтез витаминов.
7. Витамин B12, Витамин PP, витамин B2, пантотеновая кислота.
8. Витамин D, эргостерин, витамин A.
9. Инсулин. История открытия и развития технологии. Методы получения различных инсулинов, механизм действия.
10. СТГ.

11. Эритропоэтин.
12. Пептидные факторы роста тканей.
13. Стероидные гормоны: общие сведения.
14. Биотрансформация.
15. Биоконверсия стероидов.
16. Микробиологический синтез преднизолона.
17. Вирусы, их строение. Репликация вирусов.
18. Подходы к разработке вакцин с помощью технологии рекомбинантных ДНК.
19. ДНК – вакцины. Принципы их действия.
20. Противогерпетические и противосальмонеллезные вакцины.
21. Цитокины. Интерфероны. Типы ИФН человека.
22. Получение кДНК из ИФН.
23. Интерлейкины.
24. Препараты ИФН человека.

ЭТАЛОНЫ ТЕСТОВЫХ МОДУЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ:

Вариант 1

1. Гормон гликопротеиновой природы, стимулирующий пролиферацию и дифференцировку чувствительных клеток в морфологически распознаваемые эритробlastы – это:

- а) эритропоэтин
- б) соматотропный гормон
- в) инсулин

2. Соматотропный гормон состоит из:

- а) 191 аминокислоты
- б) 189 аминокислоты
- в) 101 аминокислоты

3. Производство инсулина, идентичного человеческому, осуществляется:

- а) высокоэффективной очисткой инсулина животного происхождения
- б) превращением свиного инсулина замещением аланина на треонин
- в) химическим синтезом
- г) генно-инженерным методом

4. Отличия препарата генно – инженерного соматотропина от гормона, выделяемого из гипофиза, заключаются в:

- а) разной степени чистоты
- б) разном аминокислотном составе
- в) отсутствии нейротоксических вирусов

5. Промышленным источником препаратов эритропоэтина являются:

- а) моча больных анемией
- б) донорская кровь животных, больных анемией
- в) культура клеток млекопитающих

6. Применение человеческих противовирусных вакцин ограничено:

- а) невозможностью культивирования всех патогенных микроорганизмов
- б) потенциальной опасностью в работе с патогенными микроорганизмами и вирусами
- в) возможностью аттенуированных штаммов к исходному вирулентному штамму
- г) высокой стоимостью производства традиционных вакцин

7. Субъеденичные вакцины - это:

- а) вакцины против одного возбудителя
- б) генетически модифицированный патогенный микроорганизм
- в) непатогенные микроорганизмы с клонированным геном, кодирующим антигенные детерминанты патогенного организма

8. Недостатки субъеденичных вакцин:

- а) низкая эффективность
- б) высокая стоимость
- в) риск изменения конформации белка (антигенных свойств)
- г) способность проявлять вирулентность

9. Пероральные вакцины, созданные методом двойной делеции, это:

- а) мертвые вакцины, прошедшие двойную стерилизацию
- б) живые вакцины на основе патогенных бактерий с удаленными из генома областями, отвечающими за независимые жизненно важные функции
- в) живые вакцины на основе патогенных бактерий с удаленными из генома областями, отвечающими за вирулентность

10. Большие количества ИФН получают из:

- а) шестидневных однослоистых культур клеток куриного эмбриона
- б) культивируемых лейкоцитов крови человека, зараженных определенным видом вируса
- в) генно-инженерным путем

11. Тромболитик прямого действия, являющийся активатором Pg, и относящийся к тромболитикам 1 поколения, м.м. = 40000-50000:

- А стрептокиназа
- Б урокиназа
- В стрептодеказа

12. Фрагмент антитела, состоящий из двух доменов Н-цепи, соединенных между собой дисульфидной связью, обозначается:

- А Fc
- Б Fab
- В Fv

13. К АПг относятся:

- А кабиказа
- Б актилизе
- В стрептаза
- Г гепарин

14. Механизм получения пролекарства на основе моноклональных антител заключается в:

- а) использовании лекарства в неактивной форме
- б) использовании лекарства в активной форме
- в) связывании лекарства в ферментом
- г) заключении антитела в липосомы
- д) связывании фермента с моноклональным антителом

15. Активация лекарственного средства у клетки – мишени происходит за счет:

- а) введения активаторов связывания
- б) локального повышения температуры вблизи клетки - мишени

в) связывания фермента с моноклональным антителом

Вариант 2

1. Инсулин состоит из:

- а) 3-х пептидных цепей
- б) 2-х пептидных цепей
- в) 2-х дисульфидных мостиков
- г) 3-х дисульфидных мостиков

2. Длительность действия препаратов инсулина зависит от:

- а) количества ионов инсулина
- б) размеров кристаллов инсулина
- в) наличия аморфного инсулина
- г) количества консерванта нипагина и фенола

3. Инсулин образует стойкие комплексы с ионами:

- а) магния
- б) цинка
- в) кальция
- г) натрия

4. Проинсулин – это белок, который состоит из:

- а) 2-х молекул инсулина
- б) 84-х аминокислотных остатков
- в) инсулина и инсулиноподобных белков
- г) 4-х молекул инсулина

5. Преимуществом генно-инженерного инсулина является:

- а) высокая активность
- б) меньшая аллергенность
- в) меньшая токсичность
- г) большая стабильность

6. Период получения вирусных вакцин относится к периоду развития биотехнологии:

- а) дрпастеровскому
- б) послепастеровскому
- в) управляемого биосинтеза
- г) антибиотиков
- д) новой и новейшей биотехнологии

7. По происхождению иммуностимуляторы подразделяют на:

- а) экзогенные
- б) химические
- в) биосинтетические
- г) экстракционные

8. Эндогенные иммуностимуляторы синтезируются:

- а) клетками микроорганизмов
- б) с помощью химических реакций
- в) клетками макроорганизма
- г) половыми клетками

9.ELISA – твердофазный иммуноферментный анализ является :

- а) иммуноиммunoиммunoимmетрическим
- б) конкурентным
- в) быстрым
- г) гетерогенным

10. Варианты постановки ИФА:

- а) иммуноиммunoимmетрический
 - б), конкурентный
 - в) люминисцентный
 - г) радиоиммунный
 - д) флюоресцентный
- фермента

11. Моноклональные антитела получают в производстве:

- а) фракционированием антител организма
- б) фракционированием лимфоцитов
- в) по гибридомной технологии
- г) очисткой антител методом аффинной хроматографии
- д) химико-ферментативным синтезом

12. Для промышленного получения аскорбиновой кислоты применяют метод Рейхштейна. Согласно данному методу, процесс состоит из 6 стадий, одна из которых является биотехнологической:

- а) получение D-сорбита из D-глюкозы методом каталитического восстановления водородом
- б) получением L-сорбозы из –сорбита методом глубинного аэробного окисления
- в) получение диацетон-L-сорбозы из L-сорбозы путем ее ацетонирования
- г) получение гидрата диацетон-2-кето-L-гулоновой кислоты путем окисления диацетон-L-сорбозы

13. Биотехнологический процесс получения аскорбиновой кислоты может включать:

- а) культивирование трансформированных клеток *Erwiniaherbicola*
- б) микробиологическое расщепление целлюлозы
- в) совместное культивирование микроорганизмов *Corinebacterium* и *Erwiniaherbiicola*
- г) последовательное культивирование микроорганизмов *Corinebacterium* и *Erwiniaherbiicola*

14. Аминокислоты в свете биотехнологического процесса являются:

- а) первичными метаболитами
- б) вторичными метаболитами
- в) витаминами
- г) внеклеточными целевыми продуктами

15. Периоду развития биотехнологии по производству витаминов соответствует период развития:

- а) допастеровский
- б) послепастеровский
- в) антибиотиков
- г) новой и новейшей биотехнологии
- д) управляемого биосинтеза

Вариант 3

1. Молекула инсулина свиней отличается от молекулы человеческого инсулина следующими параметрами:

- а) тремя аминокислотами
- б) одной аминокислотой
- в) наличием дисульфидных мостиков
- г) количеством полипептидных цепей

2. Метод получения гена инсулина:

- а) химико-ферментативный
- б) ферментативный на основе мРНК
- в) выделение из генома рестриктазой
- г) химический

3. Активность субстанции инсулина определяют:

- а) на людях-добровольцах
- б) на кроликах
- в) на мышах
- г) на кошках

4. Инсулин стандартизуют по:

- а) молекулярной массе
- б) гипогликемическому эффекту
- в) повышению артериального давления
- г) гипергликемическому эффекту

5. Монокомпонентный инсулин получают методом:

- а) гель-хроматографии
- б) ионообменной хроматографии
- в) гидрофобной хроматографии
- г) аффинной хроматографии

6. Вакцины формируют иммунитет:

- а) пассивный
- б) активный
- в) быстрый
- г) медленный

7. Преимущества ИФА перед методом РИА:

- а) меньшая стоимость анализа
- б) легкость освоения персоналом
- в) отсутствие радиоактивных изотопов
- г) возможность визуальной оценки результата

8. «Сэндвич» - анализ применим к:

- а) поликлональными иммуноглобулинами
- б) ионоклональным антителам
- в) поли- и моноклональным антителам
- г) аминокислотам

9. В качестве маркеров тесте ИФА установления факта беременности используют:

- а) йод-125
- б) тритий
- в) пероксидазу

г) галактозидазу

10. Гомогенный ИФА основан на:

- а) разделении компонентов после проведения реакции
- б) изменении активности фермента в процессе реакции
- в) адсорбции фермента на носителе
- г) подавлении фермента

11. В биотехнологическом производстве никотиновой кислоты (витамина РР) в качестве продуцента НАД используют:

- а) E. coli
- б) бета-аланин и калия пантонат
- в) пекарские дрожжи
- г) крахмал

12. Дрожжи-сахаромицеты культивируют в аэробных условиях при избытке углеводов в питательной среде, сниженном количестве азота и оптимальном содержании кислорода для получения:

- а) сразу кристаллического витамина D₂
- б) рабофлавина
- в) аскорбиновой кислоты
- г) провитамина D₂

13. Кишечная палочка E. Coli является продуцентом для:

- а) витаминов B₁₂ и аскорбиновой кислоты
- б) витамина B₁₂ и убихинонов
- в) витамина B₁₂ и пантотеновой кислоты
- г) витамина B₁₂ и витамина D

14. Перспективно использование в качестве продуцента грибов рода Candida растущих на углеводных средах, Candidamaltose, при культивации которых получения липидная фракция называется «микробный жир» для получения:

- а) витаминов B₁₂ и аскорбиновой кислоты
- б) витамина B₁₂ и убихинонов
- в) эргостерина и пантотеновой кислоты
- г) убихинонов и витамина D₂

15. Витамин РР, его продуцент НАД в биотехнологической производстве:

- а) пекарские дрожжи
- б) E. coli
- в) бета-аланин и калия пантонат
- г) крахмал

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ:

Основная:

1. Биотехнология. Ю.О. Сазыкин, С.Н. Орехов, И.И. Чакалева – М.: «Академия», 2007. – С. 85-101, 182-191, 204-218.
2. Фармацевтическая биотехнология: Учебное пособие для студентов высших уч. заведений Прищеп Т.П., Чучалин В.С., Зайков К.Л., Михалева Л.К., Белова Л.С. Ростов-на-Дону Феникс Томск Издательство НТЛ Сибирский Государственный медицинский Университет, 2006. – 251 с.

3. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям: учеб. пособие / С.Н. Орехов ; под ред. В.А. Быкова, А.В. катлинского. – м.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – С. 123-142.

4. Лекция № 3,4.

5.Фармацевтическая биотехнология: руководство к практическим занятиям: учеб. пособие /. 2-е изд., перераб. и доп. С.Н. Орехов М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. – 432 с.

Дополнительная:

6. Терминологический словарь по биотехнологии

7. Биология: учеб.пособие / Г.Г. Чебышев ; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 416 с.

8.Микробиология, вирусология и иммунология: рук. к лаб. занятиям: учеб. пособие / В.С. Сбоячакова; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 320 с.

9. Микробиология: учебник для студентов фармацевтических ВУЗов / А.А. Воробьев и др.; – М.: «Медицина», 2003. – 336 с.

Занятие № 11.

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «**Антибиотики. Общая характеристика. Общая схема поучения антибиотиков».**

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: студенты должны изучить основы биотехнологии антибиотиков, общую технологическую схему, механизмы действия антибиотиков.

ЗНАЧИМОСТЬ: антибиотики – это особая группа ЛС, обладающих высокой физиологической активностью в отношении определенных групп микроорганизмов и злокачественных опухолей. Одним из основных способов получения антибиотиков является биотехнологический метод, состоящий из большого числа технологических стадий. Знания, связанные с особенностями технологии антибиотиков необходимы будущему специалисту для осуществления практической деятельности.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ (в академических часах) – 3.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: 527 аудитория, 2 корпус.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ И БЮДЖЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

1. Организационный момент 5 мин.
2. Тестовый контроль входного уровня знания 7 мин.
3. Опрос, дискуссия, разбор ситуационной задачи на занятии 50 мин.
4. Перерыв 10 мин.
5. Опрос, дискуссия, самостоятельное решение ситуационной задачи 50 мин.
6. Тестовый контроль исходного уровня знания 7 мин.
7. Подведение итогов занятия, задание к следующему занятию 6 мин.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ:

Контрольные вопросы:

1. Общие понятия об антибиотиках (а/б). А/б как вторичные метаболиты.
2. Типы связей между микробиологическими сообществами.
3. Основные этапы развития производства а/б.
4. Причины быстрого роста числа а/б.

5. В чем заключается специфичность а/б.
6. Классификации а/б. Механизмы биосинтеза а/б.
7. Биотехнология а/б. Схема производства а/б по Н.Е. Егорову. Фазы процесса ферментации а/б.
8. Методы выделения и очистки а/б.
9. Механизмы действия а/б.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ:

1. Антибиотики являются:

- A) первичными метаболитами
- B) вторичными метаболитами

2. Процессы не характерные для тропофазы стадии биосинтеза а/б:

- A) интенсивное накопление биомассы продуцента
- B) интенсивное накопление а/б
- B) интенсивное поглощение кислорода

3. Процессы характерные для идиофазы стадии биосинтеза а/б:

- A) интенсивное накопление биомассы продуцента
- B) интенсивное накопление а/б
- B) интенсивное поглощение кислорода

4. Цель стадии предварительной обработки культуральной жидкости в производстве антибиотиков:

- A) освободить культуральную жидкость от кислорода
- B) освободить культуральную жидкость от продуцента
- B) освободить культуральную жидкость от окислителей
- G) освободить культутарльную жидкость от азотистых соединений

5. Автолиз мицелия продуцента в процессе биосинтеза антибиотиков характерен для стали:

- A) тропофазы
- B) идиофазы

6. Биотехнология является начальным этапом в процессе производства:

- a) полусинтетических антибиотиков
- b) цианокобаламина
- v) бензилпенициллина
- g) кислоты аскорбиновой

7. Биотехнология является заключительным этапом в процессе производства:

- a) полусинтетических антибиотиков
- b) аминокислот химико-ферментативным методом
- v) кислоты аскорбиновой
- g) рекомбинантного инсулина

8. В развитии биотехнологии период антибиотиков проходил:

- a) 1866-1940 гг.
- b) 1941-1960 гг.
- v) 1961-1975 гг.
- g) 1975-2001 гг.

9. Практическое значение полусинтетического аминогликозида амикацина обусловлено:

- а) активностью против анаэробных патогенов
- б) отсутствием нефротоксичности
- в) устойчивостью к защитным ферментам у бактерий, инактивирующими другие аминогликозиды
- г) активным выделением из клетки

10. Защита продуцентов аминогликозидов от собственного антибиотика:

- а) низкое сродство рибосом
- б) временная ферментативная инактивация
- в) компартментация
- г) утолщение клеточной стенки

РАЗБОР СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ НА ЗАНЯТИИ.

Задача. В настоящее время существует международная программа системы поиска и отбора антимикробных агентов, подавляющих размножение патогена только в инфицированном организме, т.е. система, позволяющая клонировать гены, которые не экспрессируются в искусственных условиях (*invitro*).

Данная система подразумевает использование определенных методов, реактивов (наборы для клонирования, рестриктазы), тест-объектов и решает такие задачи, как:

- выделение и очистка ДНК (электрофорез);
- культивирование патогенов, например, *Salmonellatyphimurium*;
- создание вектора на основе плазиды, несущей беспромоторные гены хлорамфеникол-ацетилцетилтрансферазы и лактозного оперона;
- заражение лабораторных животных (мыши);
- высев патогенов из животных объектов.

Расположите последовательно этапы данной системы скрининга антимикробных агентов, учитывая применение:

- генно-инженерных методов при получении набора различных плазмид;
- набора различных штаммов *E. coli* с разными частями генома сальмонеллы;
- индикаторной среды для отбора нужных колоний.

Прокомментируйте результаты и возможности применения данной системы при поиске антимикробных агентов, используемых в качестве ЛС.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ.

Задача. Одна из инфекционных клиник закупила партии пенициллина и стрептомицина. Через некоторое время в аптеку пришли представители клиники с жалобой на отсутствие терапевтического эффекта почти у всех больных клиники. После проверки в лаборатории было установлено, что препараты не фальсифицированы и соответствуют качеству стандартной продукции.

Проанализируйте данную ситуацию с точки зрения:

- возможных механизмов антибиотикорезистентности у микроорганизмов и генетических аспектов явления «инфекционной резистентности» или «госпитальной инфекции»;

- возможных механизмов индукции β -лактамаз (PBPs-2 и PBPs-3) и их ингибиования;
- разрешения данной ситуации.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИСХОДЯЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ:

1. Цефалоспорин четвертого поколения, устойчивый к бета-лактамазам грамположительных бактерий:

- а) цефазолин
- б) цефтриаксон
- в) цефепим
- г) цепролекс

2. Пенициллиназа используется при:

- а) проверке заводских серий пенициллина на стерильность
- б) оценке эффективности пеницилловых структур против резистентных бактерий
- в) получении полусинтетических пенициллинов
- г) снятии аллергических реакций на пенициллин

3. Свойство бета-лактамов, из-за которого их следует, согласно GMP, нарабатывать в отдельных помещениях:

- а) общая токсичность
- б) хроническая токсичность
- в) эмбриотоксичность
- г) аллергенность

4. Биосинтез антибиотиков, используемых как лекарственный вещества, усиливается и наступает раньше на средах:

- а) богатых источниками азота
- б) богатых источниками углерода
- в) богатых источниками фосфора
- г) бедных питательными веществами

5. С точки зрения биотехнологии антибиотики являются:

- а) первичными метаболитами
- б) аминокислотами
- в) ферментами
- г) вторичными метаболитами

6. Какая цель не преследуется при перемешивании среды в реакторе:

- А) удаление с поверхности клеток продуктов обмена и лизиса клеток
- Б) распыление воздуха, выходящего из барботера
- В) равномерное распределение питательных веществ
- Г) отделение культуральной среды от продуцента

7. При биосинтезе какого антибиотика необходим источник хлора:

- А) ампициллина
- Б) стрептомицина

В) левомицетина

Г) грамицидина С.

8. Токсичность плохо очищенных препаратов стрептомицина связана:

А) с наличием в препаратах гистаминоподобных веществ

Б) с образованием токсичных веществ из стрептомицина

В) с повышенной скоростью проникновения стрептомицина в ткани организма

Г) с пониженной скоростью проникновения стрептомицина в ткани организма и, таким образом, повышенным его содержанием в крови.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ:

Основная:

1. Биотехнология. Ю.О. Сазыкин, С.Н. Орехов, И.И. Чакалева – М.: «Академия», 2007. – С. 85-101, 182-191, 204-218.

2. Фармацевтическая биотехнология: Учебное пособие для студентов высших уч. заведений Прищеп Т.П., Чучалин В.С., Зайков К.Л., Михалева Л.К., Белова Л.С. Ростов-на-Дону Феникс Томск Издательство НТЛ Сибирский Государственный медицинский Университет, 2006. – 251 с.

3. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям: учеб. пособие / С.Н. Орехов ; под ред. В.А. Быкова, А.В. катлинского. – м.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – С. 123-142.

4. Лекция № 5,6.

5.Фармацевтическая биотехнология: руководство к практическим занятиям: учеб. пособие /. 2-е изд., перераб. и доп. С.Н. Орехов М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. – 432 с.

Дополнительная:

6. Терминологический словарь по биотехнологии

7. Биология: учеб.пособие / Г.Г. Чебышев ; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 416 с.

8.Микробиология, вирусология и иммунология: рук. к лаб. занятиям: учеб. пособие / В.С. Сбоячакова; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 320 с.

9. Микробиология: учебник для студентов фармацевтических ВУЗов / А.А. Воробьев и др.; – М.: «Медицина», 2003. – 336 с.

Занятие № 12.

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «Антибиотики: частная технология антибиотиков».

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: студенты должны изучить частную биотехнологию антибиотиков: пенициллинов, стрептомицинов и др. ЛП, номенклатуру антибиотиков.

ЗНАЧИМОСТЬ: частная биотехнология антибиотиков является тонким аспектом фармацевтической биотехнологии. Это очень сложный многогранный процесс, имеющий большое количество экзогенных и эндогенных факторов, влияющих на процесс получения и качество антибиотиков. Будущий специалист должен хорошо ориентироваться и проводить сравнительный анализ различных методов получения антибиотиков разных групп.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ (в академических часах) – 3.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: 527 аудитория, 2 корпус.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ И БЮДЖЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

1. Организационный момент 5 мин.
2. Тестовый контроль входного уровня знания 10 мин.
3. Опрос, дискуссия, разбор ситуационной задачи на занятии 47 мин.
4. Перерыв 10 мин.
5. Опрос, дискуссия, самостоятельное решение ситуационной задачи 47 мин.
6. Тестовый контроль исходного уровня знания 10 мин.
7. Подведение итогов занятия, задание к следующему занятию 6 мин.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ:

Контрольные вопросы:

1. Антибиотикорезистентность.
2. Пути борьбы с антибиотикорезистентностью.
3. Поиск новых природных а/б.
4. Биотехнология антибиотиков.
5. Частная технология а/б: пенициллины и цефалоспорины.

ТТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВХОДНОГО УКОНРОЛЯ ЗНАНИЙ.

Выберите правильные ответы.

В производстве а/б при культивировании микроорганизмов используется:

- А) поверхностное культивирование
- Б) глубинное культивирование

2. В производстве а/б при культивировании микроорганизмов используются питательные среды:

- А) твердые
- Б) жидкые
- В) газообразные

3. Какая цель не преследуется при перемешивании среды в реакторе:

- А) удаление с поверхности клеток продуктов обмена и лизиса клеток
- Б) распыление воздуха, выходящего из барботера
- В) равномерное распределение питательных веществ
- Г) отделение культуральной среды от продуцента

4. При биосинтезе какого антибиотика необходим источник хлора:

- А) ампициллина
- Б) стрептомицина
- В) левомицетина
- Г) грамицидина С.

5. Токсичность плохо очищенных препаратов стрептомицина связана:

- А) с наличием в препаратах гистаминоподобных веществ
- Б) с образованием токсичных веществ из стрептомицина
- В) с повышенной скоростью проникновения стрептомицина в ткани организма
- Г) с пониженной скоростью проникновения стрептомицина в ткани организма и, таким образом, повышенным его содержанием в крови.

6. От собственного антибиотика продуценты аминогликозидов защищаются с помощью:

- а) низкого сродства рибосом
- б) временная ферментативная инактивация
- в) компартментация
- г) утолщение клеточной стенки

7. Что такое активное выделение антибиотика из бактериальной клетки – это:

- а) экранирование рибосомы
- б) эффлюкс
- в) снижение проницаемости внешних клеточных структур
- г) ремиссия

8. Местами естественного обитания продуцентов антибиотиков:

- а) почва
- б) воздух
- в) деревья
- г) проточная вода

9. Плесневые грибы как продуценты антибиотиков:

- а) одноклеточные эукариоты

- б) многоклеточные эукариоты
- в) одноклеточные прокариоты
- г) многоклеточные прокариоты

10. Клеточная стенка актиномицетов состоит из:

- а) хитина
- б) пептидогликана
- в) липооплисахаридов
- г) липопротеинов

11. Актиномицеты производят:

- а) стрептомицины
- б) витамины
- в) аминокислоты
- г) ферменты

12. Оптимальная температура для синтеза антибиотиков:

- а) выше 30° С
- б) 24-29° С
- в) 15-18° С
- г) 18-22° С

13. Интенсивному биосинтезу антибиотиков способствует:

- а) уменьшение в питательной среде источников углерода
- б) увеличение в питательной среде источников азота
- в) увеличение в питательной среде глюкозы
- г) увеличение в питательной среде источников фосфора

14. Побочные эффекты антибиотикотерапии:

- а) дисбактериоз
- б) ОРВИ
- в) переломы
- г) авитаминоз

15. Мишень для антибактериальных веществ в микробной клетке иначе называют:

- а) таргет
- б) промотор
- в) сайт
- г) экзон

Разбор ситуационной задачи на занятии.

В процессе биосинтеза антибиотика из группы аминогликозидов при культивировании продуцента состав питательной среды включал соевую муку, кукурузный экстракт, повышающий эффективность ферментации и соли. Подача газового потока, источники фосфатов и азота соответствовали требованиям. При добавлении в среду некоторого количества глюкозы биосинтез был ослаблен.

1. В результате чего добавление в среду глюкозы снизило эффективность биосинтеза антибиотика? Какое название носит данный эффект, его сущность?
2. Какие общие закономерности необходимо учитывать при культивировании большинства продуцентов вторичных метаболитов?
3. Какие углеводороды наиболее благоприятны для биосинтеза антибиотиков?

Самостоятельная работа. Решение ситуационной задачи.

Задача 1. Определите лекарственную субстанцию по описанию технологического процесса, назовите продуцент и метод его совершенствования, методы выделения и очистки, способ сушки лекарственной субстанции:

« ...продуцент Bacilluspolimyxa обработан многократно рентгеновскими и ультрафиолетовыми лучами, а также азотсодержащими веществами с селекцией на каждом этапе. Сверхпродуцент помещен в ферментатор на жидкую питательную среду, содержащую крахмал, соевую муку, кукурузный экстракт, минеральные соли. После завершения процесса культивирования целевой продукт извлечен из культуральной жидкости и очищен методом ионообменной хроматографии. Целевой продукт высушен распылительной сушкой. Выпускается в таблетках по 500 000 ЕД..»

1. Для чего стремятся получить сверхпродуцент?
2. Их свойства, особенности хранения.
3. Необходимо ли учитывать требования GMP при биосинтезе антибиотиков?

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИСХОДЯЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.

Выберите правильные ответы:

1. Антибиотики являются:

- А – первичными метаболитами;
- Б – вторичными метаболитами.

2. Биологическая роль антибиотиков:

- А – они необходимы для деления клеток;
- Б – это одна из форм микробного антагонизма;
- В – являются кофакторами ферментов, принимающих участие в синтезе клеточной мембранны;
- Г – являются кофакторами ферментов, принимающих участие в формировании клеточной стенки.

3. Цель стадии предварительной обработки культуральной жидкости в производстве антибиотиков:

- А – освободить культуральную жидкость от кислорода;
- Б – освободить культуральную жидкость от продуцента;
- В – освободить культуральную жидкость от окислителей;
- Г – освободить культуральную жидкость от азотистых соединений.

4. Процессы, характерные для стадии трофозы биосинтеза антибиотиков:

- А- интенсивное накопление биомассы продуцента;
- Б – интенсивное поглощение кислорода;
- В – снижение уровня pH;
- Г – интенсивное образование антибиотика.

5. При биосинтезе какого антибиотика необходим источник хлора:

- А – ампициллина;
- Б – стрептомицина;
- В – левомицетина;
- Г – грамицидина С.

- 6. При использовании в качестве источника азота аммония сульфата в присутствии ионов кальция субстрат будет:**
- А – подщелачиваться;
Б – подкисляться;
В – среда остается нейтральной.
- 7. Антибиотик, к которому медленно развивается у микроорганизмов вторичная резистентность:**
- А – эритромицин;
Б – стрептомицин;
В – хлорамфеникол;
Г – канамицин.
- 8. В производстве антибиотиков при культивировании микроорганизмов используются:**
- А – поверхностное культивирование;
Б – глубинное культивирование.
- 9. В производстве антибиотиков при культивировании микроорганизмов используются питательные среды:**
- А – твердые;
Б – жидкие;
В – мягкие;
Г – газообразные.
- 10. Микроорганизмы, которые НЕ используются в процессе биосинтеза антибиотиков:**
- А – вирусы;
Б – бактерии;
В – актиномицеты;
Г – грибы.
- 11. Широкое применение для промышленного выделения и очистки антибиотиков находит:**
- А – хроматография в тонких слоях;
Б – ионообменная хроматография;
В – высокоэффективная жидкостная хроматография;
Г – бумажная хроматография.
- 12. Требование, неприемлемое для кормовых антибиотиков:**
- А – не должны всасываться из желудочно-кишечного тракта;
Б – не должны загрязнять продукты животного происхождения;
В – должны использоваться в медицине;
Г – не должны обладать способностью образовывать у микроорганизмов множественную резистентность.
- 13. Грамицидин С из культуральной жидкости осаждают:**
- А – кислотой хлороводородной;
Б – сернокислым аммонием;
В – этанолом.
- 14. При промышленном производстве стрептомицина используются штаммы, хорошо развивающиеся на средах:**

- А – кукурузных;
- Б – гороховых;
- В – хлопковых;
- Г – соевых.

15. Токсичность плохо очищенных препаратов стрептомицина связана:

- А – с наличием в препаратах гистаминоподобных веществ;
- Б – с образованием токсичных веществ из стрептомицина;
- В – с повышенной скоростью проникновения стрептомицина в ткани организма;
- Г – с пониженной скоростью проникновения стрептомицина в ткани организма и, таким образом, повышенным его содержанием в крови.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ:

Основная:

1. Биотехнология. Ю.О. Сазыкин, С.Н. Орехов, И.И. Чакалева – М.: «Академия», 2007. – С. 85-101, 182-191, 204-218.
2. Фармацевтическая биотехнология: Учебное пособие для студентов высших уч. заведений Прищеп Т.П., Чучалин В.С., Зайков К.Л., Михалева Л.К., Белова Л.С. Ростов-на-Дону Феникс Томск Издательство НТЛ Сибирский Государственный медицинский Университет, 2006. – 251 с.
3. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям: учеб. пособие / С.Н. Орехов; под ред. В.А. Быкова, А.В. катлинского. – м.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – С. 123-142.
4. Лекция № 5,6.
- 5.Фармацевтическая биотехнология: руководство к практическим занятиям: учеб. пособие /. 2-е изд., перераб. и доп. С.Н. Орехов М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. – 432 с.

Дополнительная:

6. Терминологический словарь по биотехнологии
7. Биология: учеб.пособие / Г.Г. Чебышев ; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 416 с.
- 8.Микробиология, вирусология и иммунология: рук. к лаб. занятиям: учеб. пособие / В.С. Сбоячакова; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 320 с.
9. Микробиология: учебник для студентов фармацевтических ВУЗов / А.А. Воробьев и др.; – М.: «Медицина», 2003. – 336 с.

Занятие № 13.

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «Ферменты. Иммобилизированные ферменты».

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: студенты должны изучить ферменты, биотехнологические методы их получения, иммобилизация ферментов, номенклатуру ферментных ЛС.

ЗНАЧИМОСТЬ: биотехнология с момента зарождения основана на ферментных процессах. В настоящее время ферментные препараты широко используются для лечения и профилактики различных патологий. Будущий провизор должен знать данные ЛС, их получение и сравнительную характеристику.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ (в академических часах) – 3.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: 527 аудитория, 2 корпус.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ И БЮДЖЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

1. Организационный момент 5 мин.
2. Тестовый контроль входного уровня знания 10 мин.
3. Опрос, дискуссия, разбор ситуационной задачи на занятии 47 мин.
4. Перерыв 10 мин.
5. Опрос, дискуссия, самостоятельное решение ситуационной задачи 47 мин.
6. Тестовый контроль исходного уровня знания 10 мин.
7. Подведение итогов занятия, задание к следующему занятию 6 мин.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ:

Контрольные вопросы:

1. Общее понятие о ферментах.
2. Общая технологическая схема получения ферментов биотехнологическим методом. Промышленное получение ферментов.
3. Основные направления медицинской энзимологии. Классификация энзимов. Что характерно для ферментативной реакции?

4. В чем заключаются особенности культивирования продуцентов ферментов? Какие среды и какого состава могут быть использованы для этого процесса?
5. Как осуществляется процесс выделения и очистки ферментов, получаемых биотехнологическим методом? Как осуществляется процесс фильтрации? Как осуществляется процесс дезинтеграции биомассы? Какие хроматографические методы применяются для фракционирования? Особенности аффинной хроматографии.
6. Что такое иммобилизация? Какие методы иммобилизации ферментов вы знаете? Какие материалы используются для адсорбции ферментов? В чем заключается этот метод иммобилизации ферментов? Как осуществляется метод иммобилизации ферментов с помощью ковалентных связей? Каковы особенности данного метода? В чем заключается металлохелатный метод иммобилизации и метод включения ферментов в гель?
7. Использование микрокапсул и липосом для получения ферментных препаратов.
8. Иммобилизованные растительные клетки.
9. Номенклатура некоторых ферментных ЛП.
10. Опишите технологию получения террилитина и стрептокиназы.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.

1. Регулирует процесс пищеварения:

А а-амилаза

Б ораза

В стрептодеказа

2. Верно ли утверждение:«Полиакриламидный гель не обладает ионно-обменными свойствами, поэтому при иммобилизации pH - профиль активности фермента не изменяется»:

А Верно

Б Неверно

3. В процессе выделения из культуральной среды ферментов и их очистки не используется:

А экстракция

Б сорбционные процессы

В осаждение (высаливание)

Г перегонка с водяным паром

4. Фермент лигаза, используемый в генетической инженерии:

А скрепляет вектор с оболочкой клетки хозяина

Б катализирует включение вектора в хромосому клеток хозяина

В катализирует ковалентное связывание углеводно – фосфорной цепи ДНК – гена с ДНК – вектора

Г катализирует замыкание пептидных мостиков в пептидогликане клеточной стенки

5. Целями иммобилизации ферментов в биотехнологической производстве являются:

А повышение удельной активности

Б повышение стабильности

В расширение субстратного спектра

Г многократное использование

6. Противоопухолевым ферментным препаратом является:

а) аспарагиназа

б) стрептокиназа

в) пенициллиназа

г) урокиназа

7. Лактоза под действием лактазы расщепляется с образованием:

а) глюкозы и фруктозы

б) глюкозы и галактозы

в) двух молекул сахарозы

г) двух молекул фруктозы

8. Фермент лактаза относится к классу:

а) липаз

б) трансфераз

в) изомераз

г) гидролаз

РАЗБОР СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ НА ЗАНЯТИИ.

Задача. Несмотря на то, что в основе современной инженерной энзимологии лежит применение ферментов и ферментных систем, технологическое использование ферментов имеет вполне конкретные ограничения: лабильность ферментов, дороговизна и большая трудоемкость при их очистке, однократность их использования, в ряде случаев наличие коферментов.

Проанализируйте ситуацию с обоснованием:

- путей преодоления этих ограничений;
- сопоставления функции биообъекта с технологической операцией;
- понятия «система, открытая для усложнения».

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ.

Задача. Какие два основных метода иммобилизации ферментов Вы знаете? Какие два основных способа для иммобилизации ферментов в геле вам известны? В чем заключается принцип иммобилизации ферментов с использованием мембран? Микрокапсулирование. Включение вволокна и включение в липосомы. Метод иммобилизации ферментов с использованием систем двухфазноготипа. Методы химической иммобилизации, отличия от физической иммобилизации.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИСХОДЯЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.

1. Фермент амилазу для производственных процессов получают из культуры:

а) Aspergillus niger

б) Bacillus subtili

в) Bacillus coagulans

г) Arthrobacter simplex

2. Фермент амилоглюкозидазу, осуществляющий гидролиз олигосахаридов до глюкозы, для производственных процессов получают из культуры:

а) Aspergillus niger

б) Bacillus subtili

в) Bacillus coagulans

г) Arthrobacter simplex

3. Мультиферментный комплекс – это:

- а) комплекс ферментных белков, выделяемый из клетки путем экстракции и осаждения
- б) комплекс ферментов клеточной мембранны
- в) комплекс экзо- и эндопротеаз
- г) комплекс ферментов, катализирующих синтез первичного или вторичного метаболита

4. Лизоимадаза применяется для:

- а) улучшения процесса пищеварения
- б) очистки ран от гнойно-некротических масс
- в) лечения тромбозов
- г) снятия анафилактического шока

5. Методы иммобилизации:

- а) внутриклеточные
- б) физико-химические
- в) ферментативные
- г) химические

6. Препараты протеолитических ферментов:

- а) террилитин
- б) солизим
- в) стрептолиаза
- г) аспарагиназа

7. Пенициллиназа применяется с целью:

- а) лечения лейкемии
- б) лизиса некротических масс в ткани
- в) снятия анафилактического шока
- г) лечения гиперурекимии

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ:

Основная:

1. Биотехнология. Ю.О. Сазыкин, С.Н. Орехов, И.И. Чакалева – М.: «Академия», 2007. – С. 85-101, 182-191, 204-218.

2. Фармацевтическая биотехнология: Учебное пособие для студентов высших уч. заведений Прищеп Т.П., Чучалин В.С., Зайков К.Л., Михалева Л.К., Белова Л.С. Ростов-на-Дону Феникс Томск Издательство НТЛ Сибирский Государственный медицинский Университет, 2006. – 251 с.

3. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям: учеб. пособие / С.Н. Орехов ; под ред. В.А. Быкова, А.В. катлинского. – м.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – С. 123-142.

4. Лекция № 7.

5.Фармацевтическая биотехнология: руководство к практическим занятиям: учеб. пособие /. 2-е изд., перераб. и доп. С.Н. Орехов М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. – 432 с.

Дополнительная:

6. Терминологический словарь по биотехнологии

7. Биология: учеб.пособие / Г.Г. Чебышев ; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 416 с.

- 8.**Микробиология, вирусология и иммунология: рук. к лаб. занятиям: учеб. пособие / В.С. Сбоячакова; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 320 с.
- 9.** Микробиология: учебник для студентов фармацевтических ВУЗов / А.А. Воробьев и др.; – М.: «Медицина», 2003. – 336 с.

Занятие № 14.

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «Препараты нормофлоры. Биопрепараты растительного происхождения»

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: студенты должны изучить биотехнологию препаратов нормофлоры, пробиотиков, пребиотиков, их номенклатуру, а также изучить биотехнологические методы получения ЛС из растений.

ЗНАЧИМОСТЬ: большое количество препаратов нормофлоры получают биотехнологическими методами. На сегодняшний день данные технологии являются перспективными и экономичными, в связи с чем будущий провизор должен знать биотехнологический процесс получения данных препаратов.

ЛС, полученные на основе каллусных и суспензионных культур растительных клеток, широко используются в клинической практике. Знание биотехнологии ЛС растительного происхождения необходимы будущему специалисту для аргументированного способа их получения, а также для участия в получении высококачественного готового продукта.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ (в академических часах) – 3.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: 527 аудитория, 2 корпус.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ И БЮДЖЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

1. Организационный момент 5 мин.
2. Тестовый контроль входного уровня знания 10 мин.
3. Опрос, дискуссия, разбор ситуационной задачи на занятии 47 мин.
4. Перерыв 10 мин.
5. Опрос, дискуссия, самостоятельное решение ситуационной задачи 47 мин.
6. Тестовый контроль исходного уровня знания 10 мин.
7. Подведение итогов занятия, задание к следующему занятию 6 мин.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ:

Контрольные вопросы:

1. Понятия: пробиотики, симбиоз, симбионты.
2. Содержание микрофлоры кишечника человека.
3. Лакто- и бифидобактерии.
4. Дисбактериоз. Причины возникновения, профилактика и лечение.
5. Производство препаратов нормофлоры.
6. Частная технология препаратов нормофлоры.
7. Номенклатура препаратов нормофлоры: бактисубтил, бифидумбактерин в порошке, бификол сухой, бифилиз, бифилонг сухой, биовестин, лактобактерин в порошке, аципол сухой, линекс, колибактерин сухой, споробактерин сухой, энтерол 250, концентрат «Наринэ», пребиотики.
8. Культура изолированных клеток, тканей и органов растений.
9. Особенности культивирования изолированных клеток и тканей растений.
10. Методы культивирования изолированных клеток и тканей.
11. Культура растительных клеток как источник ЛВ.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ВХОДЯЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.**1. Пребиотики это:**

- а) живые ослабленные штаммы нормальной микрофлоры кишечника
- б) это пищевые вещества, которые питают полезные микроорганизмы и способствуют их развитию
- в) комплекс живых микроорганизмов разных видов и вещества, стимулирующие их колонизирующую способность и размножение

2. К поликомпонентным пробиотикам относятся:

- А) бифидумбактерин
- Б) бифилак
- В) бифиформ

3. Микроорганизмы, используемые для создания эубиотиков, должны обладать:

- А) устойчивостью к антибиотикам
- Б) антагонистической активностью
- В) адгезивными свойствами
- Г) достаточной скоростью роста

4. К препаратам пробиотиков, не содержащих лактобактерии, относят:

- а) гастрофарм
- б) бифилиз
- в) линекс
- г) лактобактерин сухой

5. Рост одного микроорганизма подавляется в присутствии другого – это:

- а) нейтрализм
- б) аменсализм
- в) комменсализм
- г) симбиоз

Эталон ответа: б

6. Механизмы мутуализма:

- а) обмен питательными веществами
- б) синтез токсических веществ
- в) поглощение незаменимых питательных веществ
- г) секреция ферментов, разрушающих полимеры клеточной стенки

7. Состояние системы, когда ни один из организмов не оказывает влияния на скорость роста другого микроорганизма, называется:

- а) нейтрализм
- б) мутуализм
- в) комменсализм
- г) аменсализм

8. Bacillus входит в состав препарата:

- а) Флонивин БС
- б) Нормофлор
- в) Энтерол
- г) Бификол

9. Симбиотики это:

- а) живые ослабленные штаммы нормальной микрофлоры кишечника
- б) это пищевые вещества, которые питают полезные микроорганизмы и способствуют их развитию
- в) комплекс живых микроорганизмов разных видов и вещества, стимулирующие их колонизирующую способность и размножение

10. Индукторами реализации totipotентности клеток и тканей растений являются:

- а) УФ-облучение
- б) витамины
- в) аминокислоты
- г) фитогормоны

11. Эксплант – это:

- а) изолированные из растений фрагменты ткани
- б) фрагменты каллуса для субкультивирования
- в) часть суспензионной культуры для субкультивирования
- г) культура, возникающая из одной клетки

12. Тип питания культуры тканей растений:

- а) ауксотрофный
- б) хемогетеротрофный
- в) фотоавтотрофный
- г) хемолитотрофный

13. Из культуры какой клетки выделяют шиконин:

- а) Воробейника краснокорневого
- б) Табака курительного
- в) Женьшения
- г) Родиолы розовой

14. Из культуры какой клетки выделяют убихинон:

- а) Воробейника краснокорневого
- б) Табака курительного
- в) Женьшения

г) Родиолы розовой

15. Из культуры какой клетки выделяют синтез панаксозидов:

- а) Воробейника краснокорневого
- б) Табака курительного
- в) Женьшения
- г) Родиолы розовой

РАЗБОР СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ НА ЗАНЯТИИ.

Задача 1. Предложите посетителю аптеки лекарственные препараты на основе пробиотиков и пребиотиков, прием которых можно совмещать с приемом пероральных препаратов антибиотиков.

Задача 2. Биотехнологические методы получения ЛС на основе культур клеток растений имеют широкое распространение, поскольку по сравнению с получением биомассы растительных культур из дикой природы или с плантаций эти методы отличаются высокой рентабельностью, экологичностью, независимостью от географии и климата произрастания того или иного растения, а также обеспечивают высокое качество целевого продукта, стабильность производства и возможность управления процессами (автоматизацию). Все вышеперечисленное указывает на высокую перспективность дальнейшего развития данных методов. Анализируя данную ситуацию: представьте технологии получения лекарственных препаратов растительного происхождения с конкретными примерами, обращая внимание на специфику растительных клеток, фазы роста, питательные среды, условия ферментации и типы биореакторов; сопоставьте стабильность процесса по выходу вторичных метаболитов с дифференцировкой клеток и со стадией культивирования (фазы роста клеток); предложите метод использования ферментов для превращения дигитоксина в дигоксин (последний менее токсичен и поэтому его применяют в качестве сердечного препарата - карденолида).

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ.

Задача 1. Факторы, вызывающие нарушения ЖКТ. Представители резидентной микрофлоры ЖКТ человека. Кто преобладает? Принципы пробиотикотерапии. Определение. Что представляет препарат Хилак-форте? Является ли он пробиотиком?

Задача 2. Технология производства препаратов бифидо- и лактобактерии аналогичной технологии колибактерина. Различия относятся к составу питательных сред и условиям культивирования в соответствии с физиологическими особенностями бактерий.

- Какими преимуществами обладают бифидо- и лактобактерии для производства и применения в качестве лекарственных препаратов по сравнению с кишечной палочкой?
- Какие стадии присутствуют в технологическом процессе производства препаратов пробиотиков?
- По каким показателям проводят контроль готового лекарственного препарата *Bifidobacterium bifidum*?
- Какой способ производственного культивирования в биореакторе предпочтительнее для накопления биомассы молочно-кислых бактерий.
- По каким показателям осуществляют контроль лекарственного препарата «Лактобактерин»?

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИСХОДЯЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.

1. Микроорганизмы, с которыми человек встречается в течении жизни:

- А) транзиторные, не способные к длительному пребыванию в организме
- Б) приносящие несомненную пользу
- В) условно-патогенные
- Г) возбудители инфекционных заболеваний

2. К положительным функциям нормофлоры кишечника человека относится все, кроме:

- А) межмикробногоантогонизма и активации имунной системы
- Б) синтетической и детоксикационной
- В) обменной
- Г) концентрирования и задержки в организме ксенобиотиков

3. К причинам, вызывающим дисбактериоз, относятся:

- А) использование в рационе пищевых волокон
- Б) иммунные нарушения, соматические и инфекционные болезни
- В) нарушение питания и медикаментозное воздействие
- Г) использование в пищу молочнокислых микроорганизмов

4. Для препаратов нормофлоры общим является:

- А) способ изготовления
- Б) парентеральный способ введения
- В) условия производства
- Г) биологическая активность

5. Лиофильная сушка – это:

- А) сушка из замороженного состояния под вакумом
- Б) сушка при атмосферном давлении
- В) сушка с помощью адсорбентов

6. Что не является БАДом:

- А) Бифидум – мульти 2
- Б) Нормоспектрум
- В) Нормофлорин-Л
- Г) Халак-форте

7. К иммобилизованным на сорбенте пробиотикам относят:

- А) кипацид
- Б) биофлор жидкий
- В) бифидумбактерин форте
- Г) бифилакт

8. Для производства лактобактерина применяют штамм:

- А) Lactobacteriumacidophilus
- Б) Lactobacillusplantarum

10. Оптимальные условия культивирования изолированных тканей и клеток растений:

- А) $t = 10 - 15^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха 30 – 40 %.
- Б) $t = 25 - 27^{\circ}\text{C}$, влажность 60 -70 %.

В) $t = 35 - 40^{\circ}\text{C}$, влажность 80 -90 %.

11. «Голые» протопласты – это:

А) каллусная культура.

Б) клеточная суспензия в жидкой питательной среде.

В) эубактерий.

Г) зародыши.

12. Гибриды, образованные при слиянии протопластов разных материнских клеток, называются:

А) гомокарионы.

Б) гетерокарионы.

В) зиготы.

Г) мутанты.

13. Полиэтиленгликоль, вносимый в суспензию протопластов:

А) предотвращает их слияние.

Б) способствует их слиянию.

В) предотвращает микробную контаминацию.

Г) исполняет роль консерванта.

14. Как достигается высокая стабильность протопластов при хранении в:

а) холоде

б) среде с добавлением антиоксидантов

в) гипертонической среде

г) анаэробных условиях

д) среде полиэтиленгилколя

15. Лизоцим обеспечивает получение протопластов:

а) клеток растений

б) клеток грибов

в) клеток животных

г) актиномицетов

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ:

Основная:

1. Биотехнология. Ю.О. Сазыкин, С.Н. Орехов, И.И. Чакалева – М.: «Академия», 2007. – С. 85-101, 182-191, 204-218.

2. Фармацевтическая биотехнология: Учебное пособие для студентов высших уч. заведений Прищеп Т.П., Чучалин В.С., Зайков К.Л., Михалева Л.К., Белова Л.С. Ростов-на-Дону Феникс Томск Издательство НТЛ Сибирский Государственный медицинский Университет, 2006. – 251 с.

3. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям: учеб. пособие / С.Н. Орехов ; под ред. В.А. Быкова, А.В. катлинского. – м.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – С. 123-142.

4. Лекция № 8,9.

5.Фармацевтическая биотехнология: руководство к практическим занятиям: учеб. пособие /. 2-е изд., перераб. и доп. С.Н. Орехов М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. – 432 с.

Дополнительная:

6. Терминологический словарь по биотехнологии

7. Биология: учеб.пособие / Г.Г. Чебышев ; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 416 с.

- 8.**Микробиология, вирусология и иммунология: рук. к лаб. занятиям: учеб. пособие / В.С. Сбоячакова; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 320 с.
- 9.** Микробиология: учебник для студентов фармацевтических ВУЗов / А.А. Воробьев и др.; – М.: «Медицина», 2003. – 336 с.

Занятие № 15.

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Модуль № 4 по темам:
«Препараты нормофлоры. Пребиотики. Биопрепараты растительного происхождения».

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: закрепление и систематизация знаний у студентов по изученным за модуль темам.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ (в академических часах) – 3.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: 527 аудитория, 2 корпус.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ И БЮДЖЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

1. Организационный момент 5 мин.
2. Выполнение тестовых и контрольных модульных заданий (письменно) 80 мин.
3. Перерыв 10 мин.
4. Опрос 35 мин.
5. Подведение итогов занятия, задание к следующему занятию 5 мин.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ:

Контрольные вопросы:

1. Общие понятия об антибиотиках (а/б). А/б как вторичные метаболиты.
2. Типы связей между микробиологическими сообществами.
6. Классификации а/б. Механизмы биосинтеза а/б.
7. Биотехнология а/б. Схема производства а/б по Н.Е. Егорову. Фазы процесса ферментации а/б.
8. Методы выделения и очистки а/б.
9. Механизмы действия а/б.
10. Антибиотикорезистентность. Пути борьбы с антибиотикорезистентностью. Поиск новых природных а/б.

11. Биотехнология антибиотиков.
12. Частная технология а/б: пенициллины и цефалоспорины.
13. Общее понятие о ферментах.
14. Общая технологическая схема получения ферментов биотехнологическим методом. Промышленное получение ферментов.
15. Основные направления медицинской энзимологии. Классификация энзимов. Что характерно для ферментативной реакции?
17. В чем заключаются особенности культивирования продуцентов ферментов? Какие среды и какого состава могут быть использованы для этого процесса?
18. Как осуществляется процесс выделения и очистки ферментов, получаемых биотехнологическим методом? Как осуществляется процесс фильтрации? Как осуществляется процесс дезинтеграции биомассы? Какие хроматографические методы применяются для фракционирования? Особенности аффинной хроматографии.
19. Что такое иммобилизация? Какие методы иммобилизации ферментов вы знаете? Какие материалы используются для адсорбции ферментов? В чем заключается этот метод иммобилизации ферментов? Как осуществляется метод иммобилизации ферментов с помощью ковалентных связей? Каковы особенности данного метода? В чем заключается металлохелатный метод иммобилизации и метод включения ферментов в гель?
20. Использование микрокапсул и липосом для получения ферментных препаратов.
21. Иммобилизованные растительные клетки.
22. Номенклатура некоторых ферментных ЛП.
23. Опишите технологию получения террилитина и стрептокиназы.
24. Понятия: пробиотики, симбиоз, симбионты.
25. Содержание микрофлоры кишечника человека.
26. Лакто- и бифидобактерии.
27. Дисбактериоз. Причины возникновения, профилактика и лечение.
28. Производство препаратов нормофлоры.
29. Частная технология препаратов нормофлоры.
30. Номенклатура препаратов нормофлоры: бактисубтил, бифидумбактерин в порошке, бификол сухой, бифилиз, бифилонг сухой, биовестин, лактобактерин в порошке, аципол сухой, линекс, колибактерин сухой, споробактерин сухой, энтерол 250, концентрат «Наринэ», пребиотики.
31. Культура изолированных клеток, тканей и органов растений.
32. Особенности культивирования изолированных клеток и тканей растений.
33. Методы культивирования изолированных клеток и тканей.
34. Культура растительных клеток как источник ЛВ.
35. Система GMP производства и контроля качества ЛС.
36. Общая характеристика правил GLP и GCP.
37. Экологические аспекты биотехнологии
38. Эколо- – биохимические взаимодействия в организменных сообществах.
39. Биодеградация токсических соединений и утилизация биомассы.
40. Основные санитарные и экологические требования к биотехнологическому производству.
41. От гена до прототипа лекарства. Новые подходы к разработке лекарств в постгеномную эру.

42. Поиск биомишеней для создания новых лекарственных средств на основе анализа геномных данных.
43. Основные критерии селекции мишеней для создания антимикробных средств.
44. Экспериментальные технологии валидации потенциальных мишеней. 452. Стратегия поиска соединений – лидеров.
46. Дизайн молекул. Структурные критерии.
47. Конструирование лекарств на основе известной структуры мишени (технология SBDD).

ЭТАЛОНЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ:

Вариант 1

1. Пробиотики это:

- А) биопрепараты нормальной микрофлоры кишечника;
- Б) пищевые БАД, состоящие из углеводов

2. К монокомпонентным пробиотикам относятся:

- А) бифидумбактерин
- Б) бифилак
- В) бифиформ

3. К поликомпонентным пробиотикам относятся:

- А) бифидумбактерин
- Б) бифилак
- В) бифиформ

4. Микроорганизмы, используемые для создания эубиотиков, должны обладать:

- А) устойчивостью к антибиотикам
- Б) антагонистической активностью
- В) адгезивными свойствами
- Г) достаточной скоростью роста

5. Длительность (в сутках) процесса производства лактобактерина в ампулах составляет:

- А) 2
- Б) 5
- В) 7
- Г) 42

6. Культуры клеток и тканей лекарственных растений впервые получены:

- А) в начале ХХ в.
- Б) в середине ХХ в.
- В) в конце ХХ в.

7. Оптимальные условия культивирования изолированных тканей и клеток растений:

- А) $t = 10 - 15^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха 30 – 40 %.
- Б) $t = 25 - 27^{\circ}\text{C}$, влажность 60 -70 %.
- В) $t = 35 - 40^{\circ}\text{C}$, влажность 80 -90 %.

8. «Голые» протопласты – это:

- А) каллусная культура.
- Б) клеточная суспензия в жидкой питательной среде.

В) эубактерий.

Г) зародыши.

9. Гибриды, образованные при слиянии протопластов разных материнских клеток, называются:

А) гомокарионы.

Б) гетерокарионы.

В) зиготы.

Г) мутанты.

10. Полиэтиленгликоль, вносимый в суспензию протопластов:

А) предотвращает их слияние.

Б) способствует их слиянию.

В) предотвращает микробную контаминацию.

Г) исполняет роль консерванта.

11. Для сбраживания субстрата при производстве этанола целесообразнее использовать:

А) *S. cerevisiae*.

Б) *Zymomonas mobilis*.

В) *E. coli*.

Г) *C. albicans*.

12. Феромоны, вызывающие немедленные поведенческие эффекты:

А) феромоны – релизеры.

Б) феромоны – праймеры.

13. Мицелий продуцента после его отделения от культуральной жидкости представляет собой:

А) жидкие отходы.

Б) твердые отходы.

В) газообразные отходы.

14. Какие основные виды микроорганизмов присутствуют в «активном иле»:

А) рода *Staphylococcus*

Б) рода *Pseudomonas*

В) рода *Streptococcus*

Г) рода *Bacterium*

15. Препарат «Phenobac» используют:

А) для утилизации углеводородов

Б) для окисления полисахаридов

В) для освобождения от синтетических детергентов.

16. Антибиотики являются:

А) первичными метаболитами

Б) вторичными метаболитами

17. Процессы не характерные для трофофазы стадии биосинтеза а/б:

А) интенсивное накопление биомассы продуцента

Б) интенсивное накопление а/б

В) интенсивное поглощение кислорода

18. Процессы характерные для идиофазы стадии биосинтеза а/б:

А) интенсивное накопление биомассы продуцента

- Б) интенсивное накопление а/б
- В) интенсивное поглощение кислорода

19. Цель стадии предварительной обработки культуральной жидкости в производстве антибиотиков:

- А) освободить культуральную жидкость от кислорода
- Б) освободить культуральную жидкость от продуцента
- В) освободить культуральную жидкость от окислителей
- Г) освободить культуральную жидкость от азотистых соединений

20. Автолиз мицелия продуцента в процессе биосинтеза антибиотиков характерен для стали:

- А) тропофазы
- Б) идиофазы
- клеточной стенки

21. Регулирует процесс пищеварения:

- А α-амилаза
- Б ораза
- В стрептодеказа

22. Верно ли утверждение: «Полиакриламидный гель не обладает ионно-обменными свойствами, поэтому при иммобилизации pH - профиль активности фермента не изменяется»:

- А Верно
- Б Неверно

23. В процессе выделения из культуральной среды ферментов и их очистки не используется:

- А экстракция
- Б сорбционные процессы
- В осаждение (высаливание)
- Г перегонка с водяным паром

24. Фермент лигаза, используемый в генетической инженерии:

- А скрепляет вектор с оболочкой клетки хозяина
- Б катализирует включение вектора в хромосому клеток хозяина
- В катализирует ковалентное связывание углеводно – фосфорной цепи ДНК – гена с ДНК – вектора
- Г катализирует замыкание пептидных мостиков в пептидогликане клеточной стенки

25. Целями иммобилизации ферментов в биотехнологической производстве являются:

- А повышение удельной активности
- Б повышение стабильности
- В расширение субстратного спектра
- Г многократное использование

26. В производстве а/б при культивировании микроорганизмов используется:

- А) поверхностное культивирование
- Б) глубинное культивирование

27. В производстве а/б при культивировании микроорганизмов используются питательные среды:

А) твердые

Б) жидкые

В) газообразные

28. Какая цель не преследуется при перемешивании среды в реакторе:

А) удаление с поверхности клеток продуктов обмена и лизиса клеток

Б) распыление воздуха, выходящего из барботера

В) равномерное распределение питательных веществ

Г) отделение культуральной среды от продуцента

29. При биосинтезе какого антибиотика необходим источник хлора:

А) ампициллина

Б) стрептомицина

В) левомицетина

Г) грамицидина С.

30. Токсичность плохо очищенных препаратов стрептомицина связана:

А) с наличием в препаратах гистаминоподобных веществ

Б) с образованием токсичных веществ из стрептомицина

В) с повышенной скоростью проникновения стрептомицина в ткани организма

Г) с пониженной скоростью проникновения стрептомицина в ткани организма и, таким образом, повышенным его содержанием в крови.

Вариант 2

1. К препаратам пробиотиков, не содержащих бифидобактерии, относят:

а) пробифор

б) нормофлор

в) бификол

г) бифилиз

2. К препаратам пробиотиков, не содержащих лактобактерии, относят :

а) гастрофарм

б) бифилиз

в) линекс

г) лактобактерин сухой

3. Если оба штамма в смешанной культуре растут быстрее, чем в соответствующих чистых культурах, явление носит название:

а) нейтрализм

б) мутуализм

в) аменсализм

г) комменсализм

4. Рост одного микроорганизма подавляется в присутствии другого – это:

а) нейтрализм

б) аменсализм

в) комменсализм

г) симбиоз

5. Культивирование молочнокислых бактерий осуществляют при рН:

а) 5,5-6,0

- б) 8,0-8,2
- в) 6,0-7,0
- г) 7,2-8,0

6. Как достигается высокая стабильность протопластов при хранении в:

- а) холоде
- б) среде с добавлением антиоксидантов
- в) гипертонической среде
- г) анаэробных условиях
- д) среде полиэтиленгилколя

7. Лизоцим обеспечивает получение протопластов:

- а) клеток растений
- б) клеток грибов
- в) клеток животных
- г) актиномицетов

8. Культура тканей растений – это:

- а) выращивание лекарственных растений на опытном поле
- б) культивирование микроорганизмов, усвоивших ген растения, ответственный за синтез определенного БАВ
- в) выращивание в стерильных искусственных условиях изолированных клеток, тканей, органов растений на твердых или жидких питательных средах
- г) сбор растений на естественных средах обитания

9. Основное преимущество растительного сырья, получаемого при выращивании культур клеток перед сырьем, получаемым из плантационных или дикорастущих растений:

- а) большая концентрация целевого продукта
- б) меньшая стоимость
- в) стандартность
- г) более простое извлечение целевого продукта

10. Индукторами реализации totipotентности клеток и тканей растений являются:

- а) УФ-облучение
- б) витамины
- в) аминокислоты
- г) фитогормоны

11. Функцией феромонов является:

- а) антимикробная активность
- б) противовирусная активность
- в) изменение поведения организма со специфическим рецептором
- г) терморегулирующая активность
- д) противоопухолевая активность

12. Значение алломонов как сигнально-коммуникативных веществ для секреции организма:

- а) адаптивно выгодное
- б) органические популяции
- в) узнавание на территории
- г) половые атTRACTАНты

13. Значение крайромонов в природе:

- а) антимикробная активность
- б) регуляция численности популяции
- в) привлечение особей своего вида
- г) отпугивание особей других видов

14. В состав активного ила входят:

- а) вирусы
- б) бактериофаги
- в) бактерии
- г) сине-зеленые водоросли

15. При очистке стоков биотехнологических производств применяют активный ил – это:

- а) природный комплекс микроорганизмов
- б) сорбент
- в) смесь сорбентов
- г) смесь микроорганизмов

16. Биотехнология является начальным этапом в процессе производства:

- а) полусинтетических антибиотиков
- б) цианокобаламина
- в) бензилпенициллина
- г) кислоты аскорбиновой

17. Биотехнология является заключительным этапом в процессе производства:

- а) полусинтетических антибиотиков
- б) аминокислот химико-ферментативным методом
- в) кислоты аскорбиновой
- г) рекомбинантного инсулина

18. В развитии биотехнологии период антибиотиков проходил:

- а) 1866-1940 гг.
- б) 1941-1960 гг.
- в) 1961-1975 гг.
- г) 1975-2001 гг.

19. Практическое значение полусинтетического аминогликозида амикацина обусловлено:

- а) активностью против анаэробных патогенов
- б) отсутствием нефротоксичности
- в) устойчивостью к защитным ферментам у бактерий, инактивирующими другие аминогликозиды
- г) активным выделением из клетки

20. Защита продуцентов аминогликозидов от собственного антибиотика:

- а) низкое сродство рибосом
- б) временная ферментативная инактивация
- в) компартментация
- г) утолщение

21. Противоопухолевым ферментным препаратом является:

- а) аспарагиназа

- б) стеptокиназа
- в) пенициллиназа
- г) урокиназа

22. Лактоза под действием лактазы расщепляется с образованием:

- а) глюкозы и фруктозы
- б) глюкозы и галактозы
- в) двух молекул сахарозы
- г) двух молекул фруктозы

23. Фермент лактаза относится к классу:

- а) липаз
- б) трансфераз
- в) изомераз
- г) гидролаз

24. Фермент амилазу для производственных процессов получают из культуры:

- а) Aspergillus niger
- б) Bacillus subtili
- в) Bacillus coagulans
- г) Arthrobacter simplex

25. Фермент амилоглюкозидазу, осуществляющий гидролиз олигосахаридов до глюкозы, для производственных процессов получают из культуры:

- а) Aspergillus niger
- б) Bacillus subtili
- в) Bacillus coagulans
- г) Arthrobacter simplex

26. От собственного антибиотика продуценты аминогликозидов защищаются с помощью:

- а) низкого сродства рибосом
- б) временная ферментативная инактивация
- в) компартментация
- г) утолщение клеточной стенки

27. Что такое активное выделение антибиотика из бактериальной клетки – это:

- а) экранирование рибосомы
- б) эффлюкс
- в) снижение проницаемости внешних клеточных структур
- г) ремиссия

28. Местами естественного обитания продуцентов антибиотиков:

- а) почва
- б) воздух
- в) деревья
- г) проточная вода

29. Плесневые грибы как продуценты антибиотиков:

- а) одноклеточные эукариоты
- б) многоклеточные эукариоты
- в) одноклеточные прокариоты
- г) многоклеточные прокариоты

30. Клеточная стенка актиномицетов состоит из:

- а) хитина
- б) пептидогликана
- в) липооплисахаридов
- г) липопротеинов

Вариант 3

1. Механизмы мутуализма:

- а) обмен питательными веществами
- б) синтез токсических веществ
- в) поглощение незаменимых питательных веществ
- г) секреция ферментов, разрушающих полимеры клеточной стенки

2. Состояние системы, когда ни один из организмов не оказывает влияния на скорость роста другого микроорганизма, называется:

- а) нейтрализм
- б) мутуализм
- в) комменсализм
- г) аменсализм

3. Рост одного микроорганизма подавляется в присутствии другого – это:

- а) нейтрализм
- б) аменсализм
- в) комменсализм
- г) симбиоз

4. Bacillus входит в состав препарата:

- а) Флонивин БС
- б) Нормофлор
- в) Энтерол
- г) Бификол

5. Накопление биомассы культур Lactobacillus проводят на питательных средах на основе:

- а) казеина и желатина
- б) печеночного бульона, пептона и лактозы
- в) гидролизата молока, солодового экстракта, глюкозы
- г) мелассы и хлорида натрия

6. Эксплант – это:

- а) изолированные из растений фрагменты ткани
- б) фрагменты каллуса для субкультивирования
- в) часть суспензионной культуры для субкультивирования
- г) культура, возникающая из одной клетки

7. Тип питания культуры тканей растений:

- а) ауксотрофный
- б) хемогетеротрофный
- в) фотоавтотрофный
- г) хемолитотрофный

8. Из культуры какой клетки выделяют шиконин:

- а) Воробейника краснокорневого
- б) Табака курительного
- в) Женьшения
- г) Родиолы розовой

9. Из культуры какой клетки выделяют убихинон:

- а) Воробейника краснокорневого
- б) Табака курительного
- в) Женьшения
- г) Родиолы розовой

10. Из культуры какой клетки выделяют синтез панаксозидов:

- а) Воробейника краснокорневого
- б) Табака курительного
- в) Женьшения
- г) Родиолы розовой

11. Биологическая очистка сточных вод основана на:

- а) способности микроорганизмов к минерализации органических веществ
- б) химическом окислении органических веществ
- в) сжигании органических веществ в токе кислорода
- г) окислении органических веществ под действием хлора

12. Аппараты, в которых осуществляется деструкция органических загрязнений сточных вод, называются:

- а) усреднители
- б) отстойники
- в) аэротенки
- г) регенераторы

13. Правила GMP предусматривают производство в отдельных помещениях и на отдельном оборудовании:

- а) пенициллинов
- б) аминогликозидов
- в) тетрациклических
- г) макролидов
- д) полиенов

14. GLP регламентируют:

- а) лабораторные исследования
- б) планирование поисковых работ
- в) набор тестов при предклинических испытаниях
- г) методы математической обработки данных
- д) проведение валидации

15. При очистке промышленных стоков в «часы пик» применяют штаммы-деструкторы:

- а) природные микроорганизмы
- б) постоянные компоненты активного ила
- в) стабильные генно-инженерные штаммы
- г) не стабильные генно-инженерные штаммы

16. Цефалоспорин четвертого поколения, устойчивый к бета-лактамазам грамположительных бактерий:

- а) цефазолин
- б) цефтриаксон
- в) цефепим
- г) цепролекс

17. Пенициллиназа используется при:

- а) проверке заводских серий пенициллина на стерильность
- б) оценке эффективности пеницилловых структур против резистентных бактерий
- в) получении полусинтетических пенициллов
- г) снятии аллергических реакций на пенициллин

18 Свойство бета-лактамов, из-за которого их следует, согласно GMP, нарабатывать в отдельных помещениях:

- а) общая токсичность
- б) хроническая токсичность
- в) эмбриотоксичность
- г) аллергенность

19. Биосинтез антибиотиков, используемых как лекарственный вещества, усиливается и наступает раньше на средах:

- а) богатых источниками азота
- б) богатых источниками углерода
- в) богатых источниками фосфора
- г) бедных питательными веществами

20. С точки зрения биотехнологии антибиотики являются:

- а) первичными метаболитами
- б) аминокислотами
- в) ферментами
- г) вторичными метаболитами

21. Мультиферментный комплекс – это:

- а) комплекс ферментных белков, выделяемый из клетки путем экстракции и осаждения
- б) комплекс ферментов клеточной мембранны
- в) комплекс экзо- и эндопротеаз
- г) комплекс ферментов, катализирующих синтез первичного или вторичного метаболита

22. Лизоимадаза применяется для:

- а) улучшения процесса пищеварения
- б) очистки ран от гнойно-некротических масс
- в) лечения тромбозов
- г) снятия анафилактического шока

23. Методы иммобилизации:

- а) внутриклеточные
- б) физико-химические
- в) ферментативные
- г) химические

24. Препараты протеолитических ферментов:

- а) террилитин

- б) солизим
- в) стрептолиаза
- г) аспарагиназа

25. Пенициллиназа применяется с целью:

- а) лечения лейкемии
- б) лизиса некротических масс в ткани
- в) снятия анафилактического шока
- г) лечения гиперурекимии

26. Актиномицеты производят:

- а) стрептомицины
- б) витамины
- в) аминокислоты
- г) ферменты

27. Оптимальная температура для синтеза антибиотиков:

- а) выше 30° С
- б) 24-29° С
- в) 15-18° С
- г) 18-22° С

28. Интенсивному биосинтезу антибиотиков способствует:

- а) уменьшение в питательной среде источников углерода
- б) увеличение в питательной среде источников азота
- в) увеличение в питательной среде глюкозы
- г) увеличение в питательной среде источников фосфора

29. Побочные эффекты антибиотикотерапии:

- а) дисбактериоз
- б) ОРВИ
- в) переломы
- г) авитаминоз

30. Мишень для антибактериальных веществ в микробной клетке иначе называют:

- а) таргет
- б) промотор
- в) сайт
- г) экзон

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ:

Основная:

1. Биотехнология. Ю.О. Сазыкин, С.Н. Орехов, И.И. Чакалева – М.: «Академия», 2007. – С. 85-101, 182-191, 204-218.
2. Фармацевтическая биотехнология: Учебное пособие для студентов высших уч. заведений Прищеп Т.П., Чучалин В.С., Зайков К.Л., Михалева Л.К., Белова Л.С. Ростов-на-Дону Феникс Томск Издательство НТЛ Сибирский Государственный медицинский Университет, 2006. – 251 с.
3. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям: учеб. пособие / С.Н. Орехов ; под ред. В.А. Быкова, А.В. катлинского. – м.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – С. 123-142.
4. Лекция № 5-10.

5.Фармацевтическая биотехнология: руководство к практическим занятиям: учеб. пособие /. 2-е изд., перераб. и доп. С.Н. Орехов М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. – 432 с.

Дополнительная:

6. Терминологический словарь по биотехнологии

7. Биология: учеб.пособие / Г.Г. Чебышев ; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 416 с.

8.Микробиология, вирусология и иммунология: рук. к лаб. занятиям: учеб. пособие / В.С. Сбойчакова; – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 320 с.

9. Микробиология: учебник для студентов фармацевтических ВУЗов / А.А. Воробьев и др.; – М.: «Медицина», 2003. – 336 с.