

№ МПД-17

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра биологической химии

УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания Центрального
координационного учебно-методического совета
от «28» августа 2020 г. № 1

ЭТАЛОНЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

по дисциплине «Клиническая лабораторная диагностика»


основной профессиональной образовательной программы высшего образования -
программы специалитета по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело,
1 утвержденной 28.08.2020 г.

для студентов 4 курса

по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры
от «27» августа 2020 г. (протокол № 1)

Заведующая кафедрой

доцент 

А. Е. Турина

г. Владикавказ 2020 г

СТРУКТУРА ФОС

1. Титульный лист
2. Структура ФОС
3. Рецензия на ФОС
4. Паспорт фонда оценочных средств
5. Комплект оценочных средств:
 - перечень вопросов к модулям;
 - перечень вопросов к экзамену;
 - эталоны тестовых заданий (с титульным листом и оглавлением),

Паспорт фонда оценочных средств
По дисциплину «Клинической лабораторной диагностике»

№п/п	Наименование контролируемого раздела (темы) дисциплины/ модуля	Код формируемой компетенции (этапа)	Наименование оценочного средства
1	2	3	4
Вид контроля	Промежуточный контроль		
1.	Организация лабораторной службы. Контроль качества (КК) лабораторных исследований.	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-13	Тестовый контроль. Ситуационные задачи. Экзаменационные билеты по экзамену.
2.	Гематологические исследования.	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-13	Тестовый контроль. Ситуационные задачи. Экзаменационные билеты по экзамену.
3.	Общеклинические методы исследования.	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-13	Тестовый контроль. Ситуационные задачи. Экзаменационные билеты по экзамену.
4.	Лабораторная диагностика паразитарных болезней.	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-13	Тестовый контроль. Ситуационные задачи. Экзаменационные билеты по экзамену.
5.	Клиническая биохимия.	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-13	Тестовый контроль. Ситуационные задачи. Экзаменационные билеты по экзамену.
6.	Клиническая биохимия. Кислотно-щелочное равновесие.	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-13	Тестовый контроль. Ситуационные задачи. Экзаменационные билеты по экзамену.

7.	Коагулология	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-13	Тестовый контроль. Ситуационные задачи. Экзаменационные билеты по экзамену.
8.	Иммунологические исследования.	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-13	Тестовый контроль. Ситуационные задачи. Экзаменационные билеты по экзамену.
9.	ИФА исследования гормонов щитовидной железы. ИФА исследования гормонов половой сферы. ИФА исследования инфекций передающихся половым путем (ИППП).	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-13	Тестовый контроль. Ситуационные задачи. Экзаменационные билеты по экзамену.
10.	Цитологические исследования.	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-13	Тестовый контроль. Ситуационные задачи. Экзаменационные билеты по экзамену.
11.	Бактериологические исследования.	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-13	Тестовый контроль. Ситуационные задачи. Экзаменационные билеты по экзамену.
12.	Молекулярно-генетические методы исследований.	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-13	Тестовый контроль. Ситуационные задачи. Экзаменационные билеты по экзамену.

Перечень вопросов к модулям

Модуль по теме: Введение в клиническую лабораторную диагностику. Клинические исследования биологического материала.

1. Контроль качества в клинко-диагностической лаборатории.
Виды контроля качества.
2. Оснащение КДЛ. Основные виды анализаторов по каждому разделу лабораторных исследований.
3. Перечислите основные задачи клинко-диагностической лаборатории, и какой приказ отражает все положения о КДЛ?
4. Перечислите приказы санэпидрежима, на основании которых составлены инструкции по профилактике ВИЧ инфекции и гепатитов.
5. Как вы понимаете контроль правильности и что необходимо для его проведения?
6. Как вы понимаете контроль воспроизводимости, и что является необходимым условием для его проведения?
7. Для чего необходимо построение контрольной карты при проведении контроля качества?
8. Что отражает сходимост измерения при проведении контроля качества?
9. Морфология и функции клеток миелоидного ростка.
10. Морфология и функции клеток эритроидного ростка.
11. Общий анализ крови. Значение эритроцитарных индексов.
12. Клиническое значение гемограммы.
13. Лейкемоидные реакции крови (виды и отличие от лейкозов).
14. Лабораторные признаки железодефицитной анемии.
15. Гемолитические анемии.
16. Клиническое значение миелограммы.
17. Лейкоцитозы и лейкопении. Клиническое значение.
18. Морфология и функции клеток мегакариоцитарного ростка.
19. Анемии. Классификация по эритроцитарным индексам.
20. Гемограмма. Значение микроскопического исследования мазка периферической крови.
21. Микроскопия осадка мочи. Клиническое значение данного исследования.
22. Исследование мочи по Нечипоренко. Подсчет форменных элементов .

Модуль по теме: Лабораторные методы исследования выпотных жидкостей, мокроты, ликвора, дуоденального и кишечного содержимого. Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний и заболеваний половой сферы.

23. Дифференциальная диагностика выпотных жидкостей проводимых в лаборатории.
24. Какое исследование проводится в лаборатории, при подозрении на менингококковую инфекцию?
25. Какие правила приготовления препаратов крови при подозрении на малярийный плазмодий?
26. Как подсчитываются лейкоциты в ликворе?
27. Какие исследования проводят в лаборатории при подозрении на венерические заболевания?
28. Какое исследование мокроты проводят при подозрении на туберкулез?

Модуль по теме: Биохимические исследования

29. Дифференциальная диагностика билирубинемии.
30. Какие показатели липидного обмена являются наиболее важными в развитии атеросклероза.
31. Клиническое значение определения мочевины и креатинина.
32. Определение глюкозы в клинической практике.
33. Маркеры повреждения миокарда и их клиническое значение.
34. Дифференциальная диагностика повышения ферментов (АСТ и АЛТ).
35. Какое клиническое значение имеет увеличение активности щелочной фосфатазы?
36. Клиническое значение определения активности ЛДГ.

37.Транспорт железа в организме. Клиническое значение избытка и недостатка содержания железа в организме.

38.Клиническое значение нарушения обмена мочевой кислоты.

39.Клиническое значение определения общего белка в организме человека. Гиперпротеинемия и гипопропротеинемия.

40.Клиническое значение определения альбумина .

41.Клиническое значение определения глобулина.

Модуль по теме: Лабораторные методы исследования (кислотно-щелочное равновесие, гемостаз, иммунологические исследования.

42. Определение кислотно-щелочного равновесия как основа неотложных состояний.

43.Буферные системы крови.

44.Клиническое значение определения электролитов.

45. Метаболический ацидоз и его клиническое значение.

46.Метаболический алкалоз и его клиническое значение.

47.Дыхательный ацидоз и его клиническое значение.

48.Дыхательный алкалоз и его клиническое значение.

49.Приобретенные нарушения тромбоцитарного звена (тромбоцитопении).

50.Плазменные белки гемостаза.

51.Система фибринолиза

52.Тесты, проводимые в КДЛ для оценки сосудистого и тромбоцитарного компонентов.

53.К какому гемостазу принадлежит адгезивно-агрегационная функция?

54.Каким методом в лаборатории определяют групповую принадлежность крови?

55.Какая реакция лежит в основе определения группы крови?

56.Тесты, проводимые в КДЛ для оценки плазменного гемостаза.

57.Вторичные комплексные нарушения гемостаза.

58.Что может послужить причиной развития ДВС- синдрома?

59.Диагностика ревматических состояний

60.Диагностика антифосфолипидного синдрома.

Модуль по теме: Методы лабораторных исследований (иммуноферментный анализ, цитологические исследования, бактериологические исследования, молекулярно-генетические исследования).

61.Тиреоидные гормоны и их клиническое значение.

62.ИФА диагностика гормонов половой сферы и их клиническое значение.

63.Перечислите функции центральных органов иммунной системы.

64.Иммунологические исследования и их значение в клинической практике.

65.Плазматические клетки и их роль в иммунном ответе.

66.Какой метод используют для определения в крови популяции В-лимфоцитов?

67.Что можно определить при исследовании субпопуляционного состава лимфоцитов?

68.ИФА диагностика вирусных гепатитов.

69. Методы полимеразной цепной реакции в клинической практике.

70.Скрининг мутаций методом ПЦР.

71.Клеточный иммунитет. Роль лимфоцитов в иммунном ответе.

72.Гуморальный иммунитет. Определение иммуноглобулинов и их клиническое значение.

Перечень вопросов к экзамену

1. Основные регламентирующие приказы клинико-диагностической службы.
2. Виды контроля качества в КДЛ. Контрольные материалы, применяемые при проведении контроля качества.
3. Оснащение КДЛ. Основная аппаратура, используемая в клинической лаборатории;
4. Основные принципы костно - мозгового кроветворения. Краткая характеристика миелоидного, эритроидного и тромбоцитарного ростков кроветворения.
5. Контроль качества в клинико-диагностической лаборатории.
6. Морфология и функции клеток миелоидного ростка.
7. Морфология и функции клеток эритроидного ростка.
8. Общий анализ крови. Значение эритроцитарных индексов.
9. Клиническое значение гемограммы.
10. Лейкемоидные реакции крови (виды и отличие от лейкозов).
11. Лабораторные признаки железодефицитной анемии.
12. Гемолитические анемии.
13. Клиническое значение миелограммы.
14. Лейкоцитозы и лейкопении. Клиническое значение.
15. Морфология и функции клеток мегакариоцитарного ростка.
16. Гематологические исследования. Значение общего анализа крови в клинике.
17. Изменения крови при анемиях. Морфология эритроцитов. Подсчет ретикулоцитов.
18. Гемограмма. Подсчет лейкоформулы и клиническое значение.
19. Лейкемоидные реакции крови. Дифференциальная диагностика с острыми лейкозами.
20. Клинический анализ мочи. Микроскопия осадка мочи.
21. Исследования мочи по Нечипоренко. Клиническое значение данного исследования.
22. Исследование выпотных жидкостей. Определение физических, химических свойств.
23. Исследование выпотных жидкостей. Микроскопическое исследование.
24. Исследование дуоденального содержимого. Определение физических, химических свойств и микроскопическое исследование.
25. Определение физических, химических свойств и микроскопическое исследование кала.
26. Исследование ликвора. Определение физических свойств. Понятие цитоза.
27. Клинико-диагностическое значение микроскопического исследования ликвора.
28. Правила приготовления препаратов для исследования морфологии паразитов. Исследование на малярийный плазмодий.
29. Дифференциальная диагностика билирубинемии.
30. Какие показатели липидного обмена являются наиболее важными в развитии атеросклероза.
31. Клиническое значение определения мочевины и креатинина.
32. Определение глюкозы в клинической практике.
33. Маркеры повреждения миокарда и их клиническое значение.
34. Белковый обмен. Клинико-диагностическое значение определения мочевины и креатинина. Методы определения в КДЛ.
35. Клинико-диагностическое значение определения аминотрансфераз. Методы определения в КДЛ.
36. Клинико-диагностическое значение определения липидов и липопротеинов. Методы определения в КДЛ.
37. Клинико-диагностическое значение холестерина. Методы определения в КДЛ.
38. Определение кислотно-щелочного равновесия как основа неотложных состояний.
39. Клиническое значение определения электролитов.

40. Буферные системы крови.
41. Лабораторные методы исследования кислотно-щелочного равновесия
42. Метаболический ацидоз и его клиническое значение.
43. Метаболический алкалоз и его клиническое значение.
44. Дыхательный ацидоз и его клиническое значение.
45. Дыхательный алкалоз и его клиническое значение.
46. Гемостаз. Общее представление о гемостатическом балансе.
47. Современная теория свертывания крови.
48. Тесты, проводимые в КДЛ для оценки сосудистого и тромбоцитарного компонентов.
49. Компоненты системы свертывания. Внешний и внутренний путь свертывания крови.
50. Лабораторные методы оценки процессов свертывания.
51. Лабораторные методы оценки процессов фибринолиза.
52. Клинико-диагностическое значение гипо- и гиперкоагуляции.
53. Контроль за лечением антикоагулянтами прямого и непрямого действия.
54. Приобретенные нарушения тромбоцитарного звена (тромбоцитопении).
55. Плазменные белки гемостаза.
56. Система фибринолиза.
57. Коагулограмма и клиническое значение.
58. Тесты, проводимые в КДЛ для оценки плазменного гемостаза.
59. Вторичные комплексные нарушения гемостаза.
60. Ингибиторы системы свертывания плазмы.
61. Активаторы системы свертывания плазмы.
62. Клеточный иммунитет. Роль лимфоцитов в иммунном ответе.
63. Гуморальный иммунитет. Определение иммуноглобулинов и их клиническое значение.
64. Основные функции иммунной системы.
65. Методы иммуноферментного анализа.
66. ИФА исследования гормонов щитовидной железы.
67. ИФА исследования гормонов половой сферы.
68. ИФА исследования вирусных гепатитов.
69. Цитологические исследования. Описание морфологии клеточных элементов.
70. Цитограмма органов и тканей в норме. Общее представление о морфологии клеточных элементов при цитологическом исследовании.
71. Цитограмма органов и тканей при патологии. Общее представление о морфологии клеточных элементов при цитологическом исследовании.
72. Методы бактериологических исследований. Принцип работы при выполнении бактериологических исследований.
73. Этапы бактериологического исследования.
74. Методы молекулярно-генетического исследования. Принцип работы при выполнении молекулярно-генетического анализа.
75. Этапы проведения ПЦР анализа.

№ МПД-17

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра биологической химии

УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания Центрального
координационного учебно-методического совета
от «28» августа 2020 г. №1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Клиническая лабораторная диагностика»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования -
программы специалитета по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело,


утвержденной 28.08.2020 г.

для студентов 4 курса

по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры
от «27» августа 2020 г. (протокол № 1)

Заведующая кафедрой

доцент  А. Е. Гурина

г. Владикавказ 2020 г.

Оглавление

№п/п	Наименование контролируемого раздела дисциплины/ практики	Количество тестов (всего)	Код формируемых компетенций	Стр. с__по__
1	2	3	4	5
Вид контроля	Промежуточный контроль			
1.	Организация лабораторной службы. Контроль качества (КК) лабораторных исследований.	25	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-1	с 12 по 15
2.	Гематологические исследования.	25	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-1	с 16 по 20
3.	Общеклинические методы исследования.	30	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-1	с 20 по 25
4.	Лабораторная диагностика паразитарных болезней.	10	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-1	с 25 по 26
5.	Клиническая биохимия.	25	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-1	с 26 по 30
6.	Клиническая биохимия. Кисотно-щелочное равновесие.	10	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-1	с 30 по 32
7.	Коагулология	15	ОПК-5 ПК-2 ПК-11	с 32 по 34

			ПК-12 ПК-1	
8	Иммунологические исследования.	25	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-1	с 34 по 37
9	ИФА исследования гормонов щитовидной железы. ИФА исследования гормонов половой сферы. ИФА исследования инфекций передающихся половым путем (ИППП).	10	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-1	с 38 по 39
10	Цитологические исследования.	10	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-1	с 39 по 40
11	Бактериологические исследования.	10	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-1	с 40 по 42
12	Молекулярно-генетические методы исследований.	10	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-1	с 42 по 43
	Итоговый тестовый контроль	200	ОПК-5 ПК-2 ПК-11 ПК-12 ПК-1	с 43 по 68

ТЕКУЩИЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ №1 «Основы организации здравоохранения и лабораторной службы».

ВАРИАНТ №1

1. На результаты анализа могут повлиять следующие факторы внелабораторного характера:

- А) Физическое и эмоциональное напряжение больного
- Б) Циркадные ритмы, влияние климата
- В) Положение тела
- Г) Прием медикаментов
- Д) Все перечисленное

2. В сопроводительном бланке к материалу, поступающему в лабораторию, должно быть указано следующее, кроме:

- А) ФИО больного (№ истории болезни)
- Б) Вид исследования

В) Предполагаемый диагноз

- Г) Фамилия лечащего врача
- Д) Метод исследования

3. Основными задачами клинико-диагностической лаборатории являются:

- А) Обеспечение клинических лабораторных исследований в соответствии с профилем ЛПУ
- Б) Внедрение прогрессивных форм работы, новых методов
- В) Оказание консультативной помощи врачам лечебных отделений в трактовке лабораторных данных
- Г) Повышение квалификации персонала лаборатории
- Д) Проведение мероприятий по охране труда персонала, соблюдение техники безопасности

Е) Все перечисленное верно

4. Внешний контроль качества-это

- А) Метрологический контроль
- Б) Контроль использования методов исследования разными лабораториями
- В) Система мер, призванных оценить метод
- Г) Система объективной проверки результатов лабораторных исследований разных лабораторий
- Д) Все перечисленное верно

5. ВнутрILAбораторный контроль качества-это

- А) Выявление и устранение недопустимых аналитических ошибок.
- Б) Оценка сходимости результатов измерения.
- В) Оценка воспроизводимости и правильности результатов измерений, построение контрольных карт.

Г) Проведение оперативного контроля качества результатов лабораторных исследований в каждой аналитической серии.

Д) Все перечисленное верно

ВАРИАНТ №2

1.) НА РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА МОГУТ ПОВЛИЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВНЕЛАБОРАТОРНЫЕ ФАКТОРЫ:

А. Физическое и эмоциональное напряжение больного

Б. Циркадные ритмы, влияние климата

В. Положение тела

Г. Прием медикаментов

Д. Все перечисленное

2.) ДЕЙСТВИЕ, ПРЕДПРИНИМАЕМОЕ ПРИ ВЫХОДЕ МЕТОДА ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ:

А. Просмотреть лабораторный журнал

Б. Закупить новые контрольные материалы и калибраторы

В. Задержать выполнение анализов, найти причину неправильных результатов

Г. Нанести на контрольную карту все пометки, связанные с возникшей ошибкой

Д. Все, указанное выше

3.) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАКОГО ИЗ АНАЛИЗОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕ 12-ЧАСОВОГО ВОЗДЕРЖАНИЯ ОТ ПРИЕМА ПИЩИ:

А. Триглицериды, холестерин

Б. Общий анализ крови

В. Общий белок

Г. Ферменты сыворотки (ЩФ, α-амилаза)

Д. Глюкоза

4.) СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ВНУТРИЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА:

А. Карта Шухарта

Б. По ежедневным средним

В. Кумулятивных сумм

Г. По дубликатам

Д. Все перечисленные

5.) ИСТОЧНИКАМИ ОШИБОК ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОЭ МОГУТ СЛУЖИТЬ:

А. Неправильное соотношение между цитратом натрия и кровью

Б. Образование сгустка

В. Косое положение капилляра

Г. Несоблюдение температурного режима

Д. Все перечисленное

ВАРИАНТ №3

1.) В СОПРОВОДИТЕЛЬНОМ БЛАНКЕ К МАТЕРИАЛУ, ПОСТУПАЮЩЕМУ В ЛАБОРАТОРИЮ, ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО СЛЕДУЮЩЕЕ, КРОМЕ:

А. Фамилия И.О. больного

Б. №истории болезни

В. Вид исследования

Г. Фамилия лечащего врача

Д. Метод исследования

2.) ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА:

- А. Анализ контрольных проб проводится отдельно от анализируемых проб
- Б. Анализ контрольных проб проводится заведующим лабораторией
- В. Анализ контрольных проб включается в обычный ход работы лаборатории

Г. Проводится любым лаборантом

Д. Все перечисленное верно

3.) НА РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА МОГУТ ПОВЛИЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ВНУТРИЛАБОРАТОРНОГО ХАРАКТЕРА:

А. Условия хранения пробы

Б. Гемолиз, липемия

В. Выбор антикоагулянта

Г. Используемые методы

Д. Все перечисленное

4.) ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА -ЭТО:

А. Метрологический контроль

Б. Контроль использования методов исследования разными лабораториями

В. Система мер, призванных оценить метод

Г. Система объективной проверки результатов лабораторных исследований разных лабораторий

Д. Все перечисленное неверно

5.) ПРИ РАБОТЕ В КДЛ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ НА СТОЛАХ:

А. Нефиксированные мазки

Б. Чашки Петри, пробирки и др. посуду с инфекционным материалом

В. Метиловый спирт

Г. Все перечисленное

ВАРИАНТ №4

Продолжите ответ.

1. Основными задачами КДЛ являются:

2. КДЛ осуществляет:

3. КДЛ имеет право:

4. Основное оборудование КДЛ:

5. Вспомогательное оборудование КДЛ:

ВАРИАНТ №5

1. Подберите правильный ответ

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Приказ № 380 | А. Положение о КДЛ. |
| 2. Приказ № 408 | Б. Санэпидрежим в КДЛ |
| 3. Приказ №720 | |

Ответ: 1-Б; 2-А; 3-Б; 1-А; 3А.

2. Подберите правильный ответ

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Приказ № 380 | А. Положение о КДЛ. |
| 2. Приказ №220 | Б. Качество лабораторных исследований |
| 3. Приказ №45 | В. Внутрिलाбораторный контроль качества |
| 4. Приказ №9 | Г. Внешний контроль качества |

Ответ: 1-Б; 2-В; 3-Г; 3-Б; 1-А; 4-Б; 4-Г.

3. Подберите правильный ответ

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1. $\bar{x}$ | А. Средняя арифметическая |
| 2. s | Б. Коэффициент вариации |
| 3. σ | В. Абсолютная величина |
| 4. SD | Г. Стандартное отклонение |
| 5. CV | |

Ответ: 1-Г; 5-А; 4-Г; 3-Г; 5-Б; 1-А; 2-В; 3-Б.

4. Подберите правильный ответ

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. Гемоглобин | А. Гематологический анализатор |
| 2. Липидный спектр | Б. Биохимический анализатор |
| 3. Глюкоза | В. Коагулометр |

Г. Микроскоп

5. Протромбин

ОТВЕТ: 1-А; 4-А; 5-В; 1-А; 3-Б; 2-Б.

5. Подберите правильный ответ

1.Вспомогательное оборудование КДЛ

А.Анализаторы, дозаторы,
микроскоп.

2. Основное оборудование КДЛ

Б.Урометр, дистиллятор,
минишейкер.

ОТВЕТ: 1-А; 2-Б; 1-Б; 2-А.

ТЕКУЩИЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ №2 «Клинические исследования. Гематология».

ВАРИАНТ №1

1. Источниками ошибок при определении СОЭ могут служить:

A. Неправильное соотношение между цитратом натрия и кровью

В. Образование сгустка

С. Косое положение капилляра

D. Несоблюдение температурного режима

Е. Все перечисленное

2. Увеличение количеств ретикулоцитов имеет место при:

А. Апластической анемии

Б. В-12-дефицитной анемии

В. Гемолитических синдромах

Г. Метастазах рака в костный мозг

Д. Анемии при хронических болезнях

3. Значения среднего объема эритроцитов (MCV) и цветового показателя увеличены при:

А. Железодефицитной анемии

Б. Анемии при хронических болезнях

В. Мегалобластных анемиях

Г. Талассемии

Д. Гемоглобинопатиях

4.Молекула гемоглобина состоит из:

А. Протопорфирина и железа

Б. Порфирина и железа

В. Гема и глобина

Г. Глобина и железа

Д. Протопорфирина и глобина

5.Нейтропения характерна для всех ситуаций, кроме:

А. Апластической анемии

- Б. В-12-дефицитной анемии
- В. Лечения цитостатиками
- Г. Вирусных инфекций
- Д. Острого воспаления

ВАРИАНТ №2

1.) ПОД "ОТНОСИТЕЛЬНЫМ НЕЙТРОФИЛЕЗОМ" ПОНИМАЮТ:

- А. Увеличение процентного содержания нейтрофилов, но нормальное их абсолютное число
- Б. Увеличение процентного и абсолютного содержания нейтрофилов
- В. Увеличение процентного содержания нейтрофилов
- Г. Увеличение их абсолютного числа
- Д. Уменьшение процентного содержания лимфоцитов

2.) УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ЭРИТРОЦИТОВ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ:

- А. У новорожденных в первые сутки
- Б. При рвоте или ожогах
- В. У курильщиков
- Г. При лихорадке
- Д. При спленомегалии

3.) НИЗКИЕ ЗНАЧЕНИЯ MCV И ЦВЕТОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ:

- А. Свинцовой интоксикации
- Б. Железодефицитной анемии
- В. Пароксизмальной ночной гемоглобинурии
- Г. Анемии при хронических болезнях
- Д. Всех перечисленных заболеваний

4.) ЭРИТРЕМИИ НЕ СВОЙСТВЕННО:

- А. Низкая СОЭ
- Б. Высокая СОЭ
- В. Повышение вязкости крови
- Г. Нейтрофильный лейкоцитоз
- В Эритроцитоз

5.) АНИЗОЦИТОЗ - ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ:

- А. Формы эритроцитов
- Б. Количества эритроцитов
- В. Величины эритроцитов
- Г. Всех перечисленных параметров
- Д. Содержания гемоглобина в эритроците

ВАРИАНТ №3

1. БЛАСТНЫЕ КЛЕТКИ ИМЕЮТ:

- А. Нежносетчатое строение хроматина
- Б. Большое ядро
- В. Базофильную цитоплазму
- Г. Нуклеолы
- Д. Все перечисленное

2.) ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ И

АНЕМИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЯХ НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

- А. Сывороточного железа и ОЖСС
- Б. Трансферрина
- В. Эритроцитарных индексов
- Г. Ферритина
- Д. Ретикулоцитов

3.) ПОНЯТИЮ "МАКРОФАГ" ОТВЕЧАЕТ СЛЕДУЮЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

- А. Беззернистые клетки крови, ядро лапчатое, неопределенной формы
- Б. Зернистые клетки крови, способные захватывать бактерии
- В. Мононуклеарный фагоцит, способный захватывать и переваривать инородные частицы и микробы
- Г. Клетки крови, способные захватывать лейкоциты
- Д. Все перечисленное

4.) КАКОЙ ИЗ ПРИЗНАКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩИМ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ И ТАЛАССЕМии:

- А. Гипохромия и микроцитоз эритроцитов
- Б. Наличие эритрокариоцитов (нормобластоз) в крови
- В. Ретикулоцитоз выше 2%
- Г. Гипербилирубинемия, желтушность кожных покровов
- Д. Базофильная пунктация и мишеневидность эритроцитов

5.) ГЕМОГРАММА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЛИМФОЛЕЙКОЗЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ПРИЗНАКАМИ, КРОМЕ:

- А. Абсолютный лимфоцитоз
- Б. Относительная нейтропения
- В. Нейтрофилез
- Г. Клетки цитолиза
- Д. Нормохромная анемия

ВАРИАНТ №4

Дайте характеристику росткам кроветворения

1. Эритропоэз^

2. Гранулоцитопоэз

3. Моноцитопоэз

4. Мегакариоцитопоэз

5. Лимфоцитопоз

ВАРИАНТ №5

1.Подберите правильный ответ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1.Норма гемоглобина у женщин | А. 130-160 г/л |
| 2.Норма гемоглобина у мужчин | Б. 120-140 г/л |
| 3.Норма лейкоцитов у взрослых | В. Снижение гемоглобина |
| 4.Эритроцитарные индексы | Г. Острый лейкоз |
| 5. Анемия | Д. Опухоль кроветворной ткани |
| 6.Эритремия | Е. $4-9 \times 10^9/\text{л}$ |
| 7.Бласты | Ж. Появление миелоцитов, юных
увеличение п/яд. сегментов |
| 8.Сдвиг влево | З. Среднее содержание
гемоглобина в эритроците, средняя
концентрация гемоглобина в эритроците. |

Ответ: 1-А; 2-А; 1-Б; 3-Е; 4-Е; 5-Д; 7-Д; 8-З; 6-Д; 7-Г; 8-Ж; 4-З; 5-В.

2.Подберите правильный ответ

- | | |
|--------|--|
| 1.MCV | А. Среднее содержание гемоглобина в эритроците |
| 2.MCH | Б. Количество тромбоцитов |
| 3.MCHC | В. Средняя концентрация гемоглобина в эритроците |
| 4.RDW | Г. Средний объем эритроцита |
| 5.PLT | Д. Показатель анизоцитоза |
- Ответ: 1-Г; 5-А; 4-Д; 3-А; 5-Б; 1-А; 3-В; 3-Б; 2-А.

3. Подберите правильный ответ

- | | |
|-------------------|--|
| 1.Миелобласты | А. Это молодые клетки миелоидного ростка |
| 2.Нормобласты | Б. Ядросодержащие эритроциты |
| 3.Миелокариоциты | В. Клетки костного мозга |
| 4.Миелограмма | Г. Подсчет клеток к/м |
| 5.Эритрокариоциты | Д. Клетки эритроидного ростка. |

Ответ: 1-В; 5-А; 2-В; 4-Д; 3-А; 4-Г; 1-А; 3-В; 2-Б; 5-Д.

4.Подберите правильный ответ

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1.Норма бластных клеток в к/м | А. 2,1-4,5 |
| 2. Норма ИСН | Б. 0,1-1,1 |

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 3. Норма эозинофилов в к/м | В. 0,5-5,8 |
| 4. % эритрокариоцитов в к/м | Г. 0,5-0,9 |
| 5. Норма Л/Э | Д. 7,0-12,2 |
| 6. % миелоцитов в к/м | Е. 14,5-26,5 |

Ответ: 1-А; 2-Г; 1-Б; 3-В; 4-Е; 5-А; 6-Е; 4-Д; 5-В; 6Д.

5. Подберите правильный ответ

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Увеличение количества бластов имеет место при - | А. Острых лейкозах |
| 2. Мегалобластический тип кроветворения при: | Б. Мегалобластных анемиях имеет место |
| 3. Увеличение количества эритроцитов бывает при: | В. Эритремии |
| 4. Ретикулоцитоз свойственен: | Г. Гемолитической анемии. |

Ответ: 1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г, 3-Г, 4-Б.

ТЕКУЩИЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ №3.

«Клинические исследования (моча, выпотные жидкости, ликвор, мокрота, желудочное содержимое, дуоденальное содержимое, состав панкреатического и кишечного содержимого. Краткая характеристика клинической картины сифилиса, гонореи и трихомониаза)».

ВАРИАНТ №1

1. Определение относительной плотности мочи дает представление о:

- А. Выделительной функции почек
- Б. Концентрационной функции
- В. Фильтрационной функции
- . Всех перечисленных функциях

2. Зеленый цвет желчи в порции В обусловлен:

- А. Воспалением желчного пузыря и окислением билирубина в биливердин

- Б. Гемолитической желтухой
- В. Циррозом печени
- Г. Железодефицитной анемией

Нормальное содержание белка в ликворе:

- А. 0,033-0,1 г/л
- Б. Выше 0,5г/л
- В. 0,2-0,3г/л
- Г. 0,3-0,5г/л
- Д. Полностью отсутствует

4. Количество белка в экссудате:

- А. 5 - 10 г/л
- Б. 5 - 25 г/л
- В. 25 - 30 г/л
- Г. 30 г/л и выше

5. Эозинофилия в мокроте характерна для:

- А. Бронхиальной астмы
- Б. Острого бронхита
- В. Хронического бронхита
- Г. Туберкулеза легких

ВАРИАНТ №2

1.) В состав желудочного сока входят:

- А. Соляная кислота
- Б. пищеварительные ферменты
- В. Слизь
- Г. Все ответы правильные
- Д. Правильного ответа нет

2.) Для бронхиальной астмы в мокроте характерны:

- А. Спираль Куршмана
- Б. Кристаллы Шарко-Лейдена
- В. Скопления эозинофилов
- Г. Все ответы правильные
- Д. Правильного ответа нет

3.) Нормальной считается реакция кала:

- А. Кислая
- Б. Щелочная
- В. Резкощелочная

- Г. Нейтральная
- Д. Правильного ответа нет

4.) Протеинурия может быть показателем поражения:

- А. Клубочков почек
- Б. Канальцев почек
- В. Мочевыводящих путей
- Г. Организма
- Д. Всего перечисленного

5.) Уровень глюкозы в ликворе снижается:

- А. Опухолях мозга
- Б. Травмах мозга
- В. Менингитах
- Г. Всех перечисленных заболеваниях
- Д. Не меняется никогда

ВАРИАНТ №3

1.) В ДУОДЕНАЛЬНОМ СОДЕРЖИМОМ МОГУТ БЫТЬ ВЕГЕТАТИВНЫЕ ФОРМЫ ЖГУТИКОВЫХ РОДА:

- А. Trichomonas
- Б. Chylomastics
- В. Lamblia
- Г. Все перечисленные
- Д. Нет правильного ответа

2.) К ТЕТРАДЕ ЭРЛИХА ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ОТНОСЯТСЯ:

- А. Кристаллы холестерина
- Б. Обызвествленный детрит
- В. Микобактерии туберкулеза
- Г. Обызвествленные эластические волокна
- Д. Все перечисленные элементы

3.) СОЛЯНАЯ КИСЛОТА ОКАЗЫВАЕТ В ЖЕЛУДКЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

- А. Подготавливает к расщеплению перевариваемую растительную клетчатку
- Б. Подготавливает белки пищи к протеолизу (в т.ч. мышечные волокна)
- В. Оказывает бактерицидное действие
- Г. Активирует пепсиноген
- Д. Все перечисленное

4.) ПОСТРЕНАЛЬНАЯ ПРОТЕИНУРИЯ ОБУСЛОВЛЕНА:

- А. Прохождением через неповрежденный почечный фильтр белков низкой молекулярной массы
- Б. Фильтрацией нормальных плазменных белков через поврежденный почечный фильтр
- В. Нарушением реабсорбции белка в проксимальных канальцах
- Г. Попаданием воспалительного экссудата в мочу при заболевании мочевыводящих путей
- Д. Всеми перечисленными факторами

5.) К ЭЛЕМЕНТАМ ОСАДКА МОЧИ ТОЛЬКО ПОЧЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ:

- А. Эритроциты
- Б. Лейкоциты

- В. Цилиндры
- Г. Плоский эпителий
- Д. Все перечисленное

ВАРИАНТ №4

1.Гонококковая инфекция не поражает:

- А.Уретру
- Б. Шейку матки
- В. Тонкий кишечник
- Г. Толстый кишечник
- Д. Конъюнктиву глаза

2.Идентификация гонококков основывается на следующих признаках, кроме:

- А.Парности кокков
- Б. Грамотрицательности
- В.Грамположительности
- Г. Внутриклеточного расположения
- Д. Бобовидной формы

3. Наиболее доступны для поражения гонококками слизистые оболочки, выстланные:

- А.Многослойным плоским неороговевающим эпителием
- Б. Многослойным плоским ороговевающим эпителием
- В..Переходным эпителием
- Г. Однослойным цилиндрическим эпителием
- Д. Кубическим эпителием

4.При обследовании на гонорею женщин взятие отделяемого для бактериологического анализа проводится из всех очагов, кроме:

- А. Уретры
- Б. Парауретральных и бартолиновых желез
- В. Прямой кишки
- Г. Заднего свода влагалища
- Д. Цервикального канала

5.Основные причины дисбактериоза влагалища:

- А. Нарушение гормональной регуляции
- Б. Наличие инфекционных процессов
- В. Иммунодефицитные состояния
- Г. Использование медикаментозной терапии (гормоны, антибиотики)
- Д. Все ответы правильные

ВАРИАНТ №5

Допишите определения:

Ксантохромия -

Гиперпротеинария-

Гипогликоархия -

Плеоцитоз -

Основными соединения, образующие кристаллы в моче:

В организованном осадке мочи различают клетки

Транссудат - это

Экссудат - это

ВАРИАНТ №6

1.Подберите правильный ответ

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1.Норма лейкоцитов в моче у женщин | А. 1-2-0 в п/зр |
| 2.Норма лейкоцитов в моче у мужчин | Б. 0,002 г/л |
| 3.Норма белка в моче | В. 2-1-4 в п/зр |
| 4.Норма эритроцитов в моче | Г. 0-1-0 в пз/зр |

Ответ: 1-А; 2-В; 4А; 3-Б; 2-А; 1-В; 4Г;

2.Подберите правильный ответ

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| 1.Уробилиноиды | А. Наличие желчных пигментов в моче |
| 2.Глюкозурия | Б. Наличие глюкозы в моче |
| 3.Протеинурия | В. Увеличение белка в моче |

4.Гематурия

Г. Эритроциты в моче

Ответ: 1-В; 2-Б; 4А; 3-В;1-В; 4-Г; 1-А.

3.Подберите правильный ответ

- 1.Цвет дуоденального содержимого (порция А) А. Оливковый
- 2.Цвет дуоденального содержимого (порция В) Б. 15-45 мл
- 3.Количество (порция А) В. Золотистый
- 4.Количество (порция В) Г. 20-50 мл
- 5.Количество (порция А1) Д. 3-5 мл

Ответ: 1-А; 3-Г; 4-Б; 2-А; 3-Б; 3-Д; 5-Д; 2-В; 4-Г; 1-В; 5-Б.

4.Подберите правильный ответ

- 1.Рн мокроты в норме А. 5,5-6,5
- 2.Характер мокроты в норме Б. 7,5-8,0
- 3.Консистенция мокроты в норме В. Жидкая
- 4.Консистенция мокроты при бронхите Г. Вязкая
- 5.Характер мокроты при бронхите Д. Слизистый
- 6.Рн мокроты при бронхите Е. Слизисто-гнойный

Ответ: 1-А; 2-Д; 3-В; 4-Г; 5-Д; 6-Б; 2-Г; 4-В; 6-А; 1-А; 5-Е.

5.Подберите правильный ответ

- 1.Креаторея А. Появление мышечных волокон в кале
- 2.Стеаторея Б. Повышение содержания жира в кале
- 3.Китаринорея В. Повышение содержания клетчатки в кале

Ответ: 1-А; 3-А; 2-Б;3-В;1-В; 3-В.

ТЕКУЩИЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ №4.

Клинические исследования (общие принципы паразитарных заболеваний, нематоды, цестоды, трематоды; виды простейших, обитающих в желудочно-кишечном тракте человека; виды малярийных плазмодиев, паразитирующих у человека)».

ВАРИАНТ№1

1. Любая особь малярийного паразита обладает:

- А. Цитоплазмой и ядром
- Г. Вакуолью и цитоплазмой
- Б. Пигментом и зернистостью
- Д. Правильного ответа нет
- В. Псевдоподиями

2. Определение видов малярийного плазмодия необходимо для:

- А. Назначения схемы лечения
- Б. Проведения противоэпидемических мероприятий
- В. Прогноза в отношении возможности излечения
- Г. Прогноза в отношении смертельного исхода
- Д. Всего перечисленного

3. В дуоденальном содержимом могут быть вегетативные формы жгутиковых рода:

- А. Trichomonas
- Б. Lamblia
- В. Chylomastics
- Г. Все перечисленное
- Д. Нет правильного ответа

4. В слизисто-кровянистых выделениях больного с амебиазом можно обнаружить:

- А. Цисты
- Б. Споры
- В. Гематофаги
- Г. Полифаги
- Д. Нет правильного ответа

5. Кровь у пациента для исследования на малярию следует брать:

- А. Во время озноба
- Б. Во время жара
- В. В период потоотделения
- Г. В межприступный период
- Д. В любое время вне зависимости от приступа

ВАРИАНТ №2

1.) В ДУОДЕНАЛЬНОМ СОДЕРЖИМОМ МОГУТ БЫТЬ ВЕГЕТАТИВНЫЕ ФОРМЫ ЖГУТИКОВЫХ РОДА:

- А. Trichomonas
- Б. Chylomastics
- В. Lamblia
- Г. Все перечисленные
- Д. Нет правильного ответа

2.) ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ДУОДЕНАЛЬНОГО СОДЕРЖИМОГО МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ЯЙЦА СЛЕДУЮЩИХ ГЕЛЬМИНТОВ:

- А. Описорха
- Б. Дикроцелия
- В. Клонорха
- Г. Всех перечисленных
- Д. Фасциолы

3.) У РЕБЕНКА В КАЛЕ ОБНАРУЖЕНЫ ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ БЕСЦВЕТНЫЕ, ПРОЗРАЧНЫЕ ЯЙЦА С ДВУХКОНТУРНОЙ ОБОЛОЧКОЙ. МЕЖДУ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКОЙ ВИДНЫ ИЗВИВАЮЩИЕСЯ НИТИ-ФИЛАМЕНТЫ. В ЦЕНТРЕ РАСПОЛОЖЕНЫ 3 ПАРЫ КРЮЧЬЕВ. ОБНАРУЖЕННЫЕ ЯЙЦА ОТНОСЯТСЯ К:

- А. Аскариде
- Б. Карликовому цепню
- В. Власоглаву
- Г. Бычьему цепню
- Д. Все перечисленное верно

4.) У РЕБЕНКА В КАЛЕ ОБНАРУЖЕНЫ ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ БЕСЦВЕТНЫЕ,

ПРОЗРАЧНЫЕ ЯЙЦА С ДВУХКОНТУРНОЙ ОБОЛОЧКОЙ. МЕЖДУ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКОЙ ВИДНЫ ИЗВИВАЮЩИЕСЯ НИТИ-ФИЛАМЕНТЫ. В ЦЕНТРЕ РАСПОЛОЖЕНЫ 3 ПАРЫ КРЮЧЬЕВ. ОБНАРУЖЕННЫЕ ЯЙЦА ОТНОСЯТСЯ К:

- А. Аскариде
- Б. Власоглаву
- В. Бычьему цепню
- Г. Карликовому цепню

5.) БОЛЬНОЙ ОБРАТИЛСЯ К ВРАЧУ С ЖАЛОБАМИ НА ПОСТОЯННОЕ ОТХОЖДЕНИЕ ЧЛЕНИКОВ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛЗАЮТ ИЗ КИШЕЧНИКА ПО НЕСКОЛЬКО ШТУК В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ, НЕЗАВИСИМО ОТ АКТА ДЕФЕКАЦИИ. МОЖНО ДУМАТЬ О:

- А. Дифиллоботриозе
- Б. Тениаринхозе
- В. Тениозе
- Г. Все перечисленное верно
- Д. Гименолепидозе

ТЕКУЩИЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ №5

«Биохимические методы исследования (белковый обмен, углеводный обмен, ферменты)».

ВАРИАНТ №1

1. Основным признаком сахарного диабета типа 1 является:

- А. Отсутствие гипогликемического эффекта на введение инсулина
- Б. Ожирение
- В. Аутоиммунная деструкция инсулярного аппарата
- Г. Системные ангиопатии
- Д. Нарушение взаимодействия инсулина с рецепторами клетки

2. Основным признаком сахарного диабета типа 2 является:

- А. Нарушение взаимодействия инсулина с клетками инсулинзависимых тканей
- Б. Кетоацидоз
- В. Ожирение
- Г. Поражение бета-клеток островков поджелудочной железы
- Д. Уменьшение уровня инсулина в крови

3. В целях диагностики активность ферментов определяют в:

- А. Сыворотке крови
- Б. Ликворе
- В. Лейкоконcentратах
- Г. Биоптатах
- Д. Все перечисленное верно

4. При доставке крови на исследование активность ферментов может изменяться в результате:

- А. Активации протеолитических систем плазмы
- Б. Разрушения четвертичной структуры ферментов
- В. Изменения рН крови
- Г. Частичного гемолиза эритроцитов
- Д. Всего перечисленное верно

5. Источником аналитических ошибок при определении активности ферментов может быть:

- А. Концентрация субстрата, не насыщающая фермент
- Б. Изменение рН инкубационной смеси
- В. Нестабильность температуры в ходе инкубации
- Г. Использование реактивов с просроченным сроком годности
- Д. Все перечисленное

ВАРИАНТ №2

1.) В сыворотке крови в отличие от плазмы отсутствует:

- А. Фибриноген
- Б. Альбумин
- В. Комплемент
- Г. Калликреин
- Д. Антитромбин

2.) Креатинин является:

- А. Осмотическим диуретиком
- Б. Регулятором деятельности ЦНС
- В. Конечным продуктом обмена креатина
- Г. Катализатором промежуточных реакций
- Д. Все перечисленное верно

3.) Общая железосвязывающая способность является показателем концентрации в сыворотке:

- А. Железа
- Б. Трансферрина
- В. Церулоплазмينا
- Г. Все перечисленное верно

4.) ПРИЧИНОЙ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕГО БЕЛКА В СЫВОРОТКЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ:

- А. Миеломная болезнь
- Б. Гипергидратация
- В. Острая инфекция
- Г. Парапротейнемический гемобластоз
- Д. Дегидратация

5.) В РАСЩЕПЛЕНИИ УГЛЕВОДОВ НЕ УЧАСТВУЕТ:

- А. Альфа - амилаза
- Б. Гамма - амилаза
- В. Химотрипсин

- Г. Лактаза
- Д. Мальтаза

«Биохимические методы исследования (липидный обмен, пигментный обмен)».

ВАРИАНТ №1

1. Умеренное повышение содержания неконъюгированного билирубина в крови происходит при:

- А. усиленном разрушении эритроцитов;
- Б. конкурентное вытеснение неконъюгированного билирубина из связи с альбумином;
- В. нарушении захвата гепатоцитами неконъюгированного билирубина из крови;
- Г. недостаточной активности уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы гепатоцитов;
- Д. Все перечисленное верно

2. Нормы билирубина в крови здорового человека:

- А. 6,5 - 8,5 мкмоль/л
- Б. 1,7 - 21 мкмоль/л
- В. 10,0 - 18,0 мкмоль/л
- Г. 9,5 - 25,5 мкмоль/л
- Д. 8,5 - 20,5 мкмоль/л

3. Какой класс липопротеинов указывает на высокий риск атеросклероза:

- А. ЛПВП
- Б. ЛПНП
- В. ЛПОНП
- Г. Хиломикроны

4. Увеличение концентрации триглицеридов, и какого класса липопротеинов указывает на риск атеросклероза

- А. ЛПВП
- Б. ЛПНП
- В. ЛПОНП
- Г. Хиломикроны

5. В моче здорового человека содержится:

- А. Биливердин
- Б. Стеркобилиноген
- В. Мезобилирубин
- Г. Билирубин
- Д. Все перечисленное

ВАРИАНТ №2

1. Повышение в крови содержания конъюгированного билирубина характерно:

- А. острого вирусного гепатита;

- Б. лекарственного гепатита;
- В. токсического гепатита;
- Г. метастазов в печень;
- Д. все перечисленное верно.

2. К фракции остаточного азота не относятся:

- А. Аммиак
- Б. Альбумин
- В. Аминокислоты, индикан
- Г. Мочевина

3. Конъюгированный билирубин в норме в крови составляет до:

- А. 5% Б. 25% В. 50% Г. 75% Д. 100%

4. К МЕТОДАМ СРОЧНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

- А. Активности кислой фосфатазы
- Б. Общего холестерина
- В. Белковых фракций
- Г. Билирубина у новорожденных
- Д. Опухолевых маркеров

5.) В СОСТАВЕ ГАММА-ГЛОБУЛИНОВ ПЛАЗМЫ КРОВИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРЕДСТАВЛЕНО:

- А. IgM Б. IgG В. IgA Г. IgE

ВАРИАНТ №3

Допишите определения:

Ферменты (энзимы)-

АЛТ- -

АСТ -

Амилаза-.

Кислая фосфатаза -

Щелочная фосфатаза -

Углеводы -

Билирубин -

Липиды-

ТЕКУЩИЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ №6.

«Водно-минеральный обмен. Методы исследования кислотно-щелочного ». ВАРИАНТ №1

1.Постоянство кислотно-основного состояния преимущественно поддерживает:

- А. Синовиальная жидкость
- Б. Лимфатическая жидкость
- В. Почки
- Г. Костная ткань
- Д. Миокард

2.Ацидоз характеризуется:

- А. Повышением рН крови;
- Б. Повышением концентрации OH^- в крови
- В. Снижением рН крови
- Г. Снижением концентрации H^+
- Д. Уменьшением лактата крови

3.Алкалоз характеризуется:

- А. Снижением рН крови;
- Б. Уменьшением концентрации OH^- в крови
- В. Повышением рН крови
- Г. Снижением концентрации H^+
- Д. Увеличением лактата крови

4. рН артериальной крови человека составляет в норме:

- А. 0,0-1,0
- Б. 6,7-7,7
- В. 7,0-7,35
- Г. 7.35-7,45
- Д. 7,0-10.0

5. К метаболическому ацидозу относится:

- А. Кетоацидоз
- Б. Лактоацидоз
- В. Почечный ацидоз
- Г. Энтероацидоз
- Д. Все перечисленное верно

ВАРИАНТ №2

- 1.) Респираторный алкалоз развивается при
- А. Гипервентиляции легких
 - Б. Обильной рвоте
 - В. Опухоли трахеи
 - Г. Вливании содовых растворов
 - Д. Гиповентиляции легких
- 2.) pH артериальной крови человека составляет в норме(единиц):
- А. 0.0-1.0
 - Б. 6.7-7.7
 - В. 7.0-7.35
 - Г. 7.35-7.45
 - Д. 7.0-10.0
- 3.) pH означает:
- А. Концентрацию ионов водорода
 - Б. Символ, являющийся отрицательным десятичным логарифмом молярной концентрации ионов водорода
 - В. Концентрацию гидроксильных групп
 - Г. Отношение концентрации H^+ к концентрации гидроксильных групп
 - Д. Напряжение ионов водорода
- 4.) Роль бикарбонатной буферной системы заключается:
- А. Замене сильных кислот слабыми
 - Б. Образовании в организме органических кислот
 - В. Источнике ионов фосфора
 - Г. Выведении из организма фосфатов
 - Д. Поддержании осмотического давления
- 5.) Постоянство кислотно-основного состояния преимущественно поддерживает:
- А. Синовиальная жидкость
 - Б. Лимфатическая жидкость
 - В. Почки
 - Г. Костная ткань
 - Д. Миокард

ТЕКУЩИЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ №7.

«Коагулология. Система гемостаза. Основные звенья системы гемостаза. Внутренний и внешний механизм активации системы гемостаза. Норма и патология системы гемостаза. Гемофилии. Тромбоцитопатии. Тромбоцитопении. К-авитаминоз. Понятие тромбофилии и геморрагии».

ВАРИАНТ №1

1. Система гемостаза включает:

- А. Факторы фибринолиза
- Б. Плазменные факторы
- В. Антикоагулянты
- Г. Тромбоциты
- Д. Все перечисленное

2. Индуктором агрегации тромбоцитов является:

А. Аспирин

Б. АМФ

В. АДФ

Г. Мочевина

Д. Протромбин

3. Тромбоцитарно-сосудистому гемостазу принадлежит функция:

А. Протеолиза

Б. Адгезивно-агрегационная

В. Гидролиза

Г. Лизиса эуглобулинов

Д. Фибринолиза

4. Протромбиназообразование по внутреннему пути следует контролировать:

А. Агрегацией тромбоцитов

Б. Определением фибриногена

В. Активированным частичным тромбопластиновым временем

Г. Протромбиновым временем

Д. временем кровотечения

5. Активатором фактора Хагемана не является:

А. Стекло

Б. Каолин

В. Силикон

Г. Грубодисперсный коллаген

Д. Кожа

ВАРИАНТ №2

1.) ПРОТРОМБИНАЗООБРАЗОВАНИЕ ПО ВНУТРЕННЕМУ ПУТИ СЛЕДУЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ:

А. Агрегацией тромбоцитов

Б. Протромбиновым временем

В. Определением фибриногена

Г. Временем кровотечения

Д. Активированным частичным тромбопластиновым временем

2.) АКТИВНОСТЬ ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СЛЕДУЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ:

А. Антитромбином III

Б. Лизисом эуглобулинов

В. Тромбиновым временем

Г. Агрегацией тромбоцитов

Д. Протромбиновым временем

3.) АКТИВАТОРОМ ФАКТОРА ХАГЕМАНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:

А. Стекло

Б. Грубодисперсный коллаген

- В. Каолин
- Г. Кожа
- Д. Силикон

4.) КОНТРОЛЬ ЗА АНТИКОАГУЛЯНТАМИ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ МОЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ:

- А. Протромбина по Квику (% от нормы)
- Б. Протромбинового времени
- В. Международного нормализованного отношения
- Г. Протромбинового индекса
- Д. Все перечисленное верно

5.) ПРИЧИНОЙ ДВС - СИНДРОМА МОЖЕТ БЫТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКЗОГЕННЫЙ ФАКТОР:

- А. Бактериemia, виремия
- Б. Сосудистые протезы
- В. Трансфузионные жидкости
- Г. Все перечисленное верно
- Д. Змеиные яды

ВАРИАНТ №3

Допишите определения:

1. Система гемостаза-

2. Морфологические компоненты системы гемостаза:

3. Функциональные компоненты системы гемостаза:

4. Формирование перичной тромбоцитарной пробки при повреждении сосуда условно проходит в 3 стадии:

5. Процесс свёртывания крови может быть разделён на три фазы:

ТЕКУЩИЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ №8.

«Предмет и задачи иммунологии. Понятие об иммунной системе и иммунологической реактивности. Центральные и периферические органы иммунной системы. Иммуноглобулины (антитела). Иммунологические методы исследования в КДЛ».

ВАРИАНТ №1

1. Центральные органы иммунной системы:

- А. Тимус, костный мозг
- Б. Печень
- В. Лимфатические узлы
- Г. Селезенка
- Д. Пейеровы бляшки подвздошной кишки

2. К периферическим органам иммунной системы относятся:

- А. Миндалины
- Б. Лимфатические узлы
- В. Селезенка
- Г. Пейеровы бляшки
- Д. Все перечисленное верно

3. Плазматические клетки происходят из:

- А. В-лимфоцитов
- Б. Т-лимфоцитов
- В. Макрофагов
- Г. Фибробластов
- Д. Всех перечисленных клеток

4. Какое созревание В-клеток происходит в костном мозге?

- А. Антиген-независимое
- Б. Антиген-зависимое
- В. Созревание В-клеток не происходит
- Г. В костном мозге происходит сначала антиген-независимое, а затем антиген-зависимое
- Д. Правильного ответа нет

5. В ходе иммунного ответа осуществляется кооперация между:

- А. Фагоцитами, Т- и В-лимфоцитами
- Б. Макрофагами и В-лимфоцитами

- В. Макрофагами, тимоцитами и В-лимфоцитами
- Г. Макрофагами и Т-лимфоцитами
- Д. Т - и В-лимфоцитами и плазматическими клетками

ВАРИАНТ №2

1.) Центральные органы иммунной системы:

- А. Тимус, костный мозг
- Б. Печень
- В. Лимфатические узлы
- Г. Селезенка
- Д. Пейеровы бляшки подвздошной кишки

2.) ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ:

- А. Созревание и размножение иммунокомпетентных клеток предшественников
- Б. Антигеннезависимое формирование Т- и В-систем иммунитета
- В. При взаимодействии с антигеном гибель незрелых лимфоцитов в результате апоптоза
- Г. Все перечисленное

3.) К ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ ОРГАНАМ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСЯТСЯ:

- А. Миндалины
- Б. Лимфатические узлы
- В. Селезенка
- Г. Пейеровы бляшки
- Д. Всё перечисленное верно

4.) Т- ЛИМФОЦИТЫ ЧЕЛОВЕКА ПРОИСХОДЯТ ИЗ:

- А. Унипотентного предшественника Т-лимфоцитов костного мозга с последующим созреванием в тимусе
- Б. Колониеобразующей гранулоцитарно - макрофагальной единицы селезенки.
- В. Лимфоцитов лимфы
- Г. Клеток селезенки

5. Т-лимфоциты - хелперы:

- А. CD3⁺CD(16 +CD56)⁺
- Б. CD3CD8⁺
- В. CD3+CD(16 +CD56)⁺
- Г. CD3CD4⁺

ВАРИАНТ №3

Допишите определения:

1. Органы иммунной системы (центральные);

2. Органы иммунной системы (периферические):

3. Клетки иммунной системы:

4. Ранний воспалительный ответ - неспецифический -

5. Специфический иммунный ответ обычно возникает

**«Иммунологические методы исследования в КДЛ. Реакция антиген-антитело»
ВАРИАНТ №1**

1. Наиболее частой причиной гемолитической болезни новорожденных являются антитела к:

- А. Антигенам системы АВО
- Б. Антигенам системы резус
- В. Антигенам М, Даффа
- Г. Все перечисленное верно
- Д. Все перечисленное неверно

2. В основе определения групповой принадлежности лежит реакция:

- А. Агглютинации
- Б. Преципитации
- В. Иммунодиффузии
- Г. Агрегации
- Д. Все перечисленное верно

3. Для определения групповой принадлежности перекрестным методом нужно использовать:

- А. Сыворотку
- Б. Взвесь эритроцитов
- В. Сыворотку и взвесь эритроцитов

Г. Кровь без стабилизатора

Д. Все перечисленное верно

4.Основные маркеры Т-лимфоцитов:

А. CD3

Б. CD 19

В. CD25

Г. CD38

Д. Все перечисленное верно

5.Основные маркеры В-лимфоцитов:

А. CD3

Б. CD4

В. CD19

Г. CD38

Д. Все перечисленное верно

ВАРИАНТ №2

Допишите определения:

1.Антигены системы АВО (эритроцитарные антигены А и В) находятся

2.Антигены системы Rh находятся

3.Термин «группа крови» характеризует.

4.Две важнейшие классификации группы крови человека — это

5.Гемолитическая болезнь новорожденных —

ТЕКУЩИЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ №9.

«Методы иммуноферментного анализа (ИФА)».

ВАРИАНТ №1

1. Антитела, класса IgM:

- А. Проявляют антибактериальные свойства
- Б. Связывают комплемент
- В. Участвуют в первичном иммунном ответе
- Г. Все перечисленное верно
- Д. Правильного ответа нет

2. Антитела, класса IgG:

- А. Связывают комплемент
- Б. Связываются с фагоцитирующими клетками
- В. Проникают через плаценту
- Г. Все перечисленное верно

3. Антитела, класса IgA:

- А. Обеспечивают иммунный ответ в дыхательной и пищеварительной системах
- Б. Обладают антибактериальными и противовирусными свойствами
- В. Образуют димерные молекулы
- Г. Образуют комплексы с секреторным фрагментом
- Д. Все перечисленное верно

4. Инфекция, сопровождающаяся формированием T-клеточного иммунодефицита:

- А. ВИЧ-инфекция
- Б. Скарлатина
- В. Грипп
- Г. Корь
- Д. Коклюш

5. В каких случаях целесообразно определение хорионического гонадотропина (ХГЧ)?

- А. Опухоли матки
- Б. Диагностика беременности на ранних сроках и патология плода
- В. Опухоли трофобласта
- Г. Опухоли яичка
- Д. Все перечисленное верно

ВАРИАНТ №2

Определение АТ к ТПО в сыворотке используют.

Увеличение ТТГ

Уменьшение Т4 св

Мужские половые гормоны - это...

Женские половые гормоны - это ..

ТЕКУЩИЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ №10.

«Общие данные о строении и функциях органов и тканей в норме. Цитологические исследования».

ВАРИАНТ №1

1. Рак развивается из:

- А. Соединительной ткани
- Б. Мышечной ткани
- В. Эпителиальной ткани
- Г. Нервной ткани
- Д. Мезенхимальной ткани

2. Для злокачественных опухолей наиболее характерен:

- А. Медленный рост
- Б. Экспансивный рост
- В. Инфильтративный рост
- Г. Ни один из перечисленных факторов
- Д. Все перечисленное характерно

3. К полиморфизму клеток следует отнести следующие морфологические признаки:

- А. Многообразие форм клеток
- Б. Разнообразие размеров клеток
- В. Различие степени созревания отдельных клеток
- Г. Ни один из перечисленных признаков

Д. Все перечисленные признаки

4. В мочевом пузыре наиболее часто встречаются:

А. Переходноклочечные опухоли

Б. Соединительнотканые опухоли

В. Плоскоклеточные опухоли

Г. Сосудистые опухоли

Д. Все перечисленное верно

5. Характерными признаками для клеток злокачественных опухолей являются:

А. Нарушение дифференцировки

Б. Полиморфизм

В. Анизохромия

Г. Все перечисленные признаки

Д. Ни один из перечисленных признаков

ВАРИАНТ №2

Допишите предложение:

Рак развивается

Цитология - это ...

Для злокачественных опухолей наиболее характерен

Компонентами цитоплазмы являются

Цитологическое исследование используется

ТЕКУЩИЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ №11.

«Методы бактериологических исследований. Принцип работы при выполнении анализа в бактериологической лаборатории».

ВАРИАНТ №1

1. Идентификация гонококков основывается на следующих признаках, кроме :

А. Парности кокков

Б. Грамотрицательности

В. Грамположительности

Г. Внутриклеточного расположения

Д. Бобовидности формы

2. Бактериологический метод заключается:

- А. Агглютинации
- Б. Преципитации
- В. Иммунодиффузии
- Г. Выделении чистой культуры возбудителя и идентификация
- Д. Все перечисленное верно

3. Идентификация в бактериологическом исследовании - это:

- А. Установление принадлежности к той или иной систематической группе (виду, роду)
- Б. Выявление грамотрицательности
- В. Внутриклеточного расположения
- Г. Выявление грамположительности
- Д. Все перечисленное верно

4. Какая питательная среда используется при посеве условно патогенной флоры:

- А. Среда Эндо
- Б. Теллуритовая среда
- В. Универсальные питательные среды
- Г. Нет правильного ответа
- Д. Все перечисленные среды

5. Каким методом окрашивают колонии для приготовления мазков:

- А. По Романовскому
- Б. Окраска по методу толстой капли
- В. По Граму
- Г. Цитохимические методы
- Д. Все перечисленные методы

Вариант №2

Допишите предложения:

Какой метод используют при выделении чистой культуры, при сильном загрязнении патологического материала

Среда обогащения необходима для бактериологического метода исследования

На втором этапе бактериологического метода исследования проводят

Третий этап бактериологического метода

Внутривидовой идентификации бактерий заключается

ТЕКУЩИЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ №12.

«Методы молекулярно-генетического исследования. Принцип работы при выполнении ПЦР анализа».

ВАРИАНТ №1

1. Преимущество метода ПЦР как метода диагностики инфекционных заболеваний:

- А. Прямое определение наличия возбудителя
- Б. Высокая специфичность и чувствительность
- В. Универсальность процедуры выявления различных возбудителей
- Г. Высокая скорость получения результата анализа при острых и латентных инфекциях
- Д. Все указанное верно

2. Ложноположительные результаты ПЦР возможны:

- А. При перекрестной контаминации от пробы к пробе в процессе обработки клинических образцов или при раскапывании реакционной смеси
- Б. При контаминации продуктами амплификации, которые накапливаются в огромных количествах и являются идеальными для реамплификации
- В. При контаминации следовыми количествами ампликонов посуды, автоматических пипеток, оборудования
- Г. Все указанное верно
- Д. Все указанное неверно

3. Метод блот-гибридизации используют для:

- А. Выявления специфических фрагментов ДНК
- Б. Идентификация фрагментов ДНК
- В. Амплификации ДНК
- Г. Все перечисленные методы
- Д. Нет правильного ответа

4. Метод ПЦР - это:

- А. Метод диагностики инфекционных заболеваний
- Б. Метод выявления генетических заболеваний
- В. Метод фармакогенетики
- Г. Нет правильного ответа
- Д. Все перечисленное верно

5. Предрасположенность к ожирению и диабету:

- А. 20 полиморфизмов
- Б. 7 полиморфизмов
- В. 8 полиморфизмов
- Г. 12 полиморфизмов

Д. Все перечисленное верно

Вариант №2

Допишите определения:

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — это
_Амплификация

Фармакогенетика

Метод клонирования ДНК позволяет

Рестриктазы - это

Итоговый тестовый контроль

Вариант 1

- 1.) На результаты анализа могут повлиять следующие факторы внелабораторного:
 - А. Физическое и эмоциональное напряжение больного
 - Б. Циркадные ритмы, влияние климата
 - В. Положение тела
 - Г. Прием медикаментов
 - Д. Все перечисленное
- 2.) Увеличение количества ретикулоцитов имеет место при:
 - А. Апластической анемии
 - Б. В-12-дефицитной анемии
 - В. Гемолитических синдромах
 - Г. Метастазах рака в костный мозг
 - Д. Анемии при хронических болезнях
- 3.) Значение среднего объема эритроцитов (MCV) и цветного показателя увеличены при:
 - А. Железодефицитной анемии
 - Б. Анемии при хронических болезнях
 - В. Мегалобластных анемиях
 - Г. Талассемии
 - Д. Гемоглобинопатиях
- 4.) В состав желудочного сока входят:
 - А. Соляная кислота
 - Б. пищеварительные ферменты
 - В. Слизь
 - Г. Все ответы правильные
 - Д. Правильного ответа нет

- 5.) Для бронхиальной астмы в мокроте характерны:
- А. Спирали Куршмана
 - Б. Кристаллы Шарко-Лейдена
 - В. Скопления эозинофилов
 - Г. Все ответы правильные
 - Д. Правильного ответа нет
- 6.) Нормальной считается реакция кала:
- А. Кислая
 - Б. Щелочная
 - В. Резкощелочная
 - Г. Нейтральная
 - Д. Правильного ответа нет
- 7.) Протеинурия может быть показателем поражения:
- А. Клубочков почек
 - Б. Канальцев почек
 - В. Мочевыводящих путей
 - Г. Организма
 - Д. Всего перечисленного
- 8.) К дисбактериозам влагалища относятся все, кроме:
- А. Бактериальный вагиноз
 - Б. Трихомонадный вагиноз
 - В. Мико- и уреоплазмоз
 - Г. Неспецифический вагинит
 - Д. Урогенитальный вагиноз
- 9.) Определение видов малярийного плазмодия необходимо для:
- А. Назначения схемы лечения
 - Б. Проведения противоэпидемических мероприятий
 - В. Прогноза в отношении возможности излечения
 - Г. Прогноза в отношении смертельного исхода
 - Д. Всего перечисленного
- 10.) В сыворотке крови в отличие от плазмы отсутствует:
- А. Фибриноген
 - Б. Альбумин
 - В. Комплемент
 - Г. Калликреин
 - Д. Антитромбин
- 11.) Креатинин является:
- А. Осмотическим диуретиком
 - Б. Регулятором деятельности ЦНС
 - В. Конечным продуктом обмена креатина
 - Г. Катализатором промежуточных реакций
 - Д. Все перечисленное верно
- 12.) Общая железосвязывающая способность является показателем концентрации в сыворотке:
- А. Железа
 - Б. Трансферрина
 - В. Церулоплазмина
 - Г. Все перечисленное верно
- 13.) Система гемостаза включает:
- А. Факторы фибринолиза
 - Б. Плазменные факторы

- В. Антикоагулянты
 - Г. Тромбоциты
 - Д. Все перечисленное
- 14.) Для злокачественных опухолей наиболее характерен:
- А. медленный рост
 - Б. экспансивный рост
 - В. Инфильтративный рост
 - Г. Ни один из перечисленных факторов
 - Д. Все перечисленное характерно
- 15.) Центральные органы иммунной системы:
- А. Тимус, костный мозг
 - Б. Печень
 - В. Лимфатические узлы
 - Г. Селезенка
 - Д. Пейеровы бляшки подвздошной кишки
- 16.) Тиреотропный гормон повышен при:
- А. Нелеченном тиреотоксикозе
 - Б. Гипоталамо-гипофизарная недостаточность при опухоли гипофиза
 - В. Первичном гипотиреозе
 - Г. Травма гипофиза
 - Д. Лечении гормонами щитовидной железы
- 17.) Больной обратился к врачу с жалобами на постоянное отхождение члеников, которые выползают из кишечника по несколько штук в любое время дня и ночи, независимо от акта дефекации. Можно думать о:
- А. Дифиллоботриозе
 - Б. Тениозе
 - В. Гименолепидозе
 - Г. Тениаринхозе
 - Д. Все перечисленное верно
- 18.) Респираторный алкалоз развивается при
- А. Гипервентиляции легких
 - Б. Обильной рвоте
 - В. Опухоли трахеи
 - Г. Вливании содовых растворов
 - Д. Гиповентиляции легких
- 19.) pH артериальной крови человека составляет в норме(единиц):
- А. 0.0-1.0
 - Б. 6.7-7.7
 - В. 7.0-7.35
 - Г. 7.35-7.45
 - Д. 7.0-10.0
- 20.) На кору надпочечников воздействуют:
- А. Тиреотропный гормон
 - Б. АКТГ
 - В. Паратгормон
 - Г. Окситоцин
 - Д. Альдостерон

Вариант 2

1.) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАКОГО ИЗ АНАЛИЗОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕ 12-ЧАСОВОГО ВОЗДЕРЖАНИЯ ОТ ПРИЕМА ПИЩИ:

- А. Триглицериды, холестерин
- Б. Общий анализ крови
- В. Общий белок
- Г. Ферменты сыворотки (ЩФ, α-амилаза)
- Д. Глюкоза

2.) СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ВНУТРИЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА:

- А. Карта Шухарта
- Б. По ежедневным средним
- В. Кумулятивных сумм
- Г. По дубликатам
- Д. Все перечисленные

3.) ИСТОЧНИКАМИ ОШИБОК ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОЭ МОГУТ СЛУЖИТЬ:

- А. Неправильное соотношение между цитратом натрия и кровью
- Б. Образование сгустка
- В. Косое положение капилляра
- Г. Несоблюдение температурного режима
- Д. Все перечисленное

4.) МОЛЕКУЛА ГЕМОГЛОБИНА СОСТОИТ ИЗ:

- А. Протопорфирина и железа
- Б. Глобина и железа
- В. Порфирина и железа
- Г. Гема и глобина
- Д. Протопорфирина и глобина

5.) ПОЙКИЛОЦИТОЗ - ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ:

- А. Формы эритроцитов
- Б. Объема эритроцитов
- В. Диаметра эритроцитов
- Г. Интенсивности окраски
- Д. Цвета эритроцитов

6.) К ТЕТРАДЕ ЭРЛИХА ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ОТНОСЯТСЯ:

- А. Кристаллы холестерина
- Б. Обызвествленный детрит
- В. Микобактерии туберкулеза
- Г. Обызвествленные эластические волокна
- Д. Все перечисленные элементы

7.) СОЛЯНАЯ КИСЛОТА ОКАЗЫВАЕТ В ЖЕЛУДКЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

- А. Подготавливает к расщеплению перевариваемую растительную клетчатку
- Б. Подготавливает белки пищи к протеолизу (в т.ч. мышечные волокна)
- В. Оказывает бактерицидное действие
- Г. Активирует пепсиноген
- Д. Все перечисленное

8.) ПОСТРЕНАЛЬНАЯ ПРОТЕИНУРИЯ ОБУСЛОВЛЕНА:

- А. Прохождением через неповрежденный почечный фильтр белков низкой молекулярной массы
- Б. Фильтрацией нормальных плазменных белков через поврежденный почечный фильтр
- В. Нарушением реабсорбции белка в проксимальных канальцах
- Г. Попаданием воспалительного экссудата в мочу при заболевании мочевыводящих путей
- Д. Всеми перечисленными факторами

9.) К ЭЛЕМЕНТАМ ОСАДКА МОЧИ ТОЛЬКО ПОЧЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ:

- А. Эритроциты
- Б. Лейкоциты
- В. Цилиндры
- Г. Плоский эпителий
- Д. Все перечисленное

10.) ОБЩИМИ ЖАЛОБАМИ ДЛЯ ТРИХОМОНИАЗА, КАНДИДОЗА И БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА ЯВЛЯЮТСЯ:

- А. Зуд, жжение и чувство дискомфорта в области наружных половых органов
- Б. Выделения из влагалища
- В. Неприятный запах отделяемого
- Г. Эрозии на слизистых оболочках гениталий
- Д. Все перечисленное

11.) ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ ФОРМ ПРОСТЕЙШИХ СОБРАННЫХ МАТЕРИАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИССЛЕДОВАН ОТ МОМЕНТА ДЕФЕКАЦИИ:

- А. Через 6-12 часов
- Б. Через 2-3 часа
- В. На следующие сутки
- Г. В любой из названных периодов
- Д. До 30 минут

12.) В ТОЛСТОЙ КАПЛЕ КРОВИ, ВЗЯТОЙ У ЛИХОРАДЯЩЕГО БОЛЬНОГО, ПЛАЗМОДИИ В ВИДЕ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНОГО ЗНАКА, ФИГУР ЛЕТАЮЩИХ ЛАСТОЧЕК, МАЛЕНЬКИХ ГОЛУБЫХ ПОЛУКРУГОВ, НАПРОТИВ КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ КРАСНЫЕ ТОЧКИ ЯДРА. ВСТРЕЧАЮТСЯ ФОРМЫ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ СИНИХ КОМОЧКОВ И ОДНОГО ЯДРА, КОТОРЫЕ ЧАСТО РАСПОЛОЖЕНЫ НА ФОНЕ БЛЕДНО-РОЗОВЫХ ДИСКОВ НЕПОЛНОСТЬЮ ГЕМОЛИЗИРОВАННЫХ ЭРИТРОЦИТОВ. ОБНАРУЖЕНЫ ПАРАЗИТЫ ВИДА:

- А. *P. malariae*
- Б. *P. ovale*
- В. *P. falciparum*
- Г. Любой из перечисленных
- Д. *P. vivax*

13.) БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ ПОЗВОЛЯЮТ:

- А. Повысить производительность работы в лаборатории
- Б. Проводить исследования кинетическими методами
- В. Расширить диапазон исследований
- Г. Уменьшить расход реагентов
- Д. Все перечисленное верно

14.) ПРИЧИНОЙ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕГО БЕЛКА В СЫВОРОТКЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ:

- А. Миеломная болезнь
- Б. Гипергидратация
- В. Острая инфекция
- Г. Парпротеинемический гемобластоз
- Д. Дегидратация

15.) В РАСЩЕПЛЕНИИ УГЛЕВОДОВ НЕ УЧАСТВУЕТ:

- А. Альфа - амилаза
- Б. Гамма - амилаза
- В. Химотрипсин
- Г. Лактаза
- Д. Мальтаза

16.) pH ОЗНАЧАЕТ:

- А. Концентрацию ионов водорода
- Б. Символ, являющийся отрицательным десятичным логарифмом молярной концентрации ионов водорода
- В. Концентрацию гидроксильных групп
- Г. Отношение концентрации H^+ к концентрации гидроксильных групп
- Д. Напряжение ионов водорода

17.) ПРОТРОМБИНАЗООБРАЗОВАНИЕ ПО ВНУТРЕННЕМУ ПУТИ СЛЕДУЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ:

- А. Агрегацией тромбоцитов
- Б. Протромбиновым временем
- В. Определением фибриногена
- Г. Временем кровотечения
- Д. Активированным частичным тромбопластиновым временем

18.) АКТИВНОСТЬ ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СЛЕДУЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ:

- А. Антитромбином III
- Б. Лизисом эгглобулинов
- В. Тромбиновым временем
- Г. Агрегацией тромбоцитов
- Д. Протромбиновым временем

19.) К ГЛЮКОКОРТИКОИДАМ ОТНОСИТСЯ:

- А. Глюкагон
- Б. Инсулин
- В. Кортизол
- Г. АКТГ
- Д. Кортиколиберин

20. ПАРАТГОРМОН ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА:

- А. Кости и почки
- Б. Надпочечники
- В. Поджелудочную железу
- Г. Печень
- Д. Сердц

Вариант 3

1.) В СОПРОВОДИТЕЛЬНОМ БЛАНКЕ К МАТЕРИАЛУ, ПОСТУПАЮЩЕМУ В ЛАБОРАТОРИЮ, ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО СЛЕДУЮЩЕЕ, КРОМЕ:

- А. Фамилия И.О. больного
- Б. №истории болезни
- В. Вид исследования
- Г. Фамилия лечащего врача
- Д. Метод исследования

2.) ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА:

- А. Анализ контрольных проб проводится отдельно от анализируемых проб
- Б. Анализ контрольных проб проводится заведующим лабораторией
- В. Анализ контрольных проб включается в обычный ход работы лаборатории
- Г. Проводится любым лаборантом
- Д. Все перечисленное верно

3.) К УСКОРЕНИЮ СОЭ ПРИВОДИТ:

- А. Эритроцитоз
- Б. Гиперглобулинемия и гиперфибриногенемия
- В. Макроцитоз эритроцитов
- Г. Микросфероцитоз эритроцитов
- Д. Все перечисленное

4.) ЛЕЙКОЦИТОЗ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ:

- А. Аплазии и гипоплазии костного мозга
- Б. Гиперспленизме
- В. Лучевой болезни
- Г. Инфекциях
- Д. Все перечисленное неверно

5.) НИЗКИЕ ЗНАЧЕНИЯ MCV И ЦВЕТОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ:

- А. Микросфероцитарной анемии
- Б. Фолиеводефицитной анемии
- В. Талассемии
- Г. Иммунной гемолитической анемии
- Д. Острой кровопотере

6.) РЕАКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЛИНСКОЙ ЛАЗУРИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ В МОКРОТЕ:

- А. Кристаллов холестерина
- Б. Спиралей Куршмана
- В. Эластических волокон
- Г. Всего перечисленного
- Д. Сидерофагов (макрофаги с гемосидерином)

7.) НА ОКРАСКУ КАЛА ВЛИЯЮТ:

- А. Примесь крови
- Б. Зеленые части овощей
- В. Билирубин
- Г. Стеркобилин
- Д. Все перечисленное

8.) ПРОТЕИНУРИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПОРАЖЕНИЯ:

- А. Клубочков почек
- Б. Канальцев почек
- В. Мочевыводящих путей
- Г. Организма
- Д. Всего перечисленного

9.) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЧИ ДАЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О:

- А. Выделительной функции почек
- Б. Всех перечисленных функций
- В. Концентрационной функции
- Г. Ни одной из перечисленных
- Д. Фильтрационной функции

10.) ПРЕИМУЩЕСТВО МЕТОДА ПЦР КАК МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:

- А. Прямое определение наличия возбудителя
- Б. Высокая специфичность и чувствительность
- В. Универсальность процедуры выявления различных возбудителей
- Г. Высокая скорость получения результата анализа при острых и латентных

инфекциях

Д. Все указанное верно

11.) В ДУОДЕНАЛЬНОМ СОДЕРЖИМОМ МОГУТ БЫТЬ ВЕГЕТАТИВНЫЕ ФОРМЫ ЖГУТИКОВЫХ РОДА:

А. Trichomonas

Б. Chylomastics

В. Lamblia

Г. Все перечисленные

Д. Нет правильного ответа

12.) В ФЕКАЛИЯХ ОБНАРУЖЕНЫ ЯЙЦА ЛИМОНООБРАЗНОЙ ФОРМЫ С «ПРОБКАМИ» НА ОБОИХ ПОЛЮСАХ, ЖЕЛТОВАТО КОРИЧНЕВАТОГО ЦВЕТА. ОБНАРУЖЕНЫ В ФЕКАЛИЯХ ЯЙЦА:

А. Аскарид

Б. Власоглава

В. Анкилостоматид

Г. Все перечисленное верно

Д. Остриц

13.) К МЕТОДАМ СРОЧНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

А. Активности кислой фосфатазы

Б. Общего холестерина

В. Белковых фракций

Г. Билирубина у новорожденных

Д. Опухолевых маркеров

14.) В СОСТАВЕ ГАММА-ГЛОБУЛИНОВ ПЛАЗМЫ КРОВИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРЕДСТАВЛЕНО:

А. IgM Б. IgG В. IgA Г. IgE

15.) УГЛЕВОДЫ ВСАСЫВАЮТСЯ В ВИДЕ:

А. Крахмала

Б. Моносахаридов

В. Клетчатки

Г. Полисахаридов

Д. Олигосахаридов

16.) РОЛЬ БИКАРБОНАТНОЙ БУФЕРНОЙ СИСТЕМЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В:

А. Замене сильных кислот слабыми

Б. Образовании в организме органических кислот

В. Источнике ионов фосфора

Г. Выведении из организма фосфатов

Д. Поддержании осмотического давления

17.) АКТИВАТОРОМ ФАКТОРА ХАГЕМАНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:

А. Стекло

Б. Грубодисперсный коллаген

В. Каолин

Г. Кожа

Д. Силикон

18.) КОНТРОЛЬ ЗА АНТИКОАГУЛЯНТАМИ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ МОЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ:

А. Протромбина по Квику (% от нормы)

Б. Протромбинового времени

В. Международного нормализованного отношения

Г. Протромбинового индекса

- Д. Все перечисленное верно
- 19.) НА КОРУ НАДПОЧЕЧНИКОВ ВОЗДЕЙСТВУЮТ:
- А. Тиреотропный гормон гипофиза
 - Б. АКТГ
 - В. Паратгормон
 - Г. Окситоцин
 - Д. Альдостерон
- 20.) . КАЛЬЦИТОНИН:
- А. Снижает уровень Са в крови
 - Б. Повышает уровень Са в крови
 - В. Повышает уровень фосфора в сыворотке
 - Г. Не влияет на уровень Са и фосфора в сыворотке
 - Д. Препятствует выведению кальция и фосфора с мочой

Вариант 4

- 1.) НА РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА МОГУТ ПОВЛИЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ВНУТРИЛАБОРАТОРНОГО ХАРАКТЕРА:
- А. Условия хранения пробы
 - Б. Гемолиз, липемия
 - В. Выбор антикоагулянта
 - Г. Используемые методы
 - Д. Все перечисленное
- 2.) ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА -ЭТО:
- А. Метрологический контроль
 - Б. Контроль использования методов исследования разными лабораториями
 - В. Система мер, призванных оценить метод
 - Г. Система объективной проверки результатов лабораторных исследований разных лабораторий
 - Д. Все перечисленное неверно
- 3.) ПОД "ОТНОСИТЕЛЬНЫМ НЕЙТРОФИЛЕЗОМ" ПОНИМАЮТ:
- А. Увеличение процентного содержания нейтрофилов, но нормальное их абсолютное число
 - Б. Увеличение процентного и абсолютного содержания нейтрофилов
 - В. Увеличение процентного содержания нейтрофилов
 - Г. Увеличение их абсолютного числа
 - Д. Уменьшение процентного содержания лимфоцитов
- 4.) УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ЭРИТРОЦИТОВ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ:
- А. У новорожденных в первые сутки
 - Б. При рвоте или ожогах
 - В. У курильщиков
 - Г. При лихорадке
 - Д. При спленомегалии
- 5.) НИЗКИЕ ЗНАЧЕНИЯ MCV И ЦВЕТОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ:
- А. Свинцовой интоксикации
 - Б. Железодефицитной анемии
 - В. Пароксизмальной ночной гемоглобинурии
 - Г. Анемии при хронических болезнях
 - Д. Всех перечисленных заболеваний
- 6.) В СОСТАВ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА ВХОДЯТ:
- А. Соляная кислота
 - Б. Пищеварительные ферменты

- В. Слизь
- Г. Все ответы правильные
- Д. Правильного ответа нет

7.) СЕКРЕТОРНЫМИ КЛЕТКАМИ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ, КРОМЕ:

- А. Главные клетки
- Б. Поверхностный эпителий
- В. Обкладочные клетки
- Г. Добавочные клетки
- Д. Все перечисленные клетки

8.) НОРМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭРИТРОЦИТОВ В 1 МЛ МОЧИ ПО МЕТОДУ НЕЧИПОРЕНКО СОСТАВЛЯЕТ ДО:

- А. 1000
- Б. 4000
- В. 6000
- Г. 10000

9.) НАЛИЧИЕ ЦИЛИНДРОВ И ИХ КОЛИЧЕСТВО В МОЧЕ:

- А. Соответствует содержанию белка в моче
- Б. Не соответствует содержанию белка в моче
- В. Соответствует степени поражения почек
- Г. Зависит от вида протеинурии
- Д. Правильного ответа нет

10.) ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ МАЗКОВ, ОКРАШЕННЫХ ПО ГРАМУ, СТАВИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ОБНАРУЖЕНИЯ В ОТДЕЛЯЕМОМ ВСЕГО ПЕРЕЧИСЛЕННОГО, КРОМЕ:

- А. Снижения количества лейкоцитов в поле зрения до 1 - 2
- Б. Снижения или полного отсутствия лактобактерий
- В. Увеличения количества грамотрицательных бактерий
- Г. "Ключевых клеток"
- Д. Клеток с признаками атипии

11.) В ОСАДКЕ ЖЕЛЧИ ОБНАРУЖЕНЫ ЖИВЫЕ, МЕЛКИЕ, АКТИВНЫЕ ЛИЧИНКИ. ЭТО:

- А. Вегетативные формы лямблий
- Б. Личинки фасциол
- В. Личинки кишечной угрицы
- Г. Личинки описторха
- Д. Личинки аскарид

12.) БОЛЬНОЙ ОБРАТИЛСЯ К ВРАЧУ С ЖАЛОБАМИ НА ПОСТОЯННОЕ ОТХОЖДЕНИЕ ЧЛЕНИКОВ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛЗАЮТ ИЗ КИШЕЧНИКА ПО НЕСКОЛЬКО ШТУК В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ, НЕЗАВИСИМО ОТ АКТА ДЕФЕКАЦИИ. МОЖНО ДУМАТЬ О:

- А. Дифиллоботриозе
- Б. Тениаринхозе
- В. Тениозе
- Г. Все перечисленное верно
- Д. Гименолепидозе

13.) В ОСНОВЕ АНАЛИЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ ЛЕЖАТ:

- А. Полимеризация молекул
- Б. Различная скорость движения молекул
- В. Взаимодействие между антигеном и антителом
- Г. Величина заряда молекулы белка
- Д. Копирование специфических участков молекулы нуклеиновой кислоты

14.) К ФРАКЦИИ ОСТАТОЧНОГО АЗОТА НЕ ОТНОСЯТСЯ:

- А. Аммиак
- Б. Альбумин
- В. Аминокислоты, индикан
- Г. Мочевина

15.) ОСНОВНЫМ ОРГАНОМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ГЕМОСТАЗЕ ГЛЮКОЗЫ КРОВИ, ЯВЛЯЕТСЯ:

- А. Кишечник
- Б. Легкие
- В. Скелетные мышцы
- Г. Почки
- Д. Печень

16.) ПОСТОЯНСТВО КИСЛОТНО - ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОДДЕРЖИВАЕТ:

- А. Синовиальная жидкость
- Б. Лимфатическая жидкость
- В. Почки
- Г. Костная ткань
- Д. Миокард

17.) ПРИЧИНОЙ ДВС - СИНДРОМА МОЖЕТ БЫТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКЗОГЕННЫЙ ФАКТОР:

- А. Бактериемия, виремия
- Б. Сосудистые протезы
- В. Трансфузионные жидкости
- Г. Все перечисленное верно
- Д. Змеиные яды

18.) ЛЕЧЕНИЕ ФРАКЦИОНИРОВАННЫМ ГЕПАРИНОМ СЛЕДУЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ:

- А. Тромбиновым временем
- Б. Протромбиновым временем
- В. АЧТВ
- Г. Временем свертываемости крови
- Д. Остаточной активностью Ха фактора

19.) В КРОВИ СОДЕРЖАНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ПОВЫШАЕТСЯ ПРИ:

- А. Хронической надпочечниковой недостаточности
- Б. Феохромоцитоме
- В. Болезни Аддисона
- Г. Болезни Иценко-Кушинга
- Д. Длительном приеме цитостатических средств

20.) ПОВЫШЕНИЕ КАЛЬЦИТОНИНА В СЫВОРОТКЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ:

- А. Медулярном раке щитовидной железы
- Б. Первичной гиперфункции паращитовидной железы
- В. Беременности
- Г. Хронической почечной недостаточности
- Д. Все перечисленное верно

Вариант 5

1.) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- А. Водные растворы субстратов
- Б. Донорскую кровь
- В. Промышленную сыворотку (жидкую или лиофилизированную)

Д. Все перечисленное
2.) ДЕЙСТВИЕ, ПРЕДПРИНИМАЕМОЕ ПРИ ВЫХОДЕ МЕТОДА ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ:

- А. Просмотреть лабораторный журнал
- Б. Закупить новые контрольные материалы и калибраторы
- В. Задержать выполнение анализов, найти причину неправильных результатов
- Г. Нанести на контрольную карту все пометки, связанные с возникшей ошибкой Все указанное выше
- Д. Все указанное выше

3.) "СДВИГ ВПРАВО" ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ:

- А. Острых инфекционных заболеваний
- Б. Мегалобластных анемий
- В. Хронических лейкозов
- Г. Острых лейкозов
- Д. Все перечисленное верно

4.) НЕЙТРОПЕНИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ВСЕХ СИТУАЦИЙ, КРОМЕ:

- А. Апластической анемии
- Б. В 12-дефицитной анемии
- В. Острого воспаления
- Г. Лечения цитостатиками
- Д. Вирусных инфекций

5.) АНИЗОЦИТОЗ - ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ:

- А. Формы эритроцитов
- Б. Количества эритроцитов
- В. Величины эритроцитов
- Г. Всех перечисленных параметров
- Д. Содержания гемоглобина в эритроците

6.) ПЕПСИН РАСЩЕПЛЯЕТ БЕЛКИ:

- А. В кислой среде
- Б. В нейтральной среде
- В. В щелочной среде
- Г. Правильного ответа нет

7.) СОЛЯНАЯ КИСЛОТА СЕКРЕТИРУЕТСЯ:

- А. Обкладочными (париетальными) клетками фундальных желёз желудка
- Б. главными клетками
- В. добавочными клетками
- Г. Все ответы правильные
- Д. Правильного ответа нет

8.) НОРМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЕЙКОЦИТОВ В 1 МЛ МОЧИ ПО МЕТОДУ НЕЧИПОРЕНКО СОСТАВЛЯЕТ ДО:

- А. 1000 Б. 2000 В. 4000 Г. 8000

9.) ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ ЕДИНИЧНЫЕ В ПРЕПАРАТЕ:

- А. Зернистые цилиндры
- Б. Эритроцитарные цилиндры
- В. Восковидные цилиндры
- Г. Лейкоцитарные цилиндры
- Д. Гиалиновые цилиндры

10.) ТЕРМИНОМ "КЛЮЧЕВАЯ КЛЕТКА" ОБОЗНАЧАЕТСЯ:

- А. Клетка эпителия, имеющая внутрицитоплазматические включения

- Б. Клетка эпителия, покрытая грамвариабельной упорядоченной палочковой флорой
- В. Клетка эпителия, покрытая грамвариабельными и грамотрицательными кокко- бацилярными микроорганизмами
- Г. Клетка плоского эпителия, покрытая сплошь или частично грамположительной палочковой флорой
- Д. Споровая форма микроорганизма

11.) ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ДУОДЕНАЛЬНОГО СОДЕРЖИМОГО МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ЯЙЦА СЛЕДУЮЩИХ ГЕЛЬМИНТОВ:

- А. Описиторха
- Б. Дикроцелия
- В. Клонорха
- Г. Всех перечисленных
- Д. Фасциолы

12.) У РЕБЕНКА В КАЛЕ ОБНАРУЖЕНЫ ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ БЕСЦВЕТНЫЕ, ПРОЗРАЧНЫЕ ЯЙЦА С ДВУХКОНТУРНОЙ ОБОЛОЧКОЙ. МЕЖДУ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКОЙ ВИДНЫ ИЗВИВАЮЩИЕСЯ НИТИ-ФИЛАМЕНТЫ. В ЦЕНТРЕ РАСПОЛОЖЕНЫ 3 ПАРЫ КРЮЧЬЕВ. ОБНАРУЖЕННЫЕ ЯЙЦА ОТНОСЯТСЯ К:

- А. Аскариде
- Б. Карликовому цепню
- В. Власоглаву
- Г. Бычьему цепню
- Д. Все перечисленное верно

13.) ЛОЖНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЦР ВОЗМОЖНЫ:

- А. При перекрестной контаминации от пробы к пробе в процессе обработки клинических образцов или при раскапывании реакционной смеси
- Б. При контаминации продуктами амплификации, которые накапливаются в огромных количествах и являются идеальными для реамплификации
- В. При контаминации следовыми количествами ампликонов посуды, автоматических пипеток, оборудования
- Г. Все указанное верно
- Д. Все указанное неверно

14.) МОЧЕВИНА НЕ ПОВЫШАЕТСЯ ПРИ:

- А. Бронхите
- Б. Хронических нефритах
- В. Обширных ожогах
- Г. Пиелонефритах
- Д. Острой почечной недостаточности

15.) ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

- А. Адреналин
- Б. Соматотропный гормон
- В. Глюкокортикоиды
- Г. Инсулин
- Д. Все перечисленные гормоны

16.) АЦИДОЗ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:

- А. Повышением рН крови
- Б. Повышением концентрации OH^- крови
- В. Снижением рН крови
- Г. Снижением концентрации H^+ в плазме
- Д. Уменьшением лактата крови

17.) ДЛЯ ПРЕДТРОМБОТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ХАРАКТЕРНО:

- А. Повышение фибринолитической активности
- Б. Повышение адгезии и агрегации тромбоцитов
- В. Гипофибриногенемия
- Г. Гипокоагуляция
- Д. Тромбоцитопатия

18.) ВНЕШНИЙ ПУТЬ ПРОТРОМБИНАЗООБРАЗОВАНИЯ СЛЕДУЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ:

- А. Тромбиновым временем
- Б. Протромбиновым временем
- В. Фактором XIII
- Г. Антитромбином III
- Д. Толерантностью плазмы к гепарину

19.) НА УРОВЕНЬ АЛЬДОСТЕРОНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ВЛИЯЕТ:

- А. Положение тела
- Б. Содержание калия в плазме
- В. Содержание натрия в пище
- Г. Уровень ренина в плазме
- Д. Все перечисленное

20.) ПРИ ПОВЫШЕННОЙ СЕКРЕЦИИ СОМАТОТРОПИНА РАЗВИВАЕТСЯ:

- А. Акромегалия
- Б. Синдром Иценко-Кушинга
- В. Нанизм
- Г. Базедова болезнь
- Д. Микседема

Вариант 6

1.) ПРИ РАБОТЕ В КДЛ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ НА СТОЛАХ:

- А. Нефиксированные мазки
- Б. Чашки Петри, пробирки и др. посуду с инфекционным материалом
- В. Метиловый спирт
- Г. Все перечисленное

2.) ТРОМБОЦИТОЗ ОБЫЧНО НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ЛЮБОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КРОМЕ:

- А Хронический миелолейкоз
- Б. Острый лейкоз
- В. Миелофиброз
- Г. Кровотечение
- Д. Эритремия

3.) ЭРИТРЕМИИ НЕ СВОЙСТВЕННО:

- А. Низкая СОЭ
- Б. Высокая СОЭ
- В. Повышение вязкости крови
- Г. Нейтрофильный лейкоцитоз
- В Эритроцитоз

4.) КИСЛУЮ РЕАКЦИЮ КАЛА ОБУСЛОВЛИВАЕТ:

- А. Быстрая эвакуация пищи по кишечнику
- Б. Колит
- В. Нарушение расщепления углеводов («бродильная диспепсия»)
- Г. Преобладание белковой пищи («гнилостная диспепсия»)
- Д. Преобладание жиров в пище

5.) ПОСТРЕНАЛЬНАЯ ПРОТЕИНУРИЯ ОБУСЛОВЛЕНА:

- А. Прохождением через неповрежденный почечный фильтр белков низкой молекулярной массы
- Б. Фильтрацией нормальных плазменных белков через поврежденный почечный фильтр
- В. Нарушением реабсорбции белка в проксимальных канальцах
- Г. Попаданием воспалительного экссудата в мочу при заболевании мочевыводящих путей
- Д. Всеми перечисленными факторами

6.) К ЭЛЕМЕНТАМ ОСАДКА МОЧИ ТОЛЬКО ПОЧЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ:

- А. Эритроциты
- Б. Плоский эпителий
- В. Лейкоциты
- Г. Цилиндры
- Д. Все перечисленное

7.) НАРУШЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ В ЛИКВОРЕ ОБОЗНАЧАЮТ ТЕРМИНОМ:

- А. Гиперглобукорахия
- Б. Диспротеинемия
- В. Диспротеинария
- Г. Диспротеиноз

8.) ПРЕОБЛАДАЮЩИМИ КЛЕТКАМИ ИНФИЛЬТРАТА ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ ВОСПАЛЕНИИ ЯВЛЯЮТСЯ:

- А. Нейтрофилы
- Б. Плазматические клетки
- В. Лимфоциты
- Г. Эпителиальные клетки

9.) В РАСЩЕПЛЕНИИ УГЛЕВОДОВ НЕ УЧАСТВУЕТ:

- А. Альфа-амилаза
- Б. Гамма - амилаза
- В. Химотрипсин
- Г. Лактаза
- Д. Мальтаза

10.) УРОВЕНЬ НАТРИЯ В КРОВИ РЕГУЛИРУЕТ:

- А. Альдостерон
- Б. Паратгормон
- В. Адреналин
- Г. Простагландины
- Д. Кальцитонин

11.) РОЛЬ БИКАРБОНАТНОЙ БУФЕРНОЙ СИСТЕМЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В:

- А. Замене сильных кислот слабыми
- Б. Образовании в организме органических кислот
- В. Источнике ионов фосфора
- Г. Выведении из организма фосфатов
- Д. Поддержании осмотического давления

12.) К МЕТАБОЛИЧЕСКОМУ АЦИДОЗУ ОТНОСИТСЯ:

- А. Кетоацидоз
- Б. Лактоацидоз
- В. Почечный ацидоз
- Г. Энтероацидоз
- Д. Все перечисленное верно

13.) ГОРМОНЫ МОГУТ БЫТЬ:

- А. Гликопротеидами
- Б. Белками
- В. Стероидами
- Г. Пептидами
- Д. Любым из перечисленных веществ

14.) ДЛЯ ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩЕГО ГОРМОНА (ЛГ) СПРАВЕДЛИВО СЛЕДУЮЩЕЕ:

- А. Гормон не синтезируется у мужчин
- Б. Активирует в яичниках синтез эстрогенов
- В. Концентрация в крови не меняется перед овуляцией
- Г. Повышается при тяжелом стрессе
- Д. В случае нерегулярных овуляторных циклов исследуют однократно

15.) ПРЕДШЕСТВЕННИКОМ БИЛИРУБИНА ЯВЛЯЕТСЯ:

- А. Миоглобин
- Б. Гемоглобин
- В. Кatalаза
- Г. Цитохромы
- Д. Все перечисленное

16.) ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ГЛЮКОЗЕ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ:

- А. Гликированного гемоглобина
- Б. Фруктозамина
- В. Глюкозотолерантный тест
- Г. Определение инсулина

17.) ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОТЕИНА С:

- А. Выявление риска тромбозов
- Б. Критерий повышения или снижения дозы непрямых антикоагулянтов
- В. Контроль гепаринотерапии
- Г. Оценка фибринолиза
- Д. Все перечисленное верно

18.) ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ:

- А. Тимус, костный мозг
- Б. Печень
- В. Лимфатические узлы
- Г. Селезёнка

19.) В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА:

- А. Опухоли матки
- Б. Диагностика беременности на ранних сроках и патология плода
- В. Опухоли яичка
- Г. Опухоли трофобласта
- Д. Все перечисленное верно

20.) В ФЕКАЛИЯХ ОБНАРУЖЕНЫ ЯЙЦА ЛИМОНООБРАЗНОЙ ФОРМЫ С «ПРОБКАМИ» НА ОБОИХ ПОЛЮСАХ, ЖЕЛТОВАТО-КОРИЧНЕВАТОГО ЦВЕТА. ОБНАРУЖЕНЫ В ФЕКАЛИЯХ ЯЙЦА:

- А. Аскарид
- Б. Анкилостоматид
- В. Остриц
- Г. Власоглава

Вариант 7

1.) ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ЯВЛЯЮТСЯ:

- А. Обеспечение клинических лабораторных исследований в соответствии с профилем ЛПУ
- Б. Внедрение прогрессивных форм работы, новых методов
- В. Оказание консультативной помощи врачам лечебных отделений в трактовке лабораторных данных
- Г. Повышение квалификации персонала лаборатории
- Д. Проведение мероприятий по охране труда персонала, соблюдение техники безопасности
- Е. Все перечисленное верно

2.) НОРМОБЛАСТОЗ В КРОВИ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ ПРИ:

- А. Талассемии
- Б. Остром эритромиелозе
- В. Массивном гемолизе
- Г. Всем перечисленном
- Д. Миелофиброзе

3.) БЛАСТНЫЕ КЛЕТКИ ИМЕЮТ:

- А. Нежносетчатое строение хроматина
- Б. Большое ядро
- В. Базофильную цитоплазму
- Г. Нуклеолы
- Д. Все перечисленное

4.) РЕЗКО ЩЕЛОЧНАЯ РЕАКЦИЯ КАЛА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕННОМ, КРОМЕ:

- А. Преобладания углеводов в пище («бродильная диспепсия»)
- Б. Ахлоргидрии («гнилостная диспепсия»)
- В. Гиперхлоргидрии («гнилостная диспепсия»)
- Г. Гнилостных процессов в толстой кишке
- Д. Нет правильного ответа

5.) О НАЛИЧИИ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ СУТОЧНАЯ ПОТЕРЯ БЕЛКА С МОЧОЙ, РАВНАЯ:

- А. 0.5-1 г
- Б. 1-3 г
- В. 3-3.5 г
- Г. Более 3.5 г
- Д. В любом количестве

6.) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЧИ ДАЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О:

- А. Выделительной функции почек
- Б. Концентрационной функции
- В. Фильтрационной функции
- Г. Всех перечисленных функций
- Д. Ни одной из перечисленных

7.) К БЕЛКОВО-КЛЕТОЧНОЙ ДИССОЦИАЦИИ СМЖ МОЖНО ОТНЕСТИ:

- А. Сочетание в ликворе плеоцитоза и высокого белка
- Б. Отсутствие белка в ликворе
- В. Увеличение содержания белка и глюкозы в ликворе
- Г. Увеличение содержания белка при отсутствии плеоцитоза
- Д. Все перечисленные состояния

8.) ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ИССЛЕДОВАНИЕ:

А. Лейкоцитарной формулы

Б. СОЭ

В. Белковых фракций

Г. СРВ

Д. Всего перечисленного

9.) ДЛЯ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ХАРАКТЕРНЫ:

А. Гипергликемия

Б. Глюкозурия

В. Кетоз

Г. Гиперосмолярность

Д. Все перечисленное

10.) ЖЕЛЕЗО В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ПРЕДСТАВЛЕНО В ФОРМАХ:

А. Железо гемоглобина

Б. Железо миоглобина

В. Гемосидерина

Г. Ферритина

Д. Всех перечисленных формах

11.) ПОСТОЯНСТВО КИСЛОТНО - ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОДДЕРЖИВАЕТ:

А. Синовиальная жидкость

Б. Лимфатическая жидкость

В. Почки

Г. Костная ткань

Д. Миокард

12.) pH АРТЕРИАЛЬНОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ В НОРМЕ (ЕДИНИЦ):

А. 0.0-1.0

Б. 6.7-7.7

В. 7.0-7.35

Г. 7.35-7.45

13.) ГОРМОНЫ ГИПОТАЛАМУСА ОКАЗЫВАЮТ ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НА:

А. Щитовидную железу

Б. Поджелудочную железу

В. Гипофиз

Г. Надпочечники

Д. Половые железы

14.) ДЛЯ ТЕСТОСТЕРОНА СПРАВЕДЛИВО СЛЕДУЮЩЕЕ, КРОМЕ:

А. Андрогенный гормон, ответственный за вторичные половые признаки у мужчин

Б. Является анаболическим гормоном

В. Повышается при гиперплазии коры надпочечников

Г. Снижается при первичном и вторичном гипогонадизме

Д. После 60 лет происходит прогрессивное повышение в крови

15.) КОНЪЮГИРОВАННЫЙ БИЛИРУБИН В НОРМЕ В КРОВИ СОСТАВЛЯЕТ ДО:

А. 5% Б. 25% В. 50% Г. 75% Д. 100%

16.) РАННИМ ПРИЗНАКОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ:

А. Глюкозурия

Б. Нарушение глюкозотолерантного теста

В. Микроальбуминурия

- Г. Протеинурия
- 17.) АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ:
- А. Образованием антител к фосфолипидам
 - Б. Повторными тромбозами
 - В. Наличием волчаночного антикоагулянта
 - Г. Невынашиваемостью беременности
 - Д. Все перечисленное верно
- 18.) ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ:
- А. Созревание и размножение иммунокомпетентных клеток предшественников
 - Б. Антигеннезависимое формирование Т- и В-систем иммунитета
 - В. При взаимодействии с антигеном гибель незрелых лимфоцитов в результате апоптоза
 - Г. Все перечисленное
- 19.) ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ - ИНФЕКЦИИ У ВЗРОСЛЫХ:
- А. При половом контакте
 - Б. Через парентерально вводимые продукты крови
 - В. Через поврежденную кожу и слизистые оболочки
 - Д. Все перечисленное верно
- 20.) БОЛЬНОЙ ОБРАТИЛСЯ К ВРАЧУ С ЖАЛОБАМИ НА ПОСТОЯННОЕ ОТХОЖДЕНИЕ ЧЛЕНИКОВ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛЗАЮТ ИЗ КИШЕЧНИКА ПО НЕСКОЛЬКО ШТУК В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ, НЕЗАВИСИМО ОТ АКТА ДЕФЕКАЦИИ. МОЖНО ДУМАТЬ О:
- А. Дифиллоботриозе
 - Б. Тениозе
 - В. Гименолепидозе
 - Г. Тениаринхозе

Вариант 8

- 1.) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАСЧИТЫВАЮТ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
- А. Средняя арифметическая
 - Б. Допустимый предел ошибки
 - В. Критерий надежности «Т»
 - Г. Коэффициент вариации
 - Д. Все перечисленное
- 2.) ГЕМОГРАММЕ ПРИ ОСТРОМ ЛЕЙКОЗЕ НЕ СВОЙСТВЕННО:
- А. Лейкоцитоз
 - Б. Бластемия
 - В. Нейтропения
 - Г. Анемия
 - Д. Тромбоцитоз
- 3.) ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ И АНЕМИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЯХ НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
- А. Сывороточного железа и ОЖСС
 - Б. Трансферрина
 - В. Эритроцитарных индексов
 - Г. Ферритина
 - Д. Ретикулоцитов
- 4.) НОРМАЛЬНОЙ СЧИТАЕТСЯ РЕАКЦИЯ КАЛА:

- А. Кислая
- Б. Нейтральная
- В. Щелочная
- Г. Резкощелочная
- Д. Правильного ответа нет

5.) СПЕКТР БЕЛКОВ МОЧИ ИДЕНТИЧЕН СПЕКТРУ БЕЛКОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ ПРИ:

- А. Высокоселективной протеинурии
- Б. Любой из названных протеинурий
- В. Умеренноселективной протеинурии
- Г. Низкоселективной протеинурии
- Д. Правильного ответа нет

6.) ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КЛУБОЧКОВ ОТМЕЧАЕТСЯ:

- А. Нарушение концентрационной способности почек
- Б. Снижение фильтрации
- В. Нарушение секреции
- Г. Нарушение реабсорбции
- Д. Нарушение всех перечисленных функций

7.) ПРИЧИНАМИ УВЕЛИЧЕНИЯ БЕЛКА В СМЖ ЯВЛЯЮТСЯ:

- А. Сдавление ликворных пространств
- Б. Распад опухолевых клеток
- В. Процессы экссудации при воспалении менингеальных оболочек
- Г. Все перечисленные факторы
- Д. Ни одна из перечисленных причин

8.) КЛЕТКИ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ МОГУТ ОБНАРУЖИВАТЬСЯ ПРИ:

- А. Склеродермии
- Б. Узелковом периартериите
- В. Ревматоидном артрите
- Г. СКВ
- Д. Всем перечисленным

9.) ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН:

- А. Присутствует при сахарном диабете 1 - го типа
- Б. Присутствует при сахарном диабете 2 — го типа
- В. Постоянно присутствует в крови
- Г. Повышается в крови больных диабетом
- Д. Все перечисленное верно

10.) ВСАСЫВАНИЮ ЖЕЛЕЗА СПОСОБСТВУЮТ:

- А. Аскорбиновая кислота
- Б. Витамин В 12
- В. Трипсин
- Г. Желчные кислоты
- Д. Витамин А

11.) АЦИДОЗ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:

- А. Повышением рН крови
- Б. Уменьшением концентрации OH^- в крови
- В. Снижением рН крови
- Г. Снижением концентрации H^+ в плазме
- Д. Уменьшением лактата крови

12.) К ОСНОВНЫМ БУФЕРНЫМ СИСТЕМАМ КРОВИ НЕ ОТНОСЯТСЯ:

- А. Бикарбонатная

- Б. Белковая
- В. Ацетатная
- Г. Фосфатная

13.) В ПЕРЕДНЕЙ ДОЛЕ ГИПОФИЗА ОБРАЗУЕТСЯ:

- А. Адреналин
- Б. Кортизол
- В. Вазопрессин
- Г. АКТГ

14.) НЕСАХАРНЫЙ ДИАБЕТ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ:

- А. Недостатке глюкагона
- Б. Увеличении соматотропного гормона
- В. Недостатке вазопрессина
- Г. Повышении секреции глюкокортикоидов
- Д. Микседеме

15.) В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПАРЕНХИМАТОЗНОЙ И ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ ИНФОРМАТИВНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ТЕСТЫ:

- А. Фракции билирубина
- Б. ЛДГ — изоферменты
- В. Аминотрансферазы
- Г. Ретикулоциты
- Д. Все перечисленное верно

16.) УРОВЕНЬ С-ПЕПТИДА ОПРЕДЕЛЯЮТ С ЦЕЛЮ:

- А. Диагностики сахарного диабета
- Б. Оценки уровня контринсулярных гормонов
- В. Характеристики гликозилирования плазменных белков
- Г. Оценки поражения сосудов
- Д. Оценки инсулинсинтезирующей функции поджелудочной железы

17.) ТРОМБОФИЛИИ - ЭТО:

- А. Наклонность к тромбогенезу
- Б. Повышение вязкости крови
- В. Усиление агрегации тромбоцитов
- Г. Снижение антикоагулянтного потенциала
- Д. Все перечисленное верно

18.) К ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ ОРГАНАМ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСЯТСЯ:

- А. Миндалины
- Б. Лимфатические узлы
- В. Селезёнка
- Г. Пейеровы бляшки
- Д. Всё перечисленное верно

19.) ВИЧ - ИНФЕКЦИЯ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ:

- А. Трансфузионным путем
- Б. Воздушно - капельным путем
- В. От заболевшей матери к плоду
- Г. Инъекционным путем
- Д. Половым путем

20.) У РЕБЕНКА В КАЛЕ ОБНАРУЖЕНЫ ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ БЕСЦВЕТНЫЕ, ПРОЗРАЧНЫЕ ЯЙЦА С ДВУХКОНТУРНОЙ ОБОЛОЧКОЙ. МЕЖДУ НАРУЖНОЙ И \ ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКОЙ ВИДНЫ ИЗВИВАЮЩИЕСЯ НИТИ-ФИЛАМЕНТЫ. В ЦЕНТРЕ РАСПОЛОЖЕНЫ 3 ПАРЫ КРЮЧЬЕВ. ОБНАРУЖЕННЫЕ ЯЙЦА ОТНОСЯТСЯ К:

- А. Аскариде

- Б. Власоглаву
- В. Бычьему цепню
- Г. Карликовому цепню

Вариант 9

- 1.) ПРИ РАБОТЕ С КОНТРОЛЬНОЙ СЫВОРОТКОЙ ПОГРЕШНОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ:
 - А. Использование контрольной сыворотки в качестве калибратора
 - Б. Несоблюдение времени растворения пробы
 - В. Хранение контрольной сыворотки при комнатной температуре
 - Г. Многократное замораживание контрольной сыворотки
 - Д. Все перечисленное
- 2.) ПОНЯТИЮ "МАКРОФАГ" ОТВЕЧАЕТ СЛЕДУЮЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
 - А. Беззернистые клетки крови, ядро лапчатое, неопределенной формы
 - Б. Зернистые клетки крови, способные захватывать бактерии
 - В. Мононуклеарный фагоцит, способный захватывать и переваривать инородные частицы и микробы
 - Г. Клетки крови, способные захватывать лейкоциты
 - Д. Все перечисленное
- 3.) КАКОЙ ИЗ ПРИЗНАКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩИМ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ И ТАЛАССЕМИИ:
 - А. Гипохромия и микроцитоз эритроцитов
 - Б. Наличие эритрокариоцитов (нормобластоз) в крови
 - В. Ретикулоцитоз выше 2%
 - Г. Гипербилирубинемия, желтушность кожных покровов
 - Д. Базофильная пунктация и мишеневидность эритроцитов
- 4.) НОРМАЛЬНУЮ РЕАКЦИЮ КАЛОВЫХ МАСС ОБУСЛОВЛИВАЕТ:
 - А. Белковая пища
 - Б. Жизнедеятельность нормальной бактериальной флоры толстой кишки
 - В. Жиры
 - Г. Углеводы
 - Д. Все перечисленное
- 5.) ПРОТЕИНУРИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПОРАЖЕНИЯ:
 - А. Клубочков почек
 - Б. Организма
 - В. Канальцев почек
 - Г. Мочевыводящих путей
 - Д. Всего перечисленного
- 6.) НАЛИЧИЕ ЦИЛИНДРОВ И ИХ КОЛИЧЕСТВО В МОЧЕ:
 - А. Соответствует содержанию белка в моче
 - Б. Не соответствует содержанию белка в моче
 - В. Соответствует степени поражения почек
 - Г. Зависит от вида протеинурии
 - Д. Правильного ответа нет
- 7.) УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В ЛИКВОРЕ СНИЖАЕТСЯ ПРИ:
 - А. Опухолях мозга
 - Б. Травмах мозга
 - В. Менингитах
 - Г. Всех перечисленных заболеваний
 - Д. Не меняется никогда

8.) ДЛЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРЕН:

- А. Медленный рост
- Б. Экспансивный рост
- В. Инфильтративный рост
- Г. Ни один из перечисленных факторов
- Д. Все перечисленное характерно

9.) НАРУШЕНИЕ ВОДНОГО БАЛАНСА МОЖЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЕМ:

- А. Гематокрита
- Б. Гемоглобина
- В. КОС
- Г. Общего белка
- Д. Всего перечисленного

10.) ИСТОЧНИКОМ ЖЕЛЕЗА ПЛАЗМЫ КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ:

- А. Железо, всосавшееся из ЖКТ
- Б. Железо разрушенных эритроцитов
- В. Депонированное железо
- Г. Все перечисленное верно
- Д. Правильного ответа нет

11.) АЛКАЛОЗ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:

- А. Снижением рН крови
- Б. Уменьшением концентрации OH^- в крови
- В. Увеличением лактата в крови
- Г. Повышением рН крови
- Д. Повышением концентрации H^+ крови

12.) КОМПЕНСАЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО АЦИДОЗА МОЖЕТ ПРОИСХОДИТЬ ПУТЕМ:

- А. Задержки выведения CO_2 легкими
- Б. Гипервентиляции
- В. Повышения pCO_2
- Г. Усиления выведения бикарбоната почками
- Д. Снижения выведения хлоридов

13.) В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ОБРАЗУЮТСЯ:

- А. Трийодтиронин, тироксин
- Б. Тиреотропный гормон
- В. Тиреолиберин
- Г. АКТГ
- Д. Меланин

14.) ТИРЕОТРОПНЫЙ ГОРМОН ПОВЫШЕН ПРИ:

- А. Нелеченном тиреотоксикозе
- Б. Гипоталамо-гипофизарная недостаточности при опухоли гипофиза
- В. Первичном гипотиреозе
- Г. Травме гипофиза
- Д. Лечении гормонами щитовидной железы

15.) В МОЧЕ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА СОДЕРЖИТСЯ:

- А. Биливердин
- Б. Стеркобилиноген
- В. Билирубин

16.) УРОВЕНЬ ГЛИКИЛИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА ОТРАЖАЕТ:

- А. Степень ишемии тканей при диабете
- Б. Тяжесть поражения печени

- В. Выраженность диабетических ангиопатий
 - Г. Суммарную степень нарушения углеводного обмена в течение 6-8 недель,
предшествующих исследованию
 - Д. Уровень гипергликемии после приема пищи
- 17.) КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГЕМОСТАЗА ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ:
- А. Исследование тромбоцитарно — сосудистого звена
 - Б. Исследование плазменного звена
 - В. Исследование фибринолитической системы
 - Г. Исследование антикоагулянтного потенциала
 - Д. Все перечисленное верно
- 18.) Т- ЛИМФОЦИТЫ ЧЕЛОВЕКА ПРОИСХОДЯТ ИЗ:
- А. Унипотентного предшественника Т-лимфоцитов костного мозга с последующим созреванием в тимусе
 - Б. Колониеобразующей гранулоцитарно - макрофагальной единицы селезенки.
 - В. Лимфоцитов лимфы
 - Г. Клеток селезенки
- 19.) ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А ПЕРЕДАЕТСЯ:
- А. Фекально-оральным путем
 - Б. При гемотрансфузиях
 - В. При сексуальных контактах
 - Д. Всеми перечисленными путями
- 20.) У БОЛЬНОГО ПОСЛЕ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ ПРИ ПРОМЫВКЕ ИСПРАЖНЕНИЙ ОБНАРУЖЕНА ЦЕСТОДА ДЛИНОЙ ОКОЛО 3 МЕТРОВ. ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ГОЛОВКИ ПАРАЗИТА ОБНАРУЖЕНЫ 4 ПРИСОСКИ И ВЕНЧИК ИЗ 22-23 КРЮЧЬЕВ. В КОРОТКИХ ЧЛЕНИКАХ - ОТ 8 ДО 12 БОКОВЫХ ОТВЕТВЛЕНИЙ МАТКИ. У ДАННОГО БОЛЬНОГО ИМЕЕТСЯ:
- А. Тениаринхоз
 - Б. Дифиллоботриоз
 - В. Тениоз
 - Г. Гименолепидоз

Вариант 10

- 1.) КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА - ЭТО:
- А. Перечень нормативных величин
 - Б. Порядок манипуляций при проведении анализа
 - В. Схема расчета результатов
 - Г. Графическое изображение измеряемых величин по мере их получения
 - Д. Все перечисленное
- 2.) ГЕМОГРАММА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЛИМФОЛЕЙКОЗЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ПРИЗНАКАМИ, КРОМЕ:
- А. Абсолютный лимфоцитоз
 - Б. Относительная нейтропения
 - В. Нейтрофилез
 - Г. Клетки цитолита
 - Д. Нормохромная анемия
- 3.) АГРАНУЛОЦИТОЗ МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ПРИ:
- А. Инфекционных заболеваниях

- Б. Гиперчувствительности к лекарственным препаратам
- В. Аутоиммунных процессах
- Г. Лучевой болезни
- Д. Все перечисленное верно

4.) НА ПРЕПАРАТЕ С РАСТВОРОМ ЛЮГОЛЯ ИДЕНТИФИЦИРУЮТ:

- А. Крахмал
- Б. Йодофильную флору
- В. Лейкоциты, эозинофилы, цилиндрический эпителий
- Г. Простейшие кишечника и яйца гельминтов
- Д. Все перечисленное

5.) НОРМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭРИТРОЦИТОВ В 1 МЛ МОЧИ ПО МЕТОДУ НЕЧИПОРЕНКО СОСТАВЛЯЕТ ДО:

- А. 1000
- Б. 4000
- В. 6000
- Г. 10000

6.) ЦИЛИНДРЫ НЕ ОБРАЗУЮТСЯ И БЫСТРО РАЗРУШАЮТСЯ ПРИ PH МОЧИ:

- А. Кислой (pH 5.5 - 6.5)
- Б. Нейтральной (pH 7)
- В. Резкокислой (pH 4.5 - 5)
- Г. Растворение не зависит от кислотности
- Д. Щелочной (pH 8-10)

7.) ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА НЕОБХОДИМО ПОДСЧИТАТЬ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КЛЕТОК В ЛИКВОРЕ НЕ ПОЗДНЕЕ:

- А. 30 минут после пункции
- Б. 60 минут после пункции
- В. 20 минут после пункции
- Г. 45 минут после пункции

8.) ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ДЛЯ КЛЕТОК ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ:

- А. Нарушение дифференцировки
- Б. Полиморфизм
- В. Анизохромия
- Г. Все перечисленные признаки
- Д. Ни один из перечисленных признаков

9.) НАИБОЛЬШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ КАЛИЯ ОТМЕЧАЕТСЯ В:

- А. Межклеточной жидкости
- Б. Кардиомиоцитах
- В. Плазме крови
- Г. Ликворе

10.) ДИАГНОСТИКА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ОСНОВАНА НА ОПРЕДЕЛЕНИИ:

- А. Железа плазмы крови
- Б. Растворимых трансферриновых рецепторов и ОЖСС
- В. Гипохромии эритроцитов
- Г. Концентрации ферритина в сыворотке
- Д. Всех перечисленных показателей

11.) РЕСПИРАТОРНЫЙ АЛКАЛОЗ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ:

- А. Гипервентиляции легких
- Б. Вливании содовых растворов
- В. Обильной рвоте
- Г. Гиповентиляции легких
- Д. Опухоли трахеи

12.) ПОКАЗАТЕЛЬ pO_2 ОТРАЖАЕТ:

- А. Общее содержание кислорода в крови
- Б. Связанный с гемоглобином кислород
- В. Фракцию растворенного кислорода
- Г. Насыщение гемоглобина кислородом
- Д. Все перечисленное верно

13.) УВЕЛИЧЕНИЕ КАТЕХОЛАМИНОВ, ПРИВОДЯЩЕЕ К ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ КРИЗАМ, ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ:

- А. Феохромацитоме
- Б. Болезни Иценко-Кушинга
- В. Микседеме
- Г. Акромегалии

14.) ОБЩИЙ ТИРОКСИН ПОВЫШЕН ПРИ:

- А. Микседеме
- Б. При лечении трийодтиронином
- В. Гипертиреозе
- Г. Значительном дефиците йода

15.) ПРИ ХОЛЕСТАЗЕ НАИБОЛЬШЕЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИЧНОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

- А. Холинэстеразе
- Б. ЛДГ
- В. Щелочной фосфатазе
- Г. Аминотрансферазе

16.) ОСЛОЖНЕНИЯМИ САХАРНОГО ДИАБЕТА МОГУТ БЫТЬ:

- А. Кетоацидоз
- Б. Гиперосмолярная кома
- В. Гипогликемическая кома
- Г. Лактацидоз
- Д. Все ответы правильные

17.) ГЕМОРРАГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (СИНДРОМАМИ) СЧИТАЮТСЯ:

- А. Заболевания, сопровождающиеся кровоточивостью
- Б. Снижение фибринолитической активности
- В. Повышение продукции фактора Виллебранда

18.) К ФАКТОРАМ ГУМОРАЛЬНОЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОТНОСЯТ ВСЕ, КРОМЕ:

- А. Антитела
- Б. Интерфероны
- В. Белки острой фазы
- Г. Лизоцим
- Д. Система комплемента

19.) ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ:

- А. Фекально-оральным путем
- Б. При гемотранфузиях
- В. От матери к ребенку

20.) В ИСПРАЖНЕНИЯХ ОБНАРУЖЕНЫ ЯЙЦА НЕМАТОД, ФОРМА ЯИЦ ОВАЛЬНАЯ, ВСТРЕЧАЮТСЯ И ШАРОВИДНЫЕ. У ОДНИХ ИЗ НИХ ОБОЛОЧКА ФЕСТОНЧАТАЯ, ОКРАШЕНА В ТЕМНО-ЖЕЛТЫЙ ИЛИ КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ, НЕПРОЗРАЧНАЯ. У ДРУГИХ — ОБОЛОЧКА ГЛАДКАЯ, ДВУХКОНТУРНАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ И БЕСЦВЕТНАЯ. ВНУТРИ ЯЙЦА ВИДЕН БЛАСТОМЕР, МЕЖДУ КРАЯМИ КОТОРОГО И ПОЛЮСАМИ ЯДРА ВИДНО СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО. ОБНАРУЖЕНЫ ЯЙЦА НЕМАТОД:

- А. Анкилостоматид

Б. Аскард
В. Власоглава
Г. Остриц

