

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Кафедра акушерства и гинекологии № 2**

ЭТАЛОНЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

по дисциплине «Врачебные манипуляции»
для ординаторов 1-го года обучения
по специальности 31.08.01 «Акушерство и гинекология»

- 1). Дополнительным методом исследования в гинекологии является:
 - А) сбор анамнеза
 - Б) осмотр шейки матки в зеркалах
 - В) бимануальное исследование
 - Г) кольпоскопия

- 2). Для определения проходимости маточных труб применяют:
 - А) биопсию шейки матки
 - Б) гистеросальпингографию
 - В) зондирование полости матки
 - Г) пункцию брюшной полости через задний влагалищный свод

- 3). Для определения функции яичников применяют:
 - А) тесты функциональной диагностики
 - Б) лапароскопию
 - В) кольпоскопию
 - Г) взятие мазков на онкоцитологию

- 4). Эндоскопические методы исследования в гинекологии:
 - А) аспирационная биопсия эндометрия
 - Б) гистеросальпингография
 - В) биопсия шейки матки
 - Г) кольпоскопия

- 5). Мазок на кольпоцитологию берут для диагностики:
 - А) кольпита
 - Б) рака тела матки
 - В) эндометрита
 - Г) гипофункция яичников

- 6). Раздельное диагностическое выскабливание показано при подозрении на:
 - А) седловидную матку
 - Б) миому матки
 - В) эндометрит
 - Г) рак эндометрия

7). При подозрении на прервавшуюся внематочную беременность проводят:

- А) кульдоцентез
- Б) ГСГ
- В) зондирование полости матки
- Г) аспирационную биопсию эндометрия

8). Кюретка—это инструмент, применяющийся для:

- А) зондирования полости матки
- Б) выскабливания полости матки
- В) кульдоцентеза
- Г) кольпоскопии

9). Взятый при биопсии шейки матки материал направляется на:

- А) бактериоскопическое исследование
- Б) цитологическое исследование
- В) гистологическое исследование
- Г) бактериологическое исследование

10). Для пробы Шиллера необходимо приготовить:

- А) раствор Люголя
- Б) раствор фурацилина
- В) 3% раствор перекиси водорода
- Г) 70⁰ спирт

11). Кольпоскопию используют для диагностики:

- А) рака эндометрия
- Б) эндометрита
- В) рака шейки матки
- Г) рака яичника

12). При подготовке гинекологических больных к трансабдоминальному УЗИ необходимо:

- А) опорожнить мочевой пузырь
- Б) наполнить мочевой пузырь
- В) сделать очистительную клизму
- Г) провести влагалищную ванночку

13). Для ГСГ необходимо приготовить:

- А) физ. раствор
- Б) 3% раствор уксусной кислоты
- В) раствор Люголя
- Г) рентгеноконтрастное вещество

14). Мазки на гонорею берут:

- А) из уретры и цервикального канала
- Б) из бокового свода влагалища
- В) из заднего свода влагалища
- Г) из уретры

15). Бактериоскопическое исследование материала из заднего свода влагалища используется для диагностики:

- А) гонореи

- Б) хламидиоза
- В) сифилиса
- Г) степени чистоты влагалища

16). Мазки на онкоцитологию берут из:

- А) шейки, цервикального канала
- Б) заднего свода влагалища
- В) бокового свода влагалища
- Г) прямой кишки

17). Инструмент, с помощью которого уточняется положение матки, называется:

- А) кюретка
- Б) ложечка Фолькмана
- В) желобоватый зонд
- Г) маточный зонд

18). Пункция брюшной полости через задний влагалищный свод:

- А) лапароскопия
- Б) кульдоцентез
- В) гистероскопия
- Г) кольпоскопия

19). Для взятия биопсии шейки матки используются:

- А) шприц Брауна
- Б) ложечка Фолькмана
- В) конхотом
- Г) цитощетка

20). Метод восстановления проходимости маточных труб называется:

- А) гидротубация
- Б) ГСГ
- В) кольпоскопия
- Г) гистероскопия

21). Мазки на бактериологическое исследование у гинекологических больных берут из:

- А) заднего свода влагалища
- Б) цервикального канала
- В) уретры
- Г) прямой кишки

22). Для выявления патологии эндометрия используется:

- А) кольпоскопия
- Б) гистероскопия
- В) лапароскопия
- Г) кульдоцентез

23). При воспалительных заболеваниях половых органов применяют:

- А) онкоцитологическое исследование
- Б) кольпоцитологическое
- В) бактериологическое
- Г) гистологическое

- 24). Признаком отделения плаценты от стенки матки является
- округлая форма матки
 - втягивание пуповины во влагалище при надавливании ребром ладони над лонным сочленением
 - удлинение наружного отрезка пуповины
 - передача дыхательных движений на пуповину
 - флюктуация пуповины при поколачивании по дну матки
- 25). К операции ручного отделения плаценты и выделения последа следует приступить
- при наличии признаков отделения плаценты и появлении кровотечения
 - при отсутствии признаков отделения плаценты и появлении кровотечения
 - при отсутствии признаков отделения плаценты в течение 15 минут
 - при наличии признаков отделения плаценты в течение 30 минут
 - при наличии признаков отделения плаценты в течение 1 часа
- 26). Акушерское пособие (защита промежности) проводится с целью
- сохранения нормального биомеханизма родов и предупреждение травматизма матери и плода
 - обеспечения постепенности прорезывания головки
 - выведения головки наименьшей окружностью
 - содействия освобождению головки и плечиков
 - уменьшения напряжения тканей промежности
- 27). Оценка новорожденного по шкале АПГАР
- построена на анализе 5 показателей
 - включает данные о КОС
 - позволяет судить о степени гипотрофии
 - проводится однократно в первую минуту после рождения
 - определяется при ежедневном осмотре педиатра
- 28). При оценке состояния новорожденного по шкале АПГАР учитываются
- масса тела, длина, срок гестации
 - частота сердечных сокращений и дыхания, окраска кожных покровов, рефлексы, мышечный тонус
 - частота сердечных сокращений и дыхания, окраска кожных покровов
 - сознание, степень депрессии
 - частота сердечных сокращений, общее состояние
- 29) Зондирование матки служит для выявления:
- Патологии шейки матки
 - Состояния придатков матки
 - Измерения длины и определение конфигурации полости матки
 - Состояния мочевого пузыря и прямой кишки
- 30) Раннюю амниотомию производят при:
- преждевременных родах;
 - анатомически узком тазе;
 - тазовомпредлежании плода;
 - плоском плодном пузыре;
 - многоплодной беременности.

31) Пособие по Цовьянову I применяют при следующем предлежании плода:

- а. чистом ягодичном;
- б. смешанном ягодичном;
- в. полном ножном;
- г. неполном ножном;
- д. при всех перечисленных.

32) Классическое ручное пособие применяется при следующем варианте тазового предлежания плода:

- а. смешанном ягодичном;
- б. полном ножном;
- в. неполном ножном;
- г. при всех перечисленных;
- д. ни при каком из перечисленных.

33) Какое из условий не позволяет произвести операцию наложения акушерских щипцов?

- а. живой плод;
- б. раскрытие шейки матки на 4 см;
- в. отсутствие плодного пузыря;
- г. головка в широкой части полости таза.

34) Правила введения ложек акушерских щипцов следующие:

- а. левую ложку держат правой рукой и вводят в правую половину таза матери;
- б. правую ложку держат левой рукой и вводят в левую половину таза матери;
- в. все перечисленное правильно;
- г. все перечисленное неправильно.

35) При наложении выходных акушерских щипцов ложки должны лечь на головку плода:

- а. в правом косом размере;
- б. в поперечном размере;
- в. в прямом размере;
- г. верно все перечисленное.

36) Во время влечения головки в акушерских щипцах тракции должны быть:

- а. периодически вращательными;
- б. периодически качательными;
- в. периодически в виде рывков;
- г. верно все перечисленное;
- д. ничего из перечисленного.