

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

КАФЕДРА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ №3

ГЛОССАРИЙ

ВЛАДИКАВКАЗ, 2020

ГЛОССАРИЙ

А

абдоминальный (abdominalis; лат. abdomen, abdominis живот) - брюшной, относящийся к животу.

абдомино (лат. abdomen, abdominis живот) - составная часть сложных слов, означающая "относящийся к животу, к брюшной полости".

абсолютно экстремальная зона - см. *Суперэкстремальная зона*.

абсорбция (лат. absorptio поглощение) - поглощение газа или растворенного вещества жидкостью или твердым телом; А. газов лежит в основе газообмена между организмом и окружающей средой.

абстиненция (лат. abstinentia воздержание; син. синдром абстинентный-состояние, возникающее в результате внезапного прекращения приема (введения) веществ, вызвавших токсикоманическую зависимость, или после введения их антагонистов; характеризуется психическими, вегетативно-соматическими и неврологическими расстройствами; клиническая картина и течение А. зависят от типа вещества, дозы и продолжительности его употребления.

абсцесс (abscessus; лат., от abscedo, abscessum отделяться, нарывать; син.: апостема, гнойник, нарыв) - полость, заполненная гноем и отграниченная от окружающих тканей и органов пиогенной мембраной.

абсцесс амёбный (а. amebicus) - А. печени или головного мозга (реже других органов) при амёбиазе, вызванный гематогенной диссеминацией *Entamoeba histolytica* или ее контактным проникновением в соседние органы; часто бывает множественным.

абсцесс аноректальный (а. anorectalis) - А., локализующийся в клетчатке, окружающей анальную часть прямой кишки и задний проход; возникает при подкожном или подслизистом парапроктите.

абсцесс апикальный (а. apicalis) - А., локализующийся в области верхушки корня зуба; возникает при остром или обострившемся верхушечном периодонтите.

абсцесс аппендикулярный (а. appendicularis) -- А., локализующийся в полости брюшины или в ретроцекальной клетчатке и возникающий как осложнение острого аппендицита.

абсцесс асептический (а. asepticus) - А., развивающийся в результате попадания в ткань веществ, способных вызвать нагноение без участия возбудителей гнойной инфекции.

абсцесс головного мозга травматический (а. cerebri traumaticus) - А. г.м., развивающийся в результате инфицирования и нагноения тканей мозга, поврежденных при черепно-мозговой травме.

абсцесс забрюшинный (а. retroperitonealis) - А., локализующийся в забрюшинном пространстве; возникает при панкреатите, повреждениях задней стенки двенадцатиперстной кишки, паранефритах и т. д.

абсцесс заглоточный (a. retropharyngeus; син.: А. позадиглоточный, А. ретрофарингеальный) -- А., локализующийся в заглоточном пространстве.

абсцесс заглоточный острый (a. retropharyngeus acutus) -- А. з., развивающийся в результате распространения возбудителей инфекции при острых воспалительных процессах в носоглотке и задних отделах носа (гл. обр. у детей), а также при травмах задней стенки глотки.

авитаминоз (avitaminosis; a- + витамин + -оз) -- разновидность витаминной недостаточности, характеризующаяся практически полным отсутствием поступления витамина в организм.

автоклав (авто- + лат. clavis ключ) в медицине -- см. *Стерилизатор паровой*.

агглютинат (лат. agglutino, agglutinatum склеивать) -- осадок, образующийся в процессе агглютинации.

агглютинация (лат. agglutinatio склеивание) - склеивание и выпадение в осадок взвешенных частиц - бактерий, эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, клеток тканей, а также поверхностно-активных частиц с адсорбированными на них антигенами и антителами.

аглоссия (aglossia; a- + греч. glossa язык) - аномалия развития: отсутствие языка; обычно сопровождается другими аномалиями развития в области лица.

адинамия (греч. adynamia бессилие) - уменьшение или полное прекращение двигательной активности организма или отдельного органа.

адреналин (adrenalinum; анат. adrenalis надпочечниковый, относящийся к надпочечнику; син. эпинефрин) - гормон мозгового вещества надпочечников и вненадпочечниковой хромаффинной ткани; активирует выделение рилизинг-гормонов гипоталамуса; обладает выраженным кардиотоническим, прессорным, гипергликемическим и пирогенным действием, вызывает сужение сосудов кожи, почек, расширяет коронарные сосуды, сосуды скелетных мышц, гладкой мускулатуры, бронхов, желудочно-кишечного тракта и т. д.

адреноблокаторы - см. *Адреноблокирующие средства*.

адреноблокирующие средства (син.: адреноблокаторы, адренолитики, адренолитические средства) - лекарственные средства из группы антиадренергических средств, препятствующие взаимодействию медиатора с адренорецепторами без нарушения процесса образования медиатора и выделения его из нервных окончаний.

адреномиметики (adrenomimetica) -- см. *Адреномиметические средства*.

адреномиметические средства (adrenomimetica; адрено- + греч. Mimetikos способный к подражанию, подражающий; син. адреномиметики) - лекарственные средства с различным механизмом действия, вызывающие физиологические эффекты, характерные для возбуждения адренорецепторов.

адренорецепторы (адрено- + рецепторы; син.: адренореактивные структуры, рецепторы адренергические, системы адренореактивные) - биохимические структуры клеток, взаимодействующие с адренергическими медиаторами (норадреналином, адреналином, дофамином) и преобразующие энергию этого

взаимодействия в энергию специфического эффекта (нервного импульса, мышечного сокращения).

альдостерон (aldosteronum) - стероидный гормон клубочковой зоны коркового вещества надпочечников, оказывающий определяющее влияние на обмен натрия.

ампутация (лат. amputatio отсечение) - хирургическая операция отсечения конечности или периферической ее части с пересечением (перепиливанием, перекусыванием) костей или удаления органа (полового члена, матки, молочной железы).

аналгезирующие средства (analgetica; *ан-* + греч. algesis ощущение боли; син.: анальгетики, болеутоляющие средства) - лекарственные средства, избирательно ослабляющие или устраняющие боль (напр., морфин, промедол, амидопирин, ацетилсалициловая кислота).

аналгезия (analgesia; *ан-* + греч. algesis ощущение боли) -- 1) см. *Аналгия*; 2) (син. обезболивание) - ослабление болевой чувствительности в результате фармакологического или иного воздействия, как правило, не приводящего к подавлению других видов чувствительности.

аналептики (analeptica; греч. analeptikos восстанавливающий, укрепляющий) -- см. *Аналептические средства*.

Б

бокс индивидуальный (син. мельцеровский бокс) -- Б. для полной индивидуальной изоляции больных, имеющий отдельный вход в здание (через тамбур-предбоксник), санитарный узел и шлюз для персонала, сообщающийся с общим коридором отделения.

болезнь (morbus) -- 1) существуют различные определения понятия "болезнь"; одно из возможных может быть сформулировано так: болезнь -- это жизнь, нарушенная в своем течении повреждением структуры и функций организма под влиянием внешних и внутренних факторов при реактивной мобилизации в качественно-своеобразных формах его компенсаторно-приспособительных механизмов; болезнь характеризуется общим или частичным снижением приспособительности к среде и ограничением свободы жизнедеятельности больного; 2) (син. заболевание -- нрк) -- общее название конкретных нозологических единиц.

брадикардия (bradycardia; *бради-* + греч. kardia сердце) -- пониженная частота сердечных сокращений.

брадипноэ (bradypnoe; *бради-* + греч. pnoe дыхание) -- редкое дыхание (с частотой 12 и менее дыхательных актов в 1 мин.); наблюдается при пониженной возбудимости дыхательного центра или при уменьшении его стимуляции.

В

васкулит (vasculitis; лат. vasculum уменьшит, от vas сосуд + -it; син. ангиит) - воспаление стенок кровеносных сосудов.

вена (-ы) (vena, -ae, PNA, BNA, JNA, LNH) -- кровеносные сосуды, несущие кровь из органов и тканей к сердцу.

вирус (-ы) (лат. virus яд) -- неклеточные формы жизни, обладающие геномом (ДНК или РНК), но лишенные собственного синтезирующего аппарата и способные к воспроизведению лишь в клетках более высокоорганизованных существ.

возбудимость -- способность специализированной ткани (нервной, мышечной, железистой) отвечать реакцией возбуждения на раздражение.

возбудитель инфекции (син.: заразное начало, инфект) -- общее название микроорганизмов, внедрение которых в организм человека или животного сопровождается развитием инфекционного процесса.

волдырь (urtica) -- первичный морфологический элемент кожной сыпи в виде внезапно возникающего, слегка возвышающегося, четко отграниченного бесполостного образования при остром ограниченном отеке сосочкового слоя дермы.

воспаление (inflammatio) -- защитно-приспособительная реакция целостного организма на действие патогенного раздражителя, проявляющаяся развитием на месте повреждения ткани или органа изменений кровообращения и повышения сосудистой проницаемости в сочетании с дистрофией тканей и пролиферацией клеток.

Г

гемоглобин (haemoglobinum; Hb; гемо- + лат. globus шарик) - дыхательный пигмент, содержащийся в эритроцитах крови человека, позвоночных животных и некоторых беспозвоночных, осуществляющий перенос кислорода из легких в ткани и участвующий в переносе углекислого газа из тканей в легкие; представляет собой сложный белок, состоящий из гема и белка глобина, связанных между собой через радикал гистидинового остатка белка и атом железа гема.

гемолиз (haemolysis; гемо- + греч. lysis распад, разрушение; син.: гематолиз - устар., эритроцитоллиз) -- разрушение эритроцитов с выходом гемоглобина в окружающую эритроциты среду.

геморрагический (haemorrhagicus; греч. haimorrhagia кровотечение) - кровоточивый, сопровождающийся кровотечением, приводящий к кровотечению.

геморрагия (haemorrhagia; греч. haimorrhagia кровотечение, геморрагия, от гемо- + rhagos разорванный, прорванный) -- 1) см. *Кровоизлияние*; 2) см. *Кровотечение*.

Д

дезинсекция (дез- + лат. insectum насекомое) -- уничтожение членистоногих, являющихся переносчиками возбудителей инфекционных и

инвазионных болезней, причиняющих материальный ущерб, или по санитарно-гигиеническим показаниям.

дезинтоксикация (дез- + интоксикация) - комплекс реакций организма, направленных на уменьшение биологической активности и концентрации ядов, а также на нормализацию нарушенных ими структур и функций.

дезинфекция (дез- + инфекция; син. обеззараживание) -- уничтожение возбудителей инфекционных болезней в окружающей среде.

дезинфекция биологическая -- Д. объектов окружающей среды, основанная на использовании биологических процессов, протекающих в естественных условиях.

дезинфекция влажная -- Д., проводимая с использованием растворов, эмульсий или суспензий дезинфицирующих средств.

дезинфекция газовая -- Д., проводимая путем введения в воздушную среду газообразных дезинфицирующих средств (бромистого метила, окиси этилена и др.).

дезинфекция заключительная -- Д. в эпидемическом очаге, проводимая после госпитализации, выздоровления или смерти больного.

дезинфекция профилактическая -- Д., проводимая независимо от наличия инфекционных заболеваний с целью предупредить появление и распространение возбудителей инфекции в окружающей среде.

дезинфекция текущая -- Д. выделений инфекционного больного и предметов, находящихся в его пользовании, проводимая на всем протяжении болезни.

дезинфицирующие средства (син. дезинфекционные средства) -- средства, применяемые для уничтожения возбудителей инфекционных болезней в окружающей среде; различают физические (термические, радиационные и др.) и химические Д. с.

дерма (dermis, corium, PNA, LNH; греч. derma кожа; син. Собственно кожа) - соединительнотканная часть кожи; состоит из сосочкового и сетчатого слоев.

дерматит (dermatitis; дермат- + -ит; син. дерматит контактный) -- воспаление кожи, обусловленное (в отличие от токсидермии) непосредственным воздействием на нее патогенного фактора (физического, химического и т. п.); иногда термин Д. используется как общее название всех форм воспаления кожи.

дыхание (respiratio) -- совокупность процессов, осуществляющихся благодаря функции различных органов и систем, обеспечивающих поступление в организм кислорода из окружающей среды, использование его в биологическом окислении и удаление из организма продукта окисления -- углекислого газа; совокупность дыхательных движений.

дыхание внешнее (r. externa) -- совокупность процессов газообмена, осуществляемая благодаря функции дыхательных мышц, бронхолегочного аппарата и системной регуляции, обеспечивающая вентиляцию легочных альвеол и диффузию газов через альвеолокапиллярные мембраны.

дыхание клеточное -- см. *Дыхание тканевое*.

дыхание кожное (r. cutanea) -- Д., осуществляемое путем диффузии газов через поверхность тела.

дыхание тканевое (син. Д. клеточное) -- совокупность процессов Д. в тканях живого организма, представляющих собой аэробные окислительно-восстановительные реакции, приводящие к высвобождению энергии, используемой организмом.

дыхание агональное (г. agonalis; син.: Д. терминальное, "гаспинг-дыхание") -- патологическое Д., характеризующееся редкими, короткими и глубокими, судорожными дыхательными движениями; возникает при крайне тяжелых состояниях организма, обычно сопровождающихся выраженной гипоксией головного мозга.

дыхание брюшное (г. abdominalis; син. Д. диафрагмальное) -- Д., осуществляемое преимущественно за счет сокращения диафрагмы и брюшных мышц.

дыхание внутриутробное (г. fetalis) -- совокупность периодических рефлекторных дыхательных движений плода, производимых при закрытой голосовой щели; способствует усилению притока крови к сердцу.

дыхание грудное (г. thoracalis) -- Д., осуществляемое преимущественно за счет сокращения наружных и внутренних межреберных мышц.

дыхание короткое -- патологическое Д., характеризующееся уменьшением дыхательного объема, затруднением и удлинением вдоха и укорочением выдоха; обусловлено нарушениями растяжения легочной ткани при фиброзе легкого, большом плевральном выпоте и т. д.

дыхание патологическое (г. pathologica) -- общее название нарушений Д. с изменением ритма и глубины дыхательных движений, возникающих при различных патологических процессах в организме.

дыхание поверхностное (г. superficialis) -- патологическое Д., характеризующееся малым дыхательным объемом.

дыхание саккадированное (франц. saccade прерывистый; син. Д. прерывистое) -- патологическое Д., характеризующееся прерывистым (ступенчатым) вдохом, реже выдохом; возникает при поражении дыхательных мышц или болях в груди, связанных с дыханием

дыхание бронхиальное (г. bronchialis) -- громкое Д., характеризующееся преобладанием длительности шума выдоха над длительностью шума вдоха и напоминающее по тембру протяжно произносимый звук х"; выслушивается при наличии крупных инфильтратов или полостей, при компрессии легкого, а в нормальных условиях только над гортанью, трахеей и крупными бронхами.

дыхание везикулярное (г. vesicularis) -- Д., характеризующееся нежным равномерным шумом на всем протяжении вдоха и коротким шумом в самом начале выдоха; в норме выслушивается над периферическими участками легких.

дыхание жесткое -- везикулярное Д. с изменением тембра и равной длительностью вдоха и выдоха; выслушивается при бронхитах, пневмонии, пневмосклерозе.

дыхание пуэрильное (г. puerilis; лат. puerilis детский) -- везикулярное Д. у детей в возрасте от 1 года до 7 лет, отличающееся усиленным и удлиненным шумом выдоха.

дыхание стенотическое (r. stenotica; греч. stenosis сужение) - разновидность шумного Д. с обилием хрипов; наблюдается при сужении верхних дыхательных путей в результате отека, наличия опухоли, инородного тела

дыхание шумное -- Д., характеризующееся слышимостью дыхательных шумов на расстоянии, напр. дыхание Куссмауля.

дыхание управляемое -- искусственная вентиляция легких с помощью автоматически регулируемых аппаратов, обеспечивающая создание оптимальных условий газообмена после прекращения самостоятельного дыхания или его недостаточности.

дыхательная недостаточность (insufficiencia respiratoria) - патологическое состояние организма, при котором не обеспечивается поддержание нормального газового состава крови или оно достигается за счет напряжения компенсаторных механизмов внешнего дыхания.

дыхательные пути (tractus respiratorii) -- полые органы, проводящие воздух к легочным альвеолам; разделяют верхние Д. п. (наружный нос, полость носа, глотка) и нижние Д. п. (гортань, трахея, бронхи).

Ж

Жане канюля (J. Janet) -- инструмент для промывания мочеиспускательного канала с помощью шприца Жане, представляющий собой эластичный резиновый наконечник, вводимый в наружное отверстие мочеиспускательного канала, имеющий конусное отверстие для надевания на шприц.

Жане шприц (J. Janet) -- шприц для промываний, отличающийся значительной емкостью (100--200 мл); на конце штока и на кольце, охватывающем стеклянный цилиндр, имеются припаянные кольца для удобства работы.

жаропонижающие средства (antipyretica; син. антипиретики) - лекарственные средства, снижающие температуру тела при лихорадке (ацетилсалициловая кислота, антипирин, амидопирин, фенацетин и др.).

жгут кровоостанавливающий -- приспособление из резины или других материалов для перетягивания мягких тканей конечности с целью временной остановки кровотечения сдавливанием магистральных кровеносных сосудов.

желтуха (icterus) -- окрашивание в желтый цвет слизистых оболочек, склер и кожи, обусловленное отложением в них желчных пигментов.

жизненная проба -- общее название методов определения живорожденности при судебно-медицинской экспертизе трупа новорожденного.

жизнеобеспечение -- комплекс мероприятий, направленных на создание и поддержание в некотором изолированном объеме (в кабине космического корабля, в скафандре и т. п.) условий, необходимых для сохранения жизни, здоровья и работоспособности людей; включает создание и поддержание заданного уровня барометрического давления, температуры, влажности и

химического состава искусственной атмосферы, а также водообеспечение, питание и пр.

3

заворот желудка (*torsio ventriculi*) - смещение желудка с поворотом вокруг оси малого сальника, реже вокруг поперечной оси с нарушением его проходимости и кровоснабжения.

заворот желчного пузыря (*torsio vesicae felleae*) -- смещение блуждающего желчного пузыря с поворотом вокруг его брыжейки и последующим нарушением его кровоснабжения и проходимости пузырного протока.

заворот кишок (*volvulus*) -- перекручивание петли кишки вокруг оси брыжейки с нарушением их кровоснабжения и проходимости; один из видов странгуляционной непроходимости кишечника.

заворот сальника (*torsio omenti*) - смещение большого сальника с поворотом вокруг его оси и нарушением кровообращения.

заворот средней кишки -- врожденная полная высокая непроходимость кишечника, обусловленная наличием общей дорсальной брыжейки с нарушением нормального внутриутробного вращения средней кишки.

заживление вторичным натяжением (*sanatio per secundam intentionem*; син.: З. грануляциями, З. через нагноение - устар.) - заживление раны путем постепенного заполнения раневой полости, содержащей гной, грануляционной тканью с последующей эпителизацией и образованием рубца; характерно для инфицированных или зияющих ран.

заживление первичным натяжением (*sanatio per primam intentionem*) - заживление раны путем соединения ее стенок свертком фибрина с образованием на поверхности струпа, под которым происходит быстрое замещение фибрина грануляционной тканью, эпителизация и образование узкого линейного рубца.

зажим в медицине -- инструмент для захватывания, пережатия и удерживания каких-либо объектов, имеющий две бранши, фиксируемые в рабочем положении с помощью кремальеры, пружины или винта.

замерзание -- угнетение жизненных функций вплоть до полного их исчезновения, вызванное охлаждением организма.

западение языка -- смещение корня языка к задней стенке глотки, создающее препятствие для поступления воздуха в гортань; может возникать, напр., при наркозе, коме, глубоком шоке, а также при двустороннем переломе нижней челюсти.

заражение (*infectio*) -- проникновение возбудителя инфекционной болезни в организм человека или животного, приводящее к развитию той или иной формы инфекционного процесса (болезнь, носительство возбудителей инфекций).

заторможенность моторная (син. З. двигательная) -- замедление, обеднение и однообразие движений, наблюдающееся при некоторых психопатологических состояниях.

затылочная область -- 1) (regio occipitalis, PNA, BNA, JNA) -- задняя часть лобно-теменно-затылочной области головы, соответствующая верхней половине чешуи затылочной кости до верхних выйных линий и наружного затылочного выступа; 2) (regio occipitalis) головного мозга -- часть новой коры полушария большого мозга, расположенная в затылочной доле, занимающая шпорную борозду и прилегающие к ней части клиновидной и медиальной височно-затылочной извилины; выделяется в соответствии с цитоархитектоникой головного мозга. occipitalis, BNA.

Л

лапароскоп (*лапаро-* + греч. skopeo рассматривать, исследовать; син. перитонеоскоп) -- медицинский эндоскоп для исследования брюшной полости, вводимый через прокол в брюшной стенке.

лапаротомия (laparotomia; *лапаро-* + греч. tome разрез, рассечение; син. чревосечение) - хирургическая операция: вскрытие брюшной полости; к рассечению париетальной брюшины при грыжесечении термин Л. не применяют.

лапаротомия абдоминоторакальная (l.abdominothoracalis) -- см. *Лапароторакотомия*.

лапаротомия парамедианная (l.paramediana) -- см. *Лапаротомия трансректальная*.

лапаротомия параректальная (l. pararectalis) -- Л. разрезом от реберного края до уровня пупка на расстоянии 2 см медиальнее наружного края прямой мышцы живота с отодвиганием ее к средней линии.

лапаротомия подреберная (l. subcostalis) -- Л. разрезом, производимым параллельно реберному краю, отступя от него на 4--5 см, с рассечением наружной части прямой мышцы живота, иногда части косых и поперечной мышц живота.

лапаротомия поперечная (l. transversa) -- Л. разрезом в поперечном направлении с рассечением влагалища одной или обеих прямых мышц живота, с рассечением или раздвиганием самих мышц, иногда с рассечением наружной косой мышцы живота.

лапаротомия поперечная верхняя (l. transversa superior) -- Л. п., производимая выше пупка.

лапаротомия поперечная нижняя (l. transversa inferior) -- Л. п., производимая на несколько сантиметров ниже пупка.

лапаротомия срединная (l. mediana) -- Л. разрезом в продольном направлении с рассечением белой линии живота.

лапаротомия срединная верхняя (l. mediana superior) -- Л. с., производимая выше пупка разрезом от мечевидного отростка (иногда с его резекцией).

лапаротомия срединная нижняя (l. mediana inferior) -- Л. с., производимая ниже пупка.

лапаротомия срединная тотальная (l. mediana totalis) -- Л. с., производимая разрезом от мечевидного отростка до лобкового симфиза с обходом пупка слева.

лапаротомия срединная центральная (l. mediana centralis) -- Л. с., производимая на 8--10 см выше и ниже пупка с обходом его слева.

лапаротомия торакоабдоминальная (l. thoracoabdominalis) -- см. *Тораколапаротомия*.

лапаротомия трансмышечная боковая (l. transmuscularis lateralis) -- Л. разрезом от нижнего края X ребра до подвздошного гребня и затем почти параллельно наружному краю прямой мышцы живота с рассечением наружной косой мышцы вдоль волокон, а внутренней косой и поперечной -- поперек волокон.

лапаротомия трансректальная (l. transrectalis; син. Л. парамедианная) - Л. разрезом несколько сбоку от срединной линии живота с рассечением влагалища прямой мышцы живота и тупым раздвиганием ее волокон между внутренней и средней третями мышцы.

лапаротомия трансторакальная трансдиафрагмальная (l. Transthoracalis transdiaphragmalis) -- Л., начинающаяся торакотомией в шестом или седьмом межреберье с рассечением межреберных мышц, париетальной плевры и последующим рассечением диафрагмы.

лапаротомия внебрюшинная (laparotomia extraperitonealis) -- хирургическая операция: рассечение всех слоев брюшной стенки, кроме париетальной брюшины; применяется, напр., как доступ к органам забрюшинного пространства или к матке.

ларингит (laryngitis; *ларинг-* + *-ит*) -- воспаление гортани. **ларингоскоп** (*ларинго-* + греч. *скорео* рассматривать, исследовать) - общее название инструментов или приборов для прямой ларингоскопии.

ларингоскопия (*ларинго-* + греч. *скорео* рассматривать, исследовать) -- метод исследования гортани, заключающийся в ее осмотре с помощью специальных инструментов.

ларингоспазм (laryngospasmus; *ларинго-* + *спазм*) -- внезапный судорожный спазм мускулатуры гортани, вызывающий полное закрытие голосовой щели.

ларингостеноз (*ларинго-* + *стеноз*) -- стойкое сужение просвета гортани.

ларингостомия (laryngostomia; *ларинго-* + греч. *stoma* отверстие) -- хирургическая операция: рассечение передней стенки гортани с последующим формированием ларингостомы путем сшивания кожи шеи со слизистой оболочкой гортани по краям раны.

ларинготомия (laryngotomia; *ларинго-* + греч. *tome* разрез, рассечение)-хирургическая операция: рассечение передней стенки гортани по средней линии от вырезки щитовидного хряща до нижнего края перстневидного хряща.

ларинготрахеит (laryngotracheitis; *ларинго-* + *трахея* + *-ит*) -- воспаление слизистой оболочки гортани и трахеи.

ларинготрахеостомия (laryngotracheostomia; *ларинго-* + *трахея* + греч. *stoma* отверстие) -- хирургическая операция: рассечение гортани и нескольких верхних колец трахеи с последующим формированием ларингостомы.

ларинготрахеотомия (laryngotracheotomia; *ларинго-* + *трахея* + греч. *Томе* разрез, рассечение) -- хирургическая операция: рассечение гортани и нескольких верхних колец трахеи.

легочная вентиляция (син. вентиляция легких) -- обмен воздуха между легкими и окружающей средой, осуществляемый за счет дыхательных движений.

лейкоз (leucosis; *лейк-* + *-оз*; син.: лейкокровие -- устар., лейкемия -- устар.) -- общее название опухолей, возникающих из кроветворных клеток и поражающих костный мозг.

лейкоцитоз (leucocytosis; *лейкоцит* + *-оз*) -- повышенное содержание лейкоцитов в периферической крови (обычно более 10 000 в 1 мкл).

лихорадка (febris) -- защитно-приспособительная реакция организма, возникающая в ответ на действие патогенных раздражителей и выражающаяся в перестройке терморегуляции на поддержание более высокого, чем в норме, уровня теплосодержания и температуры тела.

М

мазь (unguentum) -- мягкая лекарственная форма для наружного применения, имеющая вязкую консистенцию, способная образовывать на поверхности кожи и слизистых оболочек сплошную пленку.

массаж (франц. *massage*) -- совокупность приемов механического дозированного воздействия на какие-либо участки поверхности тела человека, проводимых с помощью специальных аппаратов или руками с лечебной или профилактической целью.

массаж сердца -- способ возобновления кровообращения при прекращении или неэффективности сокращений сердца путем ритмичного его сдавливания.

массаж сердца непрямой (син.: М. сердца закрытый, М. сердца наружный) М. с., производимый ритмичным сдавливанием грудной клетки в переднезаднем направлении.

массаж сердца прямой (син.: М. сердца непосредственный, М. сердца открытый) -- М. с., производимый воздействием руками на обнаженное или прикрытое лишь перикардом сердце.

массаж сердца субдиафрагмальный -- непрямой М. с. при вскрытой брюшной полости, производимый через неповрежденную диафрагму ритмичным прижатием сердца к передней стенке грудной клетки.

массаж сердца трансдиафрагмальный (истор.) -- прямой М. с. при вскрытой брюшной полости, производимый через разрез диафрагмы.

массаж сердца трансторакальный -- прямой М. с., производимый через разрез грудной клетки. полипов, покрытых альвеолярным эпителием; наблюдаются при карнификации легких.

медиатор нервной системы (лат. *mediator* посредник; син. нейромедиатор) - общее название биологически активных веществ, выделяемых нервными окончаниями; обуславливают проведение нервных импульсов в синапсах.

Медиатор возбуждающий -- М., вызывающий деполяризацию постсинаптической мембраны и появление возбуждающего постсинаптического потенциала.

медиатор тормозный -- М., вызывающий гиперполяризацию постсинаптической мембраны и появление тормозного постсинаптического потенциала.

медиаторы аллергической реакции -- общее название биологически активных веществ, образующихся в патохимической стадии аллергической реакции и оказывающих воздействие (нередко патогенное) на клетки, органы и системы организма.

медиаторы клеточного иммунитета (син. лимфокины) -- общее название биологически активных веществ, образуемых клетками, участвующими в реализации клеточного иммунитета (Т-лимфоциты и др.), при контакте с антигеном.

Н

навык -- доведенное до автоматизма умение решать тот или иной вид задачи (чаще всего двигательной).

надлом (infractio; син.: перелом по типу "зеленой ветки", перелом по типу "ивового прута") - поднадкостничный перелом трубчатой кости без нарушения ее непрерывности, но с угловой деформацией; встречается чаще у детей.

надрыв -- частичное нарушение непрерывности мягких тканей (сухожилий, мышц, фасций, связок, капсулы сустава) при закрытых повреждениях.

назофарингит (nasopharyngitis; *назо-* + греч. pharynx, pharyngos глотка + *-ит*; син. эпифарингит) -- воспаление слизистой оболочки носоглотки.

наркоз 1 (греч. narkosis оцепенение, от narkoo делать оцепенелым, усыплять) -- искусственно вызванное состояние, характеризующееся обратимой утратой сознания, болевой чувствительности, подавлением некоторых рефлексов, расслаблением скелетных мышц.

наркоз вводный (n. initialis) -- стадия Н., характеризующаяся неполным развитием его признаков; при Н. в. возможно выполнение кратковременных или малотравматичных хирургических вмешательств.

наркоз основной -- стадия Н., характеризующаяся полным развитием его признаков; при Н. о. возможно выполнение любого оперативного вмешательства.

наркоз 2 (narcosis; син.: анестезия общая, обезболивание общее) -- анестезиологический метод, заключающийся в вызывании Н.1 для безболезненного проведения хирургического вмешательства и создания условий для управления функциями организма.

наркоз базисный (n. basalis; син. базис-наркоз) -- Н., при котором до или одновременно с основным наркотическим средством вводят другое (неингаляционное) наркотическое средство с целью уменьшения дозы первого.

наркоз сбалансированный -- смешанный Н. с применением наркотических средств, каждое из которых в отдельности в примененных дозах не обладает наркотическим действием.

наркоз внутрибрюшинный (n. intraperitonealis) -- Н., при котором наркотическое средство вводят в полость брюшины.

наркоз внутривенный (n. intravenosa) -- Н., при котором наркотическое средство вводят внутривенно.

наркоз внутрикостный (n. intraossea) -- Н., при котором наркотическое средство вводят в губчатое вещество кости.

наркоз внутримышечный (n. intramuscularis) -- Н., при котором наркотическое средство вводят внутримышечно.

наркоз ингаляционный (n. per inhalationern) -- Н., при котором больной вдыхает газообразное или парообразное наркотическое средство.

наркоз инсуффляционный (n. per insufflationern) -- Н., при котором газообразное или парообразное наркотическое средство вдвуют в легкие больного.

наркоз капельный (n. guttatim) -- масочный Н. с подачей летучего наркотического средства каплями.

наркоз комбинированный (n. combinata) -- Н., при котором одновременно или последовательно используют несколько способов введения наркотических средств в организм.

наркоз масочный -- ингаляционный Н., при котором подача наркотического средства происходит при помощи наркозной маски.

наркоз многокомпонентный -- Н., при котором применяют различные наркотические и ненаркотические средства с целью направленного обеспечения основных компонентов наркоза (аналгезии, утраты сознания, мышечной релаксации и др.).

наркоз назофарингеальный (n. nasopharyngealis) -- ингаляционный Н., при котором наркотическое средство подается при помощи трубок, введенных в носоглотку больного.

наркоз неингаляционный (n. non per inhalationern) -- Н., при котором наркотическое средство вводят в организм не через дыхательные пути.

наркоз односторонний (n. unipulmonalis) -- эндотрахеальный Н., при котором наркотическое средство вводят лишь в одно легкое.

наркоз пероральный (n. peroralis) -- Н., при котором наркотическое средство вводят через рот.

наркоз потенцированный -- смешанный Н. с применением препаратов, усиливающих действие наркотических средств.

наркоз ректальный (n. rectalis) -- Н., при котором наркотическое средство вводят с помощью клизмы в просвет прямой кишки.

наркоз смешанный (n. mixta) -- Н., при котором используют смесь различных наркотических средств.

наркоз эндотрахеальный (n. endotrachealis; син.Н. интратрахеальный) -- ингаляционный Н., при котором наркотическое средство подают через трубку, введенную в трахею.

наркоз азотный -- симптомокомплекс нарушений функций центральной нервной системы, возникающий у водолазов и подводников вследствие наркотического действия азота, проявляющегося при дыхании атмосферным воздухом под давлением свыше 4,5 атм.

наркозная маска -- 1) простейшее приспособление для ингаляционного наркоза, прикрывающее рот и нос больного и обеспечивающее испарение наркотического средства и его поступление в дыхательные пути; 2) приспособление для соединения дыхательного контура аппарата ингаляционного наркоза с дыхательными путями больного, прикладываемое к его лицу и прикрывающее нос и рот.

нарывные средства (истор.; vesicantia; син. кожно-нарывные средства - лекарственные средства, вызывающие образование на коже пузырей со стерильным экссудатом и применявшиеся для лечения вяло текущих воспалительных процессов (нарывные пластыри и коллодии из шпанских мушек и др.).

наследственность -- свойство живой материи передавать потомству признаки и особенности развития родителей; обеспечивает преемственность морфологической, физиологической и биохимической организации живых существ в ряду поколений.

недержание мочи (incontinentia urinae; син. anischuria) - непроизвольное выделение мочи из мочеиспускательного канала без позывов к мочеиспусканию.

недержание мочи абсолютное (i. urinae absoluta) -- постоянное Н. м., при котором моча не накапливается в мочевом пузыре; обусловлена тотальной эписпадией или экстрофией мочевого пузыря.

недержание мочи относительное (i. urinae relativa) -- Н. м., при котором моча частично удерживается в мочевом пузыре; наблюдается, напр., при неполной эписпадии, после травмы мочевого пузыря в родах.

недержание мочи ложное (incontinentia urinae spuria) – непроизвольное выделение мочи через свищ при аномалиях развития или повреждениях мочевого пузыря или мочеоточника.

недержание мочи ночное (enuresis nocturna; син. энурез) -- болезнь, характеризующаяся непроизвольным мочеиспусканием во время сна.

недоедание -- см. *Голодание неполное*.

недоношенность (praematuritas) -- уровень развития плода, рожденного до окончания нормального периода внутриутробного развития, характеризующийся несовершенством терморегуляции, склонностью к асфиксии, недостаточной сопротивляемостью к воздействию факторов окружающей среды.

недоношенный ребенок (син. новорожденный недоношенный)-- ребенок, родившийся раньше срока (на 28--38-й неделе внутриутробного развития). Вес тела менее 2500 г, а рост менее 45 см.

недостаточность клапана сердца (insufficiencia valvae cordis) -- неспособность клапана сердца эффективно препятствовать обратному движению крови.

недостаточность клапана атеросклеротическая (i. Valvae atherosclerotica) -- Н. к. вследствие деформации его створок, обусловленной атеросклерозом.

недостаточность клапана врожденная (i. valvae congenita) -- Н. к., обусловленная аномалией развития сердца и проявляющаяся с момента рождения.

недостаточность клапана органическая (i. valvae organica) -- Н. к. вследствие деформации его створок.

недостаточность клапана острая (i. valvae acuta) -- внезапно развившаяся Н. к. вследствие перфорации, деформации его створок или разрыва сосочковой мышцы, напр. при инфаркте миокарда, травме.

недостаточность клапана относительная (i. valvae relativa; син.: Н. клапана вторичная, Н. клапана функциональная) -- Н. к. при отсутствии деформации его створок, обусловленная таким расширением полостей сердца, аорты и (или) легочного ствола или нарушением функции сосочковых мышц, при котором не может произойти полное смыкание створок.

недостаточность клапана посткомиссуротомная -- Н. к., развивающаяся после комиссуротомии как ее осложнение.

недостаточность клапана ревматическая (i. valvae rheumatica) -- Н. к. вследствие деформации его створок, обусловленной ревматическим эндокардитом.

недостаточность клапана травматическая (i. valvae traumatica) -- Н. к. вследствие перфорации или другой деформации его створок, обусловленной их механическим повреждением.

недостаточность клапана аорты (insufficiencia valvae aortae; син. аортальная недостаточность) -- неспособность клапана аорты эффективно препятствовать обратному движению крови из аорты в левый желудочек во время диастолы желудочков сердца, обусловленная неполным смыканием или перфорацией полулунных заслонок; клинически проявляется симптомами гипертрофии и дилатации левого желудочка, повышением систолического и понижением диастолического давления, протодиастолическим шумом.

недостаточность клапана легочного ствола (insufficiencia valvae trunci pulmonalis) -- неспособность клапана легочного ствола эффективно препятствовать обратному движению крови из легочного ствола в правый желудочек во время диастолы желудочков сердца, обусловленная неполным смыканием или перфорацией полулунных заслонок; клинически проявляется симптомами гипертрофии и дилатации правого желудочка, застойными явлениями в системе большого круга кровообращения, диастолическим шумом.

недостаточность коры надпочечников острая (insufficiencia adrenalis acuta; син. Уотерхауса - Фридериксена синдром) -- синдром резкого снижения продукции гормонов коры надпочечников, характеризующийся нервным возбуждением, диффузными болями в животе, рвотой, гипертермией, геморрагическим синдромом, развитием коллапса и комы; наблюдается, напр., при кровоизлиянии в корковое вещество надпочечников, адrenalэктомии.

недостаточность коры надпочечников парадоксальная (insufficiencia adrenalis paradoxalis) -- см. *Синдром адреногенитальный с потерей солей*.

недостаточность коры надпочечников хроническая (т sufficientia adrenalis chronica) -- см. *Аддисонова болезнь*.

недостаточность кровообращения (insufficiencia circulationis sanguinis; син. декомпенсация кровообращения -- нрк) -- совокупность гемодинамических нарушений, ведущих к нарушению кровоснабжения всех или отдельных органов и тканей, а также к патологическому перераспределению объема крови в различных областях сосудистого русла; наблюдается при сердечной недостаточности, сосудистой недостаточности, механических препятствиях кровотоку.

П

панариций (paraniciūm, лат. ногтоеда"; искаженное греч. paronychia, от para около + onyx, onychos ноготь) -- острое гнойное воспаление тканей пальца.

папула (papula; сип. узелок) -- морфологический элемент кожной сыпи, представляющий собой бесполостное образование, возвышающееся над уровнем кожи.

паралич (paralysis; греч., от paralyo развязывать, расслаблять) --расстройство двигательной функции в виде полного отсутствия произвольных движений вследствие нарушения иннервации соответствующих мышц.

Р

ритм галопа -- аускультативный феномен, заключающийся в наличии экстратона (или экстратонов) сердца.

ритм коронарного синуса -- форма пассивного гетеротопного автоматизма сердца, при которой водителем ритма является участок миокарда, расположенный в непосредственной близости от венозного синуса сердца; диагностируется только электрокардиографически.

ритм перепела (син. Боткина ритм перепела) -- раздвоение второго тона, выслушиваемое над верхушкой сердца и в точке Боткина--Эрба при сужении левого предсердно-желудочкового отверстия; обусловлен появлением дополнительного тона (щелчка) открытия митрального клапана.

ритм сердца атриовентрикулярный (анат. atrium предсердие + ventriculus желудочек; син.: ритм нодальный, ритм сердца узловой, ритм узловой) -- аритмия сердца, при которой водитель ритма расположен в участке миокарда предсердий или проводящей системы, непосредственно прилежащем к предсердно-желудочковому узлу; проявляется умеренной брадикардией.

ритм сердца гетеротопный (греч. heteros другой, иной + topos место; син. ритм сердца эктопический) -- ритм сердечных сокращений при гетеротопном автоматизме.

ритм сердца идиовентрикулярный (греч. idios собственный + анат. ventriculus желудочек) -- гетеротопный ритм сердца, при котором водитель ритма расположен в миокарде желудочков.

ритм сердца идиовентрикулярный ускоренный (син. тахикардия медленная желудочковая) -- аритмия сердца, обусловленная патологической циркуляцией возбуждения по миокарду желудочков и характеризующаяся относительно небольшой (60--120 в 1 мин.) частотой сердечных сокращений.

ритм сердца искусственный (син.: ритм сердца артифициальный, ритм сердца навязанный) -- ритм сердечных сокращений, возбуждаемых электрическими импульсами, поступающими от электрокардиостимулятора.

ритм сердца маятникообразный (син.: ритм сердца эмбриональный, эмбриокардия) -- аускультативный феномен: практически полное равенство продолжительности систолы и диастолы, а также одинаковая громкость и тембр первого и второго тонов сердца; наблюдается при пароксизмальной тахикардии и правильной форме трепетания предсердий с высокой частотой сокращений желудочков.

ритм сердца многочленный -- ритм галопа, при котором выслушиваются два или более экстратона.

ритм сердца навязанный -- см. *Ритм сердца искусственный*.

ритм сердца номотопный (греч. nomos закон, норма + topos место) -- ритм сердечных сокращений при номотопном автоматизме; у человека и теплокровных животных номотопным является синусовый ритм сердца.

ритм сердца реципрокный (лат. reciprocus возвращающийся; син. эхо-ритм-нарушение ритма сердечных сокращений, при котором возбуждение, возникшее в предсердии или желудочке, вызвав сокращение соответственно желудочков или предсердий, возвращается в тот отдел сердца, где оно возникло, и вызывает его повторное сокращение.

ритм сердца синусовый (син. ритм сердца синусный) -- ритм сердечных сокращений, при котором водителем ритма является синусно-предсердный узел; у человека и теплокровных животных синусовый Р. с. выступает как номотопный ритм сердца.

ритм сердца терминальный - общее название ритмов сердечных сокращений, наблюдающихся в терминальном состоянии (напр., фибрилляция и трепетание желудочков).

ритм сердца трехчленный - ритм галопа, при котором выслушивается только один экстратон.

ритм сердца четырехчленный -многочленный ритм галопа, при котором выслушиваются два экстратона.

родничок (fonticulus, PNA) -- неокостеневший участок свода черепа.

родничок большой (f. major, JNA) -- см. *Родничок передний*.

родничок задний [f. posterior, PNA; f. occipitalis (minor), BNA; f. minor, JNA; син.: Р. затылочный, Р. малы] -- Р., расположенный между затылочной чешуей и теменными костями; закрывается в конце внутриутробного периода или в первые недели после рождения.

родничок затылочный (f. occipitalis, BNA) -- см. *Родничок задний*.

родовая деятельность (син. родовые силы) -- сочетанные сокращения матки и (позже) брюшного пресса во время родов.

родовая деятельность дискоординированная -- Р. д., характеризующаяся расстройством координации и симметричности сокращений разных частей матки.

родовозбуждение -- искусственное вызывание родовой деятельности с помощью лекарственных, в т. ч. гормональных, средств, электростимуляции или механического воздействия.

родовой канал (canalis parturientis, canalis obstetricus; син. Родовые пути) -- канал, образуемый костями малого таза и расположенными в нем мягкими тканями, через который перемещается плод в процессе родов.

родовспоможение - комплекс медико-социальных и лечебно-профилактических мероприятий, проводимых женщинам во время беременности, в родах и в послеродовом периоде.

роды (partus; син. родовой акт) -- физиологический процесс изгнания плода и последа из матки через естественные родовые пути. Р. быстрые (p. rapidus) -- Р., длительность которых составляет от 3 до 5 часов.

рубец (рубцы) (cicatrix; син. ткань рубцовая - нрк) -- плотное образование, состоящее из гиалинизированной, богатой коллагеновыми волокнами соединительной ткани, возникающее в результате репаративной регенерации, как исход воспалительного процесса.

С

санация полости рта (лат. sanatio оздоровление) -- комплекс оздоровительных мероприятий, направленных на выявление патологических изменений и функциональных нарушений органов полости рта, их устранение и профилактику.

санитария (лат. sanitarius способствующий здоровью, от sanitas здоровье) -- совокупность практических мероприятий, направленных на осуществление гигиенических нормативов и требований.

санитария жилищно-коммунальная -- область С., включающая комплекс мероприятий по санитарному благоустройству населенных мест, жилых и общественных зданий.

санитария производственная -- область С., включающая комплекс мероприятий, направленных на предотвращение или уменьшение воздействия на работающих вредных производственных факторов.

санитарная обработка в эпидемиологии -- совокупность мероприятий, проводимых с целью освобождения поверхности тела человека, его одежды, вещей постоянного пользования и жилища от возбудителей инфекционных болезней и (или) их переносчиков.

санитарная обработка полная -- С. о., включающая мытье людей (при педикулезе и обработку волосистых покровов), дезинфекцию (дезинсекцию) их одежды и обуви, дезинфекцию и влажную уборку мест их постоянного или временного пребывания, в т. ч. транспортных средств, напр. Железнодорожных вагонов.

санитарная обработка частичная -- С. о., включающая только мытье людей (при педикулезе и обработку волосистых покровов), дезинфекцию (дезинсекцию) их одежды и обуви.

санитарная обработка в военной медицине -- часть специальной обработки, включающая мероприятия по удалению с поверхности тела человека биологических средств поражения, радиоактивных или отравляющих веществ.

санитарная обработка полная -- С. о., обеспечивающая удаление со всей поверхности тела человека биологических средств поражения, радиоактивных или отравляющих веществ, а также раздражающих кожу продуктов дегазации, проводимая путем мытья со сменой белья.

санитарная обработка частичная -- С. о., обеспечивающая удаление биологических средств поражения, радиоактивных и отравляющих веществ с открытых участков кожи и прилегающих к ним частей одежды путем механической очистки и (или) обработки специальными жидкостями

свищ (fistula; син. фистула) -- отсутствующий в норме канал, выстланный грануляционной тканью или эпителием и соединяющий полости тела (в т. ч. патологические, напр. абсцессы), а также полые органы с внешней средой или между собой.

связка (-и) (ligamentum, -а, PNA, BNA, JNA) -- соединительнотканное волокнистое образование в виде пучка, тяжа или пластины, соединяющее кости (синдесмоз) или входящее в состав удерживающего (подвешивающего) аппарата внутренних органов; кроме того, С. называют дубликатуры и листки серозных оболочек, соединяющие органы со стенками полостей тела или между собой, а также облитерированные эмбриональные сосуды и протоки.

сгибание (flexio; син. флексия) -- движение в суставе вокруг его фронтальной оси, приводящее к уменьшению угла между сочленяющимися костями и сегментами конечностей.

сгибатель (musculus flexor; син. флексор) -- мышца, при сокращении которой происходит сгибание какой-либо части тела.

сдавление груди (compressio thoracis) -- патологическое состояние, обусловленное повышением внутригрудного давления в результате воздействия извне; характеризуется уменьшением объема грудной полости без нарушения целостности костей грудной клетки.

сдавление легкого (pneumocompressio; син. пневмопрессия) -- нарушение вентиляционной функции легкого в результате сжатия легочной ткани при пневмотораксе или гемотораксе, эмпиеме плевры, хирургической операции.

сдавление нерва (compressio nervi) -- повреждение нерва в результате длительного давления на него (напр., рубца, костной мозоли, опухоли).

сдавление спинного мозга (compressio medullae spinalis) -- сочетание неврологических симптомов, обусловленных смещением и деформацией вещества спинного мозга каким-либо объемным образованием (напр., опухолью, гематомой) или смещенным позвонком.

сепсис (sepsis; греч. sepsis гниение; син.: заражение крови -- устар., инфекция общая, инфекция общая гнойная) -- патологическое состояние, обусловленное непрерывным или периодическим поступлением в кровь микроорганизмов

из очага гнойного воспаления, характеризующееся несоответствием тяжелых общих расстройств местным изменениям и часто образованием новых очагов гнойного воспаления в различных органах

сердечная недостаточность (insufficiencia cordis; син. Декомпенсация сердечной деятельности -- нрк) -- неспособность сердца обеспечить адекватное кровоснабжение органов без участия дополнительных компенсаторных механизмов, не приводимых в действие при тех же обстоятельствах, если функциональные возможности сердца находятся в пределах нормы.

сердечная пауза -- период между аускультативно регистрируемыми тонами сердца; различают малую С. п., соответствующую систоле желудочков, и большую С. п., соответствующую диастоле желудочков.

сердечно-легочная недостаточность (insufficiencia cardiopulmonalis; син.: кардиопульмональная недостаточность, синдром кардиопульмональный, синдром сердечно-легочный) -- недостаточность функции внешнего дыхания, обусловленная уменьшением поверхности альвеол при патологических изменениях легких, вызванных хронической левожелудочковой и левопредсердной недостаточностью.

сердечно-сосудистая недостаточность (insufficiencia cardiovascularis) -- сочетание сердечной и сосудистой недостаточности, объединенных общностью этиологии или патогенеза.

Т

таблетка (tabuletta; франц. tablette, от лат. tabula доска, плитка) -- твердая дозированная лекарственная форма, получаемая путем прессования ингредиентов.

тампон (франц. tampon) -- стерильная полоска марли, которой заполняют рану или полость, напр. с целью остановки кровотечения или эвакуации отделяемого

тампонада (нем. Tamponade, от франц. tampon тампон) -- заполнение ран или полостей тампонами, участками других тканей (напр., сальника, мышцы) или некоторыми биопрепаратами (напр., гемостатической ватой); производится с целью остановки кровотечения, обеспечения оттока гноя, заполнения дефекта и др.

тампонада сердца (син. тампонада полости перикарда) -- сдавление сердца кровью или экссудатом, скопившимися в полости перикарда.

тахн- (тахо-; греч. tachys скорый, быстрый; tachos скорость) - составная часть сложных слов, означающая "скорый", "быстрый", "частый", "скорость".

тахикардия (tachycardia; тахи- + греч. kardia сердце) -- повышенная частота сердечных сокращений (более 100 в 1 мин.).

тахипноэ (tachypnoe; тахи- + греч. pnoe дыхание; син. полипноэ) -- учащенное дыхание без его углубления.

телосложение (habitus) -- совокупность особенностей строения, формы, величины и соотношения отдельных частей тела человека.

теменная область (regio parietalis, PNA, BNA, JNA; син. темя) -- область головы, ограниченная спереди венечным швом, сзади ламбовидным швом, с боков верхними височными линиями.

температура тела - величина, характеризующая тепловое состояние организма; измеряется гл. обр. в подмышечной ямке.

температура тела гиперпиретическая (греч. hyper- сверх, свыше + pyre-tos жар) -- Т. т. выше 41°.

температура тела пиретическая (греч. pyretos жар) -- Т. т. в пределах 39--41°.

температура тела субфебрильная (нем. subfebril от лат. sub под, ниже + febris лихорадка; син. субфебрилитет) -- Т. т. в пределах 37--38°.

температура тела фебрильная -- Т. т. в пределах 38--39°.

термограмма (термо- + греч. gramma запись) -- 1) кривая, отражающая изменения во времени температуры одного или нескольких участков тела человека; 2) изображение распределения инфракрасного (теплого) излучения кожи на экране тепловизора.

термография (термо- + греч. grapho писать, изображать) -- 1) совокупность способов графической регистрации изменений температуры, напр. одного или нескольких участков тела человека; 2) -- см. *Тепловидение*.

тиреотоксикоз (thyreotoxicosis; тирео- + токсикоз) -- патологическое состояние, обусловленное поступлением в организм чрезмерного количества гормонов щитовидной железы и характеризующееся повышением основного обмена, нарушениями функций нервной и сердечно-сосудистой систем.

тиреотоксический (тирео- + токсический) -- обусловленный повышенной функцией щитовидной железы.

токсигенность (токси- + греч. -genes порождающий) -- способность животного, растения или микроорганизма образовывать вещества, обладающие токсическим действием на другие организмы.

токсикоз (toxicosis; токсик- + -оз) -- патологическое состояние, вызванное более или менее длительным отравлением или токсемией иного происхождения.

токсин [греч. toxikon (pharmakon) я] -- вещество бактериального, растительного или животного происхождения, способное при попадании в организм человека или животных вызывать заболевание или их гибель.

Х

Хилова способ (К. Л. Хилов) -- способ остановки кровотечения из внутренней сонной артерии в области носовой части глотки путем сдавления сосуда у места его входа в пирамиду височной кости.

хиломикрон (хило- + микрон) -- частица нейтрального жира диаметром около 1 мкм; в большом количестве содержатся в лимфе, особенно после приема жирной пищи.

хиломикронемия (chylomicronaemia; *хиломикрон* + греч. haíma кровь) -- повышенное количество в крови хиломикронов; иногда термин используется для обозначения факта наличия в крови хиломикронов.

хилоперикард (chylopericardium; *хило-* + *перикард*) -- скопление лимфы в полости перикарда; возникает, напр., при сдавлении грудного протока опухолью.

хилопиопневмоторакс (chylopyopneumothorax; *хило-* + греч. pyon гной + pneuma воздух + thorax грудь, грудная клетка) -- скопление в плевральной полости лимфы и гноя, сочетающееся с наличием в ней воздуха; возникает чаще после проникающих ранений грудной клетки.

хилопневмоторакс (chylopneumothorax; *хило-* + греч. pneuma воздух + thorax грудь, грудная клетка) -- скопление лимфы и воздуха в плевральной полости; возникает чаще после проникающих ранений грудной клетки.

хирургия (лат. chirurgia; греч. cheirurgia, от cheir рука + ergon работа, действие) -- область клинической медицины, изучающая болезни и травмы, для лечения которых применяются оперативные методы, разрабатывающая эти методы и регламентирующая условия их эффективного и безопасного применения.

хрипы (rhonchi) -- дыхательные шумы, обусловленные сужением дыхательных путей или наличием в них патологического содержимого.

хрипы влажные (г. humidi) -- Х., выслушиваемые при наличии жидкого (полужидкого) содержимого в просвете дыхательных путей и напоминающие звук лопающихся пузырьков; в зависимости от высоты звука различают мелко-, средне- и крупнопузырчатые Х. в.

хрипы сухие (г. sicci) -- Х., выслушиваемые при сужении просвета дыхательных путей, обусловленном спазмом, набуханием слизистой оболочки или наличием на ней слоя вязкой слизи: в зависимости от тембра Х., связанного с диаметром бронха, различают жужжащие и свистящие Х. с.

хрипы трескучие -- звонкие влажные Х., выслушиваемые только на вдохе и возникающие при разлипании ацинусов.

Ф

фотосенсибилизация (*фото-* + *сенсibilизация*) -- повышение чувствительности организма к действию солнечного излучения, выражающееся обычно воспалением подвергшихся воздействию света участков кожи и слизистых оболочек.

фотостимулятор (*фото-* + *стимулятор*) -- прибор, генерирующий световые сигналы с заданными параметрами (интенсивностью, длительностью, частотой и т. п.) для воздействия на зрительный анализатор.

фторирование воды (син. флюоризация воды) -- обогащение питьевой воды растворимыми соединениями фтора (до 1--1,5 мг/л); проводится с целью профилактики кариеса зубов.

фурункул (лат. furunculus) -- острое гнойно-некротическое воспаление фолликула волоса и окружающей ткани, обусловленное внедрением стафилококков.

фурункулез (furunculosis; *фурункул* + -оз) -- стафилодермия, характеризующаяся появлением множественных фурункулов; возникает на фоне нарушений обмена веществ, особенно углеводного, а также пониженной сопротивляемости организма.

Э

экзантема (exanthema; греч. exanthema высыпание, сыпь, от exantheo цвести, расцветать) -- общее название сыпей на коже.

экзема (eczema; греч. ekzema высыпание на коже, от ekzeo вскипать, вспыхивать) -- рецидивирующий нейроаллергический дерматоз, характеризующийся развитием серозного воспаления сосочкового слоя дермы и очагового спонгиоза эпидермиса, проявляющийся полиморфной зудящей сыпью (везикулы, папулы, эритема и др.)

эксекреторный (excretorius; лат. excerno, excretum отделять, выделять) -- выполняющий выделительные функции, связанный с этими функциями.

эксекреция (лат. excerno, excretum, отделять, выделять; от экс- + cerno различать, просеивать; син. выделение) -- совокупность физиологических процессов, направленных на освобождение организма от конечных продуктов обмена, чужеродных веществ, а также избытка воды, минеральных и органических веществ, поступивших с пищей или образовавшихся в организме в процессе метаболизма.

эксекреция канальцевая максимальная -- показатель функционального состояния почек, представляющий собой количество парааминогиппуровой кислоты или диодраста (кардиотраста), выделяемое с мочой в среднем за 1 мин., приведенное к стандартному объему почечного кровотока.

эмболия (embolia; греч. embole вбрасывание, вторжение) -- закупорка кровеносного сосуда эмболом.

эмульсия в фармации (emulsio; лат. emulgeo, emulsum выдаивать) -- жидкая лекарственная форма, представляющая собой дисперсную систему из не смешивающихся друг с другом жидкостей.

эмфизема (греч. emphysema вздутие, от emphysao вдувать, надувать) -- растяжение (вздутие) органа или ткани воздухом, попавшим извне, или газом, образовавшимся в тканях.

энцефалит (encephalitis; *энцефал*- + -ит) -- воспаление головного мозга.

энцефалопатия (encephalopathia; *энцефало*- + греч. pathos страдание, болезнь; син.: псевдоэнцефалит, церебропатия, энцефалоз) -- общее название болезней головного мозга, характеризующихся его дистрофическими изменениями.

эпидемиология¹ (*эпидемия* + греч. logos учение, наука) -- медицинская наука, изучающая закономерности эпидемического процесса и разрабатывающая методы борьбы с инфекционными болезнями человека.

эпидемиология военная -- раздел военной медицины и Э., разрабатывающий теорию и практику противэпидемического обеспечения войск в мирное и военное время.

эпидемиология географическая -- см. *Эпидемиологическая география*.

эпидемиология ландшафтная -- см. *Эпидемиологическая география*.

эпидемиология -- метод изучения закономерностей распространения неинфекционных болезней среди населения, основанный на применении статистических показателей.

эпидермис (epidermis, LNH; *эпи-* + греч. derma кожа) -- поверхностный слой кожи, состоящий из многослойного плоского ороговевающего эпителия.

эпикриз (epicrisis; греч. epikrisis суждение, решение) -- суждение о диагнозе, причинах, патогенезе заболевания и результатах его лечения, производимое после окончания лечения или его определенного этапа и фиксируемое в медицинских учетных документах.

эпикриз этапный -- Э., составляемый с целью обеспечения преемственности лечения при переводе больного в другое лечебно-профилактическое учреждение.

эпилепсия (epilepsia; греч. epilepsia схватывание, эпилептический припадок, эпилепсия; син. болезнь падучая -- устар.) -- хроническая болезнь, обусловленная поражением головного мозга, проявляющаяся повторными судорожными или другими припадками и сопровождающаяся разнообразными изменениями личности.

эпителий (epithelium, LNH; *эпи-* + греч. thele сосок молочной железы; син. ткань эпителиальная) -- ткань, выстилающая поверхность и полости тела, образующая эпидермис, покрывающая слизистые оболочки пищеварительного тракта, воздухоносных, мочевых и половых путей, серозные оболочки, а также образующая большинство желез организма; выполняет защитную, секреторную и некоторые другие функции.

эритроцит (erythrocytus; *эритро-* + гист. cytus клетка; син. Красное кровяное тельце -- устар.) -- безъядерный форменный элемент крови, содержащий гемоглобин.

эритроцит мишеневидный -- плоский бледный Э. с небольшим количеством гемоглобина, расположенного лишь в центре клетки; Э. м. встречаются при талассемии, изредка при других анемиях.

эритроцит первичный (e. primarius) -- красная кровяная клетка, образующаяся из макроэритробласта при эмбриональном кроветворении.

эритроцит полихроматофильный (e. polychromatophilicus; син. полихроматофил) -- незрелый Э., цитоплазма которого вследствие неполного насыщения ее гемоглобином окрашивается одновременно как кислыми, так и основными красителями, приобретая серо-фиолетовый цвет.

эритроцитарная масса -- взвесь эритроцитов, получаемая из цельной крови путем удаления плазмы.

эритроцитоз (erythrocytosis; *эритроцит* + *-оз*; син. полицитемия) -- повышенное содержание эритроцитов в единице объема периферической крови.

эрозия (erosio; лат. "разъедание") -- поверхностный дефект слизистой оболочки или эпидермиса.

эхинококк (греч. echinos еж + kokkos зерно) -- 1) личинка цестод отряда Cyclophyllida в виде обширного пузыря, содержащего дочерние и внучатые пузыри с многочисленными сколексами; 2) (Echinococcus granulosus) -- вид цестод сем. Taeniidae, отр. Cyclophyllida, распространенный повсеместно; мелкие половозрелые формы паразитируют в тонком кишечнике хищных животных, более крупные личиночные формы -- в тканях внутренних органов многих млекопитающих, в том числе человека, вызывая эхинококкоз.

эхография ультразвуковая (эхо- + греч., grapho писать, изображать) -- метод исследования, основанный на посылке в глубину обследуемого участка тела ультразвуковых импульсов, которые, последовательно отразившись от различных структур (органов тканей), формируют изображение их плотности на экране электронно-лучевой трубки; применяется, напр., в кардиологии, акушерстве, офтальмологии.

эхография ультразвуковая двухмерная (син. сканирование ультразвуковое) -- Э. у., при которой непрерывное изменение направления ультразвукового излучения обеспечивает исследование объекта не только в глубину, но и в поперечном направлении.

эхокардиограмма (эхо- + кардиограмма) -- кривая, отображающая колебания интенсивности ультразвуковых импульсов, отраженных от сердца, окружающих его тканей и внутрисердечных образований.

эхокардиограф [хо- + кардиограф; син.: кардиограф ультразвуковой, эхокардиолокатор, эхотахокардиограф) -- прибор для исследования сердечной деятельности путем регистрации перемещений сердца или его клапанов методом ультразвуковой эхографии.

эхокардиография (эхо- + кардиография; син. кардиография ультразвуковая) -- исследование сердца методом ультразвуковой эхографии; применяется для изучения структуры самого сердца и окружающих его тканей, выявления жидкости в перикардialной полости и внутрисердечных тромбов, а также для исследования функционального состояния сердца.

Я

яд(-ы) (venenum, venena) -- вещество, вызывающее отравление или смерть при попадании в организм в малом количестве.

язва (ulcus) -- дефект кожи или слизистой оболочки и подлежащих тканей, процессы заживления которого (развитие грануляций, эпителизация) нарушены или существенно замедлены.

ячмень (hordeolum) -- острое гнойное воспаление железы хряща века (мейбомиевой железы) или слезной железы века (железа Цейсса).

Заведующий кафедрой детских болезней №3,
д.м.н., профессор



Касохов Т.Б.